



N°27
14/08/2025



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / **CDA 33**
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / **Terres Inovia**
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Patrice MAHIEU / **CDA 64**
p.mahieu@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »**



Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Prairies


- **Cirphis**

- Reprise des vols de papillons.
- La prochaine génération de chenilles approche.

Cirphis - Les observations de la semaine

La surveillance continue dans le réseau habituel, avec quelques pièges supplémentaires.

La tournée de ce lundi est résumée par la carte ci-dessous :



Niveaux de présence des chenilles et papillons cirphis dans le 64. CA64 – actualisation 12 août 2025

• Observations

La génération de chenille semble arrivée à son terme. Toutefois, des dégâts sont encore observés sur certaines prairies et cultures de maïs, en particulier sur le secteur de LASSEUBE.

Les vols de papillons ont repris dans de nombreux secteurs : ITXASSOU (1), LASSEUBE (1), ARETTE (2), ESQUIULE (2), ST PEE-SUR-NIVELLE (2), BIDARRAY (3), ARAMITS (5), HASPARREN (11), ST-PALAIS (20), SOURAIDE (21), BOSDARROS (36), CAMBO (39), JUXUE (73), SARE (80), GARINDEIN (120), et ROQUIAGUE (136).

Au vu de ces observations, l'arrivée de la prochaine génération de chenilles est attendue d'ici une quinzaine de jours. Il est donc important de rester vigilant, afin de détecter rapidement toute nouvelle infestation et d'intervenir si besoin.

• Informations

Pour repérer les cirphis au plus tôt, profitez de la rosée matinale pour marcher dans vos parcelles : les chenilles se colleront à vos chaussures.

Surveillez régulièrement (au moins tous les 2 jours). Le piétinement (pâturage) et le fauchage permettent de limiter leur présence.

Pour limiter d'éventuels dégâts dans le maïs, il est important de nettoyer les bordures de vos parcelles : la présence d'herbe favorise la présence de chenilles, et donc des attaques.

Si le seuil critique est dépassé et que la majorité des larves est de taille inférieure à 20 mm, pulvérisation possible de produit à base de Bt (les chenilles meurent de faim en 3-4 jours).

APPEL à VOLONTAIRES :

Pour un essai de parasitage d'œufs de papillons cirphis avec un de ses parasites (trichogramme), nous recherchons des prairies où il sera possible de faire des comptages de chenilles sur les 2-3 semaines suivant l'éventuel lâcher (si vol en cours des papillons ; et donc, pas d'intervention de quelque nature qu'elle soit sur la prairie, pour pouvoir faire ces comptages de larves). Cf. SILLON du 25 juillet 2025.

Plus d'informations : contacts ci-dessous.

• Critères de reconnaissances

D'une envergure de 3 cm, le papillon est identifiable par sa tâche claire sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Néanmoins, les trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et la bande longitudinale latérale jaune la rendent particulièrement reconnaissable, tout comme son aspect lisse, sans poils et le fait qu'elle s'enroule lors d'un stress (quand on la touche par exemple).

• Pour se tenir informé

Site internet de la Chambre d'agriculture 64 (et référence), diffusion dans la presse hebdomadaire agricole, affichage dans les coopératives et sur Facebook (groupe Prairies.64)



Cirphis (Mythimna unipuncta) aux stades adultes et larvaires. CA64 – 2025

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Agriculteurs, ARVALIS, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, Terres Inovia, Astria64
Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maïsador, Gaïa Care Consulting, Landreau Agro, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Groupe Terres du Sud, VitiVista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".