



N°36
16/10/2025



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / **CDA 33**
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / **Terres Inovia**
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Patrice MAHIEU / **CDA 64**
p.mahieu@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »**



Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur <https://bsv.na.chambagri.fr> et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Grosses altises** : risque fort dans les parcelles inférieures à 4 feuilles (situation minoritaire). Nul dans les autres situations (colza supérieur à 4 feuilles).
- **Charançon du bourgeon terminal** : début de vol. Risque nul pour le moment. Surveillez la dynamique de vol du ravageur.

Prairies

- **Cirphis**
 - Nouvelle génération de papillons.
 - Entre-deux, concernant les chenilles ; signalement de pullulation sur les hauteurs de la vallée d'Aspe.

ANNEXES :


Notes nationales biodiversité

Reconnaissance des stades du Colza à l'automne

Analyse de risque élaborée à l'échelle des territoires Aquitaine et Ouest Occitanie

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2025-2026 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de **21 parcelles observées**.

Parcelles BSV observées du 2025-10-09 au 2025-10-15



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéressent ?


Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et **devenez observateur colza !**

Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : g.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou g.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.

• Stades phénologiques et état des cultures

Les parcelles sont comprises entre les stades B3 (BBCH13 : stade 3 feuilles) et plus de 10 feuilles (BBCH19) en fonction des dates de semis, mais aussi d'accidents culturels locaux (dégâts de ravageurs, phytotoxicité herbicide, etc.) aboutissant à des re-semis tardifs (situations minoritaires). Les conditions sont toujours réunies pour une croissance rapide des colzas. La majorité des parcelles se situent aujourd'hui, d'après les remontées du réseau, entre les stades 6 et 8 feuilles (BBCH16 et BBCH18).

Malgré des conditions globalement favorables, l'absence de pluie, selon les situations, peut entraîner un ralentissement de la croissance des plantes et quelques jaunissements. Le retour des pluies en fin de semaine devrait gommer ces observations.



Rappel : un stade est atteint dans une parcelle lorsque 50 % des plantes l'ont atteint.

• Adultes de grosses altises ou altises d'hiver

Sur 21 parcelles observées, 17 font état de captures de grosses altises, à des niveaux encore hétérogènes entre les parcelles (1 à plus de 150 altises par cuvette). La présence de l'insecte est généralisée (voir carte). La douceur des dernières semaines est favorable aux déplacements et à l'activité du ravageur. Selon le retour des pluies et leur intensité en fin de semaine, il est probable que l'activité soit en baisse la semaine prochaine.


Les remontées de dégâts sur plantes ne concernent que 2 parcelles, toutes deux ayant dépassé la période de risque, avec des morsures moyennes de 66 % et une surface foliaire détruite de 8 %, ce qui peut être considéré comme faible.

Pour rappel, l'évaluation du risque se fait en parcelle, en prenant en compte le stade, la part de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas intervenir hâtivement sur une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.




Grosse altise sur colza
(Photo Terres Inovia)

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de la grosse altise (GA)
Nb moyen de grosse altise / cuvette (hors valeurs nulles, et valeur maxi à 50 insectes)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie



Parcelles observées du 2025-10-09 au 2025-10-15



Piege enterre : Nb d'altises d'hiver (grosses altises) : ● [0 - 0] ● [0 - 5] ● [5 - 150]

Évaluation du risque

Risque moyen à fort dans les parcelles inférieures à 4 feuilles. Nul dans les autres situations (colza supérieur à 4 feuilles).

Au vu de la dynamique de vol actuelle, le risque est considéré comme fort dans les parcelles à moins de 4 feuilles. Attention ces situations sont minoritaires puisqu'elles ne sont plus présentes dans le réseau et à des faibles niveaux hors réseau sud-ouest. Pour les parcelles les plus avancées (stade B4 et plus), la phase de risque est passée. Les conditions sont poussantes et favorables à une croissance dynamique des colzas.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte. Cas particulier du Sud-Ouest : 3 pieds sur 10 avec morsures SI levée après le 1er octobre.

• Charançon du bourgeon terminal

La présence du ravageur a été détectée pour la première fois la semaine dernière dans l'une des cuvettes du réseau. Cette semaine, 6 parcelles capturent le ravageur à des niveaux encore faibles (voir carte). Il est encore trop tôt pour évoquer un vol généralisé de l'insecte, qui sera à confirmer dans les semaines à venir.


D'après [l'outil prédictif des vols de ravageurs](#), la probabilité de vol semble être plus forte à l'Est du réseau notamment à partir du 20/10 d'après les simulations, cf. ci-dessous). Attention, cet outil ne fournit qu'une probabilité de vol du charançon du bourgeon terminal et ne dispense en aucun cas des observations de l'état physiologique des colzas et des captures en cuvettes nécessaires à la prise de décision ou non d'une intervention de protection !




Charançon du bourgeon terminal (photo Terres Inovia).

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage du charançon du bourgeon terminal (CBT)

Nb moyen de CBT / cuvette (avec valeurs nulles, écrêtement si obs >50 individus)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie







Piège : Nb de charançons du bourgeon terminal : [0 - 0] [0 - 5]

Période de risque : de 3 feuilles à reprise de végétation.

Seuil indicatif de risque : raisonner selon le piégeage en cuvette et les données fournies par le réseau BSV (pic de vol régional ou pontes si disponibles) ainsi que le risque agronomique (dynamique de croissance des colzas) et historique de la parcelle (nuisibilité rare). Les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. La durée de maturation est variable mais on retient souvent un délai de 8 à 10 jours après les 1eres captures significatives.





Évaluation du risque

Début de vol. Risque faible. Evolution attendue dès la semaine prochaine. Surveillance des cuvettes jaunes en végétation nécessaire !

A ce jour, il n'y a aucune capture significative. Les premières arrivées sont en cours, mais elles demeurent limitées pour le moment et nécessitent d'être validées par une surveillance généralisée dès à présent. Il n'y a donc aucun risque à date, mais il convient de surveiller les parcelles dans les jours et semaines à venir afin de détecter précisément un vol généralisé.

• Limaces

Malgré des journées chaudes et sèches, les conditions humides et fraîches au cours de la nuit et en début de matinée demeurent favorables à l'activité des limaces. La vigilance reste de mise pour les parcelles en-deçà du stade 4 feuilles (semis tardifs, re-semis récents).

Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de l'historique de la parcelle, de la gestion de l'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Évaluation du risque

Risque modéré à fort dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles (situations minoritaires). Nul pour les parcelles ayant dépassé ce stade.

Les parcelles de colza semées tardivement ou ayant fait l'objet de re-semis sont toujours en phase de sensibilité et nécessitent une surveillance accrue. Actuellement le risque est considéré comme modéré à fort au regard des observations réalisées et des conditions météorologiques du moment. Les parcelles avec une quantité importante de résidus pailleux en surface et/ou motteux nécessitent une surveillance renforcée.

- **Héliothis**

Des larves d'Héliothis peuvent être observées en parcelles. Quelques signalements ont été faits ces dernières semaines dans ce sens dans le Tarn, l'Aude et le Lot-et-Garonne, sur des parcelles dans et en dehors du réseau. Les dégâts et l'activité demeurent faibles et en baisse. N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Le seuil indicatif de risque à retenir est identique à celui des autres larves défoliatrices telles que la tenthrède, à savoir 25 % de surface foliaire détruite. La culture du colza est sensible jusqu'à 6 feuilles.



Larve d'Héliothis (photo CA 81)

Évaluation du risque

Risque faible dans les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 6 feuilles. Faible dans les autres situations.

Pour l'instant, la présence du ravageur est très localisée et son activité faible. La surveillance reste de mise pour les parcelles n'ayant pas atteint le stade 6 feuilles.

- **Altises des crucifères ou petites altises**

Évaluation du risque

Fin de la période de risque.

- **Vers gris ou noctuelle terricole**

Aucun signalement à ce jour dans le réseau.

Restez vigilant jusqu'au stade six feuilles, stade où le collet sera plus développé.



Vers gris (photos Terres Inovia)

- **Tenthrède de la rave**

Cette semaine, aucune parcelle ne remonte de dégâts. La semaine dernière la présence de larves a été signalée sur 1 parcelle, avec 25 % de pieds porteurs pour 5 % de surface foliaire détruite. Il est nécessaire de maintenir la surveillance jusqu'au stade 6 feuilles.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).


Évaluation du risque

Risque modéré jusqu'à 6 feuilles, faible au-delà.

Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation.

Cirphis - Les observations de la semaine

La tournée de ce lundi et les retours terrain (agriculteurs ou particuliers) sont résumés par la carte ci-dessous :



Niveaux de présence des chenilles et papillons cirphis dans le 64, réseau de surveillance et signalements, 15 octobre 2025 (CA64)

• Observations

Pas de chenilles observées sur le réseau cette semaine ; elles sont cependant signalées en pullulation à LESCUN, sur les hauteurs de la vallée d'Aspe.

Les papillons quant à eux sont en recrudescence, avec des piégeages conséquents (plus de 5 papillons en pot piège ; plus de 50 en TIPI) sur certains secteurs (cf. carte ci-dessous ; non exhaustive ...) ; des vols sont aussi bien visibles à la tombée du jour, notamment à SOURAÏDE (64) :



(pot piège à Souraïde ; 2 semaines de capture)

(à Souraïde, prairie à forte végétation, notamment de paspale)



Une nouvelle génération est donc en cours, ce qui est logique (et attendu), au vu des pullulations précédentes et des conditions actuelles encore douces. Les conditions météo des prochains jours ne ralentiront probablement pas leur activité (de vol ; quant aux pontes ?).

On est encore pour quelques jours entre deux générations ; la surveillance reste nécessaire, une nouvelle génération de chenilles pouvant émerger d'ici une quinzaine de jours.

Fauche, broyage ou pâture restent un moyen de déranger ces vols ; au vu de leur intensité actuelle, il convient de valoriser l'herbe qui peut l'être.

Les semis / sursemis faits ou en cours seront à surveiller particulièrement

- **Critères de reconnaissance**

D'une envergure de 3 cm, le papillon est identifiable par sa tache claire sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Néanmoins, les trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et la bande longitudinale latérale jaune la rendent particulièrement reconnaissable, tout comme son aspect lisse, sans poils et le fait qu'elle s'enroule lors d'un stress (quand on la touche par exemple).

- **Pour se tenir informé**

Site internet de la Chambre d'agriculture 64 (<https://pa.chambres-agriculture.fr/sinformer/produire-et-innover/herbe-et-fourrages/cirphis>), diffusion dans la presse hebdomadaire agricole, affichage dans les coopératives et sur Facebook (groupe *Prairies.64*).



Cirphis (*Mythimna unipuncta*) aux stades adultes et larvaires.

CA64 – 2025

Annexe 1 – Notes nationales Biodiversité – BSV (*liens cliquables*)

[FLORE](#)

[VERS DE TERRE](#)

[OISEAUX](#)

[ARAIGNEES](#)

[PAPILLONS](#)

[ABEILLES](#)

[MENTION ABEILLE](#)

[COLEOPTERES](#)

[CHAUVE-SOURIS](#)

[ARBRES / HAIES](#)

[INSECTES AUXILIAIRES](#)

[PRODUITS DE BIOCONTROLE](#)

[RESISTANCES](#)

Annexe 2 : reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (*voir ci-contre*).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (*voir ci-contre*).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
ou fin de la formation de la rosette.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Agriculteurs, ARVALIS, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, Terres Inovia, Astria64
Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maisadour, Gaïa Care Consulting, Landreau Agro, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Groupe Terres du Sud, VitiVista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".