



N°38
30/10/2025



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / **CDA 33**
p.mouquot@girond.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / **Terres Inovia**
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Patrice MAHIEU / **CDA 64**
p.mahieu@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

Écophyto est une
politique publique du



GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Financé dans le cadre
de la stratégie écophyto



GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »**

Avec le soutien financier de



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
Liberté
Égalité
Fraternité



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur <https://bsv.na.chambagri.fr> et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Charançon du bourgeon terminal** : Vols en cours. Risque modéré. Pic attendu d'ici la semaine prochaine. Surveillance des cuvettes jaunes en végétation nécessaire !
- **Grosses altises** : ralentissement de la dynamique de vol. Risque nul pour les colzas de plus de 4 feuilles. Modéré pour ceux de moins de 4 feuilles (très minoritaires).
- **Tenthrede de la rave** : risque faible mais la surveillance doit se poursuivre jusqu'à 6 feuilles, au-delà le risque est nul.
- **Héliothis** : risque faible mais la surveillance doit se poursuivre jusqu'à 6 feuilles, au-delà, le risque est nul.

Annexes :

Notes nationales biodiversité

Reconnaissance des stades du Colza à l'automne




Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et **devenez observateur colza !**

Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : g.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou g.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.

L'hétérogénéité des stades est fonction des dates de semis, mais aussi d'accidents culturels locaux (dégâts de ravageurs, phytotoxicité herbicide, etc.) aboutissant à des re-semis tardifs (situations minoritaires).

Les conditions douces et humides des derniers jours ont gommé les jaunissements et/ou ralentissements de croissance observés au début du mois. Elles ont permis un gain de biomasse important pour l'ensemble des colzas, hors semis très tardifs et accidents culturels. Des passages pluvieux et doux, suivis du retour d'un temps chaud et clair sont attendus pour la semaine à venir, de quoi permettre au colza de poursuivre son accumulation de biomasse pour les parcelles bien fournies en éléments minéraux.



Rappel : un stade est atteint dans une parcelle lorsque 50 % des plantes l'ont atteint.

• Adultes de grosses altises ou altises d'hiver

Sur 24 parcelles observées, 21 font état de captures de grosses altises, à des niveaux hétérogènes selon les secteurs, mais moindres par rapport aux semaines précédentes (1 à 50 altises par cuvette). La présence de l'insecte est toujours d'actualité sur l'ensemble du territoire (voir carte ci-dessous), mais les dernières captures (voir graphique ci-dessous) confirment un ralentissement de la dynamique de vol ainsi que de l'activité du ravageur, en lien avec les conditions fraîches et humides des derniers jours.


Hormis une seule parcelle pour laquelle sont signalées des attaques à des niveaux proches du seuil d'intervention, toutes les parcelles du réseau ont dépassé le stade de risque).

Pour rappel, l'évaluation du risque se fait en parcelle, en prenant en compte le stade, la part de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas intervenir hâtivement sur une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.




Grosse altise sur colza
(Photo Terres Inovia)

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de la grosse altise (GA)
Nb moyen de grosse altise / cuvette (hors valeurs nulles, et valeur maxi à 50 insectes)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie



Parcelles observées du 2025-10-22 au 2025-10-29



Piège enterre : Nb d'altises d'hiver (grosses altises) : ● [0-0] ● [0-5] ● [5-50]

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte. Cas particulier du Sud-Ouest : 3 pieds sur 10 avec morsures SI levée après le 1er octobre

Evaluation du risque

Risque moyen dans les parcelles inférieures à 4 feuilles (situation minoritaire). Nul dans les autres situations (colza supérieur à 4 feuilles).

Le pic de vol est dépassé. L'ensemble des parcelles du réseau sont sorties de la période de risque. Quelques rares parcelles hors réseau peuvent encore être concernées mais l'activité est en baisse.

• Charançon du bourgeon terminal

La présence du Charançon du bourgeon terminal s'étend à l'échelle du réseau. Cette semaine, 14 parcelles recensent des captures à des niveaux plus importants que la semaine dernière. Les vols s'intensifient en Haute-Garonne, dans L'Aube, Le Tarn, Le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne, où de premières captures significatives (> 5 individus capturés) ont eu lieu cette semaine.

D'après l'outil prédictif des vols de ravageurs, les vols devraient se poursuivre et s'intensifier durant les 7 prochains jours, notamment dans la Haute-Garonne et le Tarn. Attention, cet outil ne fournit qu'une probabilité de vol du charançon du bourgeon terminal et ne dispense en aucun cas des observations de l'état physiologique des colzas et des captures en cuvettes nécessaires à la prise de décision ou non d'une intervention de protection !




Charançon du bourgeon terminal (photos Terres Inovia).


inovia.

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage du charançon du bourgeon terminal (CBT)


Nb moyen de CBT / cuvette (avec valeurs nulles, écrêtement si obs >50 individus)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie



Parcelles observées du 2025-10-22 au 2025-10-29



Piege : Nb de charançons du bourgeon terminal : [0-0] [0-5] [5-14]





Période de risque : de 3 feuilles à reprise de végétation.

Seuil indicatif de risque : raisonner selon le piégeage en cuvette et les données fournies par le réseau BSV (pic de vol régional ou pontes si disponibles) ainsi que le risque agronomique (dynamique de croissance des colzas) et historique de la parcelle (nuisibilité rare). Les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. La durée de maturation est variable mais on retient souvent un délai de 8 à 10 jours après les 1^{ères} captures significatives.

Évaluation du risque

Pic de vol attendu cette semaine ou semaine prochaine. Risque modéré. Surveillance des cuvettes jaunes en végétation nécessaire !


Les captures significatives (> 5 individus par cuvette) s'étendent à l'échelle du réseau. Le vol s'étend cette semaine et devrait se généraliser d'ici la semaine prochaine. Il convient de surveiller les parcelles dans les jours à venir afin de détecter précisément un vol généralisé. Au vu de la dynamique de croissance des colzas, le risque est modéré.

• **Héliothis**

Des activités de larves d'Héliothis ont été remontées cette semaine dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Les parcelles concernées sont au-delà du stade de risque.

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Le seuil indicatif de risque à retenir est identique à celui des autres larves défoliatrices telles que la tenthrède, à savoir 25 % de surface foliaire détruite. La culture du colza est sensible jusqu'à 6 feuilles.



Larve d'Héliothis (photo CA 81)

Évaluation du risque

Risque faible dans les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 6 feuilles. Nul dans les autres situations.

• **Tenthrède de la rave**

Des captures d'adultes peuvent encore avoir lieu localement. Pour autant, aucune parcelle ne remonte de dégâts. Il est nécessaire de maintenir la surveillance jusqu'au stade 6 feuilles.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).

Évaluation du risque

Risque faible mais la surveillance doit se poursuivre jusqu'à 6 feuilles, au-delà, le risque est nul.

Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation. Aucune parcelle avec attaque à ce jour.

Annexe 1 – Notes nationales Biodiversité – BSV (*liens cliquables*)

[FLORE](#)

[VERS DE TERRE](#)

[OISEAUX](#)

[ARAIGNEES](#)

[PAPILLONS](#)

[ABEILLES](#)

[MENTION ABEILLE](#)

[COLEOPTERES](#)

[CHAUVE-SOURIS](#)

[ARBRES / HAIES](#)

[INSECTES AUXILIAIRES](#)

[PRODUITS DE BIOCONTROLE](#)

[RESISTANCES](#)

Annexe 2 : reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (*voir ci-contre*).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (*voir ci-contre*).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
ou fin de la formation de la rosette.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Agriculteurs, ARVALIS, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, Terres Inovia, Astria64

Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maisadour, Gaïa Care Consulting, Landreau Agro, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Groupe Terres du Sud, VitiVista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".