



FLASH PRAIRIE n°1 09/07/2026



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / CDA 33
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr
a.peyhorgue@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / Terres Inovia
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Marie-Claude MAREAUX / CDA 64
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »

Edition Aquitaine

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)


Ce qu'il faut retenir

Prairies :

- Démarrage de la campagne du réseau de surveillance.



Le réseau de surveillance du cirphis a redémarré cette semaine sur le réseau habituel. La tournée de ce lundi est résumée par la carte ci-dessous :



Carte interactive illustrant les niveaux de présence des chenilles et papillons cirphis. CA64 - 6 juillet 2026

Observations

Aucun papillon ni chenille n'ont été observés sur l'ensemble du réseau. Quelques morsures ont été observées sur les sites suivants : ARBONNE, BIDARRAY, BRISCOUS, GARINDEIN, MACAYE, SAINT-PEE-SUR-NIVELLE.



Photographie d'une morsure (Briscois).

Informations

Pour repérer les cirphis au plus tôt, profitez de la rosée matinale pour traîner des pieds dans vos parcelles : les chenilles se colleront à vos chaussures.

Les zones de prairies composées de multiples espèces sont habituellement moins touchées, contrairement à celles majoritairement pourvues de dactyle.

Le piétinement, le fauchage et l'application de Bt permettent de limiter leur présence.

Critères de reconnaissance

D'une envergure de 3 cm, le papillon est identifiable par sa tâche claire sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Néanmoins, les trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et la bande longitudinale latérale jaune la rendent particulièrement reconnaissable, tout comme son aspect lisse, sans poil et le fait qu'elle s'enroule lors d'un stress (quand on la touche par exemple).



**Cirphis (*Mythimna unipuncta*)
aux stades adultes et larvaires.
(C.A64)**

Pour se tenir informé

Site internet de la Chambre d'agriculture 64 (<https://pa.chambres-agriculture.fr/sinformer/produire-et-innover/herbe-et-fourrages/cirphis>), diffusion dans la presse hebdomadaire agricole, affichage dans les coopératives et sur Facebook (groupe Prairies.64).

Contacts :

Ariane DUCAT : 06 30 31 61 34

Marie-Claude MAREAUX : 06 24 42 59 54 // mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Département Agriculture

