



Grandes cultures

N°3
03/03/2026



Animateurs filières

Céréales à paille

Philippe PENICHO

FREDON N-A

philippe.penichou@fredon-na.fr

Suppléance : **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Maïs

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON N-A**

philippe.penichou@fredon-na.fr

Oléagineux

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON N-A**

philippe.penichou@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE

Président de la Chambre Régionale

Nouvelle-Aquitaine

Boulevard des Arcades

87060 LIMOGES Cedex 2

accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

Service Régional

de l'Alimentation

Nouvelle-Aquitaine

22 Rue des Pénitents Blancs

87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer

l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

Reproduction partielle autorisée

avec la mention « extrait du

bulletin de santé du végétal

Nouvelle-Aquitaine Grandes

cultures N°3

du 03/03/2026 »

Edition **Limousin**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Stades phénologiques** : du stade « reprise de végétation » (C1 BBCH30) à « boutons séparés » (E BBCH57).
- **Charançon de la tige du colza** : avec les conditions climatiques (sec et doux) la période de risque étant actuellement en cours et le vol de charançons de la tige du colza étant avéré, **le risque est moyen à fort** surveillez vos parcelles.
- **Meligèthes** : la majorité des colzas sont dans le stade sensible D1 (BBCH50) à E (BBCH 57), **le risque est fort** car les conditions climatiques sont très favorables à ce ravageur.

Céréales

- **Stades Phénologiques** : de début tallage (BBCH 21) à « épi 1 cm » (BBCH 30).
- **Piétin verse** : risque à évaluer à partir du stade « épi 1cm (BBCH 30).
- **Oïdium / Rouille jaune** : surveillance des variétés sensibles dès « épi 1 cm ».
- **Rhynchosporiose** : premiers signalements sur triticales.
- **Gestion des résistances aux fongicides sur céréales à paille** : note commune 2026 INRAE, ARVALIS, ANSES.



PREVISIONS METEO (sources météo France)

Semaine très douce et souvent ensoleillée. La douceur se poursuit avec des pointes à 20°C voir 24°C en Corrèze. Des températures minimales et maximales bien au-dessus des normales.

Limoges

MARDI 03	MERCREDI 04	JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09
						
5° / 19° ▶ 10 km/h	6° / 20° ▶ 10 km/h	5° / 20° ▶ 20 km/h	7° / 18° ◀ 5 km/h	7° / 21° ▶ 10 km/h	6° / 18° ▶ 20 km/h	7° / 16° ▲ 20 km/h

Guéret

MARDI 03	MERCREDI 04	JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09
						
4° / 17° ▶ 10 km/h	5° / 18° ◀ 10 km/h	5° / 20° ▶ 5 km/h	6° / 18° ▲ 10 km/h	6° / 19° ◀ 10 km/h	5° / 17° ▶ 10 km/h	6° / 16° ▲ 15 km/h

Brive

MARDI 03	MERCREDI 04	JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09
						
4° / 21° ▶ 10 km/h	6° / 22° ▶ 10 km/h	7° / 22° ▶ 15 km/h	10° / 20° ▶ 15 km/h	8° / 24° ▶ 10 km/h	6° / 22° ▶ 20 km/h	7° / 19° ▲ 15 km/h

Colza

• Stades phénologiques et observations du réseau

A l'heure actuelle, le réseau compte 15 parcelles : 7 en Haute-Vienne, 6 en Creuse et 2 en Corrèze.

Cette semaine, 12 parcelles du réseau ont été observées :

- 16 % sont au stade « reprise de végétation » (C1 BBCH30)
- 8 % sont au stade « entre nœuds visibles » (C2 BBCH31)
- 8 % sont au stade « boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales » (D1 BBCH 50)
- 16 % sont au stade « boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales/inflorescence principale dégagée » (D1/D2 BBCH50/53)
- 36 % sont au stade « inflorescence principale dégagée » (D2 BBCH 53)
- 16 % sont au stade « boutons séparés » (E BBCH57)

Photo le 02/03/2026 Colza stade D2 (BBCH 53)
A.LESIMPLE - CDA23



	semis	Variétés	Stade	Charençon tige du chou (cuvette)	Charençon tige du colza (cuvette)	Meligèthes (cuvette)	Nombre de Meligèthes / plante	Fréquence (% plantes touchées)		
								Pseudocerc osporella	Alternaria	Phoma
87-Eyjeaux	16/08/2025	LG Acropole	E	0	0	>30	6			
23-Evaux Les Bains P	18/08/2025	RGT Paradizze /2308	C2	3	10	10				
23- St Pierre Le Bost	18/08/2025	KWS Feliciano	D2	10	13	Présence	1,8			
87-St Martial/Isop	18/08/2025	Es Mambo	E		3	Présence	5			
23-Evaux Les Bains B	19/08/2025	Kanzzas / LG austin	C1	0	0					
87-Janailhac	19/08/2025	LG Avenger	D1/D2	2	1	12	0,5			
23-Le Grand Bourg	20/08/2025	Cezanne		Parcelle Non Observée						
87-Nexon	22/08/2025	LG Adeline	D1/D2	2	2	8	0,2			
87-Chaptelat	24/08/2025	DK Exagris	D2	0	26	> 30	0,15			
19-St Pantaléon de Lapleau	26/08/2025	LG Aviron	C1	0	0	0				
23-Bussière Dunoise	28/08/2025	LG Avenger		Parcelle Non Observée						
23-Ajain	28/08/2025	LG Avenger	D2	5	5	7				
87-St Maurice Les Brousses	28/08/2025	Nymphaea	D1		2	62				
19- St Mexant	03/09/2025	LG Adeline		Parcelle Non Observée						
87-La Meyze	05/09/2025		D2	0	0	Présence	2,5			

• Le charançon de la tige du colza

Reconnaître le charançon de la tige du colza et le différencier de celui de la tige du chou

Le charançon de la tige du chou, inoffensif pour le colza. Le corps est noir il est recouvert d'une abondante pilosité rousse. Il possède une tache blanchâtre entre le thorax et l'abdomen ainsi que le bout des pattes rousses.

Le charançon de la tige du colza, est le plus préjudiciable. C'est le plus **gros**, son corps est gris cendré, avec le **bout des pattes noires**.




Observations du réseau : cette semaine, il a été piégé des charançons du colza sur les 2/3 des parcelles observées (de 1 à 26 individus par piège).

Données de modélisation : Outil d'Aide à la Décision (OAD) pour prédire les vols de Charançon de la tige du colza



Pour accompagner la surveillance de vos colzas, Terres Inovia a construit un OAD de prédiction de vol du charançon de la tige du colza. Sur la base des captures relevées sur le territoire depuis 2011 par les observateurs BSV, et en se basant sur un réseau de stations météorologiques couvrant les différents bassins de production, le modèle sort une **courbe** de probabilité de piégeage sur la commune renseignée **Limoges 87** (jusqu'à J+7).



Lorsque la courbe se rapproche du seuil d'alerte (ligne en pointillés), vous devez vérifier régulièrement les captures dans votre cuvette.

Au-dessus de la ligne en pointillés, des captures de Charançon de la tige du colza sont fortement probables.

Une vue d'ensemble sur une **carte** de France est également consultable et représente la probabilité quotidienne de capture à la date sélectionnée (jusqu'à J+7).

Pour tester l'OAD, [cliquez ici](#).



Mardi 3 Mars 2026



Lundi 9 Mars 2026

Actuellement et pour les jours à venir, le risque modélisé de vols de charançons de la tige du colza est **avéré** sur le Limousin.

Période de risque : elle conjugue la présence de femelles aptes à pondre avec celle de tiges tendres

- Le risque pour la plante débute dès l'apparition des premiers entre-nœuds (passage de C1 à C2) et se poursuit jusqu'au stade E (boutons floraux séparés).
- En revanche, les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. La durée de maturation est variable mais on retient souvent un délai de 8 à 10 jours après les premières captures significatives.

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil pour le charançon de la tige du colza. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, sa seule présence dans les parcelles constitue un risque. La nuisibilité est due au dépôt des œufs dans les tiges en croissance provoquant leur déformation et surtout leur éclatement sur toute la longueur.

Evaluation du risque – charançon de la tige de colza

Avec les conditions climatiques (sec et doux) la période de risque étant actuellement en cours et le vol de charançons de la tige du colza étant avéré, **le risque est moyen à fort** surveillez vos parcelles.

• Meligèthes

Observations du réseau : il a été piégé des méligèthes dans toutes les parcelles excepté à St Pantaléon de Lapeau (19).

Il a été également dénombré de 0.15 à 6 méligèthes. Attention seuil de nuisibilité dépassé sur les parcelles d'Eyjeaux, La Meyze, St Martial/Isop (87) et St Pierre Le Bost (23).

Période de risque : du stade D1 (dégagement des boutons) au stade F1 (premières fleurs ouvertes)

Seuil indicatif de risque : il dépend notamment de l'état de la plante, du stade de la culture et des conditions climatiques avant la floraison :

Seuil indicatif de risque	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza sain et vigoureux	2 méligèthes par plante	4 à 6 méligèthes par plante
Colza handicapé et peu vigoureux	1 méligèthe par plante	2 à 3 méligèthes par plante

Evaluation du risque – Méligèthe

La majorité des colzas sont dans le stade sensible D1 (BBCH50) à E (BBCH 57), le **risque est fort** car les conditions climatiques sont très favorables à ce ravageur.



Photo le 02/03/2026 Colza avec Méligèthes
V.LACORRE - CDA87



Photo le 02/03/2026 Colza avec Méligèthes
A.FERREY - CDA87


Céréales à paille

Poursuite des conditions printanières jusqu'au week-end prochain puis installation d'un régime d'averses.

Le stade « épi 1 cm » (BBCH 30) est atteint pour les cultures plus précoces et devrait se généraliser dans les prochains jours pour tous les semis d'octobre.

La majorité est à « fin tallage » (BBCH 29)

20 parcelles ont été observées cette semaine : 8 blés, 10 orges, 2 triticales



Comment repérer le stade « épi 1 cm (BBCH 30) » ?

Ce stade marque non seulement le passage entre la phase de tallage et celle de montaison mais aussi le début de la sensibilité des céréales à paille à certaines maladies (oïdium, rouille jaune, piétin-verse). Le meilleur moyen de le déterminer est de prélever 20 plantes dans une zone homogène de la parcelle, en évitant les passages de roues et les bordures. Ensuite à l'aide d'un cutter ou bistouri, il faut couper le maître-brin (la tige la plus développée) de chaque plante dans le sens de la longueur pour mesurer la distance entre le sommet de l'épi et le plateau de tallage (au niveau du point d'insertion des racines).



Le stade « épi 1 cm » est atteint lorsque la hauteur ainsi mesurée est en moyenne de 1 cm

• Piétin verse

Croiser le contexte parcellaire et la variété pour évaluer les risques

Les symptômes de cette maladie (champignon provoquant une rupture d'alimentation) qui se manifestent au bas de la tige sous forme de nécrose ovale peuvent être identifiés dès le stade « épi 1 cm » (BBCH 30).

L'estimation du risque piétin verse est largement déterminée par les conditions agronomiques de la parcelle (potentiel infectieux, milieu physique, variété et date de semis) et la prise en compte du climat de la levée du blé jusqu'au début montaison.

Le meilleur moyen de lutte contre le piétin verse est le choix variétal et/ou allonger la rotation avec un retour moins fréquent des céréales à paille.



1ère étape : Evaluer le risque agronomique de la parcelle à l'aide de la grille d'évaluation du risque piétin-verse proposée par Arvalis, Institut du Végétal. Les informations relatives aux indices climatiques TOP sont publiées chaque semaine dans le Bulletin de Santé du Végétal (BSV).

Effet variétal

Tolérance variétale
 Note CTPS >= 5
 Note CTPS 1 ou 2
 Note CTPS 3 ou 4

Potentiel infectieux

Précédent
 Blé
 Autre
 Travail du sol
 Labour
 Non labour

Milieu physique

Type de sol :

Limons battants, Limons battants hydromorphes, Terre rouge à châtaigniers, Limons argileux profonds assez battants, Limons argileux caillouteux superficiels sur argile à silex.	2
Argilo-calcaires profonds (groie moyenne à profonde), Champagne, Aubue profonde et moyenne, Doucin argileux, Alluvions sablo argileuses caillouteuses, Limon profond sur schistes non battants. Limon argileux non battant	1
Argile, Argilo calcaire superficiel (groie superficielle), Sables salins, Marais, Sable limoneux/granite.	0

Effet climatique

Effet année issu du modèle TOP
 Indice TOP inférieur à 30
 Indice TOP entre 30 et 45
 Indice TOP supérieur à 45

Score de risque final

Risque faible : aucune intervention

Risque final / conseil associé

0	risque FAIBLE
1	Aucune intervention n'est requise
2	
3	
4	
5	
6	
7	risque MOYEN :
8	Observation conseillée et traitement si plus de 35% de tiges touchées ou si présence de la maladie sur la parcelle les années passées
9	risque FORT :
10	Traitement conseillé

ARVALIS-Institut du végétal 2017

NOUVEAU : en cas de mélange variétaux, faire la moyenne des notes piétin-verse des variétés composant le mélange pour compléter la case « effet variétal ». Si les variétés ne sont pas connues, prendre le score de 4 de la grille.

2ème étape :

Valoriser la résistance variétale : quand le risque piétin verse est élevé (limons, semis précoce, seconde paille... voir grille), il faut privilégier une variété résistante, c'est à dire une variété ayant une **note piétin verse supérieure ou égale à 5**.

Synthèse :

- Variétés avec une note de résistance de 5 ou plus : Pas de traitement spécifique nécessaire (la rentabilité n'est pas assurée).
- Variétés avec une note de résistance comprise entre 1 et 4 : Evaluer le risque agronomique en cours de campagne grâce à la grille présentée en étape 1.

Sensibilités au piétin-verse – Que choisir – Arvalis - 2025

Résistance des variétés de blé tendre au piétin verse - échelle 2025									
Références				Nouveautés et variétés récentes					
Assez résistants									
LG AIKIDO				8	PAILLEDOR				
JUNIOR				7	GEOPOLIS	KWS GLOBE	LID MACUMBA	SU HYBISCUS	SU PULSION
					SU SAUVIGNON				
LG AUDACE	KWS ULTIM	KWS SPHERE	INTENSITY		BELZEBUTH	CHAMDOR	KARABOL	KWS ETOILE	LG AERO
	SU HYREAL	RGT LUXEO	PRESTANCE	6	LG NIKLAS	OUTDOOR	RGT LOOKEO	SU ELECTRON	SU HISTORIC
					THERMIDOR WPB MEDINA				
PONDOR				5	CONQUISTADOR	FABULOR	GODZILLA	KAKTUS	LG ACROBAT
					LID PAVANE	RGT PROFUSIO	SU HYANKEE	SU HYLORD	
Moyennement sensibles									
SY TRANSITION		PIBRAC	KWS ASTRUM	4	INTRODUCTOR	RGT NOBELLO			
KAROQUE	JERIKO	COMPLICE	CHEVIGNON		ACADEMY	AUCHY	FACILITY	GENERIK	KARDIGAN
RGT PROPULSO	RGT LETSGO	KWS EXTASE	KWS ERRUPTIUM	2.6	KINGKONG	KWS MILLESIME	RGT FARMEO	RGT INDEXO	RGT KOESIO
SHREK					RGT MAJESKO	RGT SUNDEO	RGT VALPARAISO	SPIROU	SU MASTER
Très sensibles									
LG ABILENE	KWS PERCEPTUM	CELEBRITY	BALZAC	2	ACCOMPLY	OLAF	SU HORIZON	SU HYCLASS	
	RGT TWEETEO	RGT PACTEO	LG ABRAZO						
() à confirmer									
Source des données : CTPS/GEVES									

Noter que les efficacités des solutions anti-piétin ont perdu en efficacité ces dernières années et atteignent aujourd’hui moins de 50% d’efficacité pour les meilleurs.


Observations du réseau :

Aucun symptôme relevé au champ.

Données de modélisation :

Indice de risque calculé au 01/03/2026 par le modèle Top (Arvalis) sur la station de Limoges Bellegarde pour un semis fictif **très précoce** du 01/10/2025 (courbe orange) : **Note 1** à reporter sur la grille d’évaluation.

Interprétation du modèle : chaque pallier représente une contamination ; la hauteur du pallier représente l’intensité de la contamination.



Le modèle s’interprète au stade épi 1 cm. Avant, il permet de donner une tendance.

- Risque faible : indice TOP < 30 ;
- Mise en alerte : 30 < indice TOP < 45 ;
- Risque fort : indice TOP > 45.

Calcul au 28/02/2026 de l’indice de risque par sensibilités variétales et dates de semis : [suite logique](#)
Baromètre maladie Arvalis – Module Top

Risque faible (-1)	Station Météo	APACHE (2- Très Sensible)		LG ABSALON (6-Peu sensible)	
Risque modéré (1)		15/10/2025	05/11/2025	15/10/2025	05/11/2025
Risque fort (2)					
Département 87	LIMOGES	-1	Hors estimation	-1	Hors estimation
	MAGNAC-LAVAL	-1	Hors estimation	-1	Hors estimation
Département 23	GENOUILLAC	1	Hors estimation	-1	Hors estimation
	LA SOUTERRAINE	-1	Hors estimation	-1	Hors estimation
Département 19	BAR	-1	Hors estimation	-1	Hors estimation
	BRIVE	1	-1	-1	Hors estimation

Période de risque :

A partir d’épi 1 cm

Seuil indicatif de risque :

A partir de 35% de tiges présentant une nécrose.

Evaluation du risque – Piétin-verse

L'analyse de risque ne débute pas avant « épi 1 cm » mais noter que le risque est nul sur variétés tolérantes quelques soient les conditions.

Le modèle Top indique une tendance climatique favorable au développement de la maladie sur variétés très sensibles et semis précoces, tendance qui devra être confirmée dans les semaines à venir si les conditions demeurent pluvieuses.

Les variétés de triticales sont peu sensibles à tolérantes au piétin-verse. Il est inutile de prendre en compte cette maladie dans les stratégies fongicides sur cette culture.



Méthodes alternatives

En situations agronomiques « à risque », privilégier les variétés peu sensibles au piétin-verse (Notes GEVES $\geq$ à 5)

- **Oïdium/Rouille jaune**

L'**oïdium** sur blé, orge et triticales doit être surveillé dès épi 1 cm, notamment sur variétés sensibles.

La présence de foyers de **rouille jaune** sur blé et triticales doit également être contrôlée à partir d'épi 1 cm.

Peu de cultures ont atteints les stades de sensibilités.

- **Rhynchosporiose**

Signalement d'attaque précoce sur triticales à Saint Vaury (23), variété très sensible RGT OMEAC (90% F2, 100% F3).

La gestion du risque ne doit pas intervenir avant 1 nœud (BBCH 31).



Gestion des résistances aux fongicides sur céréales à paille :

[Lisez la note commune 2026 INRAE/ANSES/ARVALIS/FNAMS](#)

Prochain bulletin : Mardi 10 mars 2026

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes : FREDON N-A, Chambres d'Agriculture 19, 23 et 87, OCEALIA, Agricentre Dumas, Agriaxe, Sébastien Pinthon, Marc Bonnet Agriculteurs, LPA La Faye - Saint Yrieix la Perche

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

