



Maraîchage

N°01
20/03/2026

Edition Sud Nouvelle-Aquitaine
Départements 19/24/33/40/47/64

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)



Animateur filière
Louise FURELAU-MEYNIER
FREDON N-A
louise.furelau@fredon-na.fr

Directeur de publication
Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision
DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

*Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Maraîchage
Edition Sud NA
N°X du JJ/MM/AA »*

Ce qu'il faut retenir

Situation météorologique

Le **tableau** ci-dessous récapitule le risque de la semaine passée et à venir **pour chaque bioagresseur** selon ce code couleur :

| | | | | |
|-------------|--------|--------|------|-----------|
| Très Faible | Faible | Modéré | Fort | Très Fort |
|-------------|--------|--------|------|-----------|

Tomates

| Bioagresseur | Semaine passée | Semaine à venir |
|--------------|----------------|-----------------|
| Botrytis | Très Faible | Très Faible |
| Aleurodes | Très Faible | Faible |
| Pucerons | Faible | Fort |

Aubergine

| Bioagresseur | Semaine passée | Semaine à venir |
|--------------|----------------|-----------------|
| Punaises | Très Faible | Faible |
| Sciarides | Faible | Faible |

Poivron/piment

| Bioagresseur | Semaine passée | Semaine à venir |
|--------------|----------------|-----------------|
| Sciarides | Faible | Faible |





Produits de biocontrôle

Consultez la *note de service DGAL/SDSPV* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macroorganismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

De manière générale et pour toutes les cultures, observez et soyez vigilant quant à la conservation de vos auxiliaires naturels dans vos stratégies de protection des cultures.

Situation météorologique

Au cours des deux dernières semaines, la région de Nouvelle-Aquitaine a connu une ambiance globalement douce pour la saison, dans la continuité de cette fin d’hiver atypique. Les températures se sont régulièrement situées au-dessus des normales, avec des maximales souvent comprises entre 12 et 18°C, et des minimales oscillant entre 4 et 9°C. Cette période est restée assez dynamique, avec une alternance de passages perturbés et d’accalmies. Plusieurs perturbations atlantiques ont traversé la région, apportant des pluies faibles à modérées, parfois plus soutenues sur le littoral aquitain et les zones de relief. Entre ces épisodes, les éclaircies ont été de plus en plus fréquentes à mesure que l’on avançait vers la mi-mars.

Pour la semaine à venir, la tendance reste fidèle à un mois de mars classique en Nouvelle-Aquitaine. Après un début de semaine relativement calme et par moments ensoleillé, une évolution plus instable est attendue. Des passages nuageux plus fréquents devraient circuler, accompagnés d’averses parfois irrégulières, dans un flux océanique persistant. Les températures devraient demeurer assez douces en début de période, avec des minimales comprises entre 0 et 10°C et des maximales allant de 11 à 22°C. Une légère baisse pourrait toutefois s’amorcer en seconde partie de semaine, sous l’effet d’un flux d’ouest plus perturbé. Dans l’ensemble, le temps restera changeant, alternant entre éclaircies et averses.

Prévision du 19 au 25 mars 2026 (source : Météo France)

| Station | Prévisions pour les 7 jours à venir : | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JEUDI 19 | VENDREDI 20 | SAMEDI 21 | DIMANCHE 22 | LUNDI 23 | MARDI 24 | MERCREDI 25 |
| Agen (47) | 10° / 20° ▼ 20 km/h | 3° / 22° ▼ 10 km/h | 1° / 19° ▼ 5 km/h | 3° / 19° ▲ 15 km/h | 3° / 18° ▼ 5 km/h | 3° / 19° ► 10 km/h | 6° / 15° ▲ 20 km/h |
| Podensac (33) | 8° / 20° ◀ 20 km/h | 4° / 21° ▼ 10 km/h | 3° / 21° ► 10 km/h | 4° / 19° ▼ 15 km/h | 2° / 19° ◀ 10 km/h | 4° / 20° ► 15 km/h | 7° / 15° ▲ 20 km/h |
| Bassillac (24) | 5° / 20° ▼ 10 km/h | 0° / 21° ↻ 5 km/h | 0° / 20° ► 10 km/h | 1° / 18° ▼ 15 km/h | 1° / 19° ▼ 10 km/h | 2° / 19° ▲ 10 km/h | 5° / 14° ▲ 20 km/h |
| Beaulieu-sur-Dordogne (19) | 8° / 20° ↻ 5 km/h | 1° / 21° ↻ 5 km/h | 1° / 19° ▲ 10 km/h | 1° / 17° ► 10 km/h | 2° / 19° ▼ 10 km/h | 1° / 19° ▲ 10 km/h | 3° / 13° ▲ 15 km/h |

Tomates

→ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **18 hectares** de cultures de tomates sous serre en Lot-et-Garonne.

Maladies

- **Botrytis** (*Botrytis cinerea*)

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Des symptômes relatifs à ce champignon parasite sont déjà observés en ce début de saison, bien qu'on ne les retrouve pour le moment que sur 5 % des exploitations surveillées du secteur. Les intensités d'attaques sont elles aussi encore très faibles.

Evaluation du risque :

Cette semaine le risque est très **faible**. Les conditions actuelles, fraîches et humides, favorisent la survie du champignon mais ralentissent son développement. Le risque augmentera rapidement si les conditions deviennent plus douces et humides, surtout au niveau des fleurs fanées et des fruits endommagés. Une surveillance régulière et une gestion de l'humidité et des débris végétaux sont donc recommandées.

Méthodes prophylactiques

- Enlever les parties contaminées.
- Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au *Botrytis* et pratiquer la rotation des cultures.
- Eliminer les débris végétaux (feuilles, fruits non récoltés...) régulièrement.
- Une bonne maîtrise du climat est primordiale afin d'éviter les excès d'humidité et de condensation sous abris : aérer les cultures en effeuillant et en respectant les densités de plantation.

Ravageurs

- **Aleurodes**

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Leur présence est signalée sur plus d'1/4 d'ateliers touchés du secteur, avec là encore une très faible intensité d'attaques.

Seuil indicatif de risque

On considère que le risque est **élevé** lorsque l'on observe plus de **10 individus/plant**.

Evaluation du risque :

Cette semaine le risque est **faible**. Dans le contexte climatique actuel en Nouvelle-Aquitaine, la pression des aleurodes reste à surveiller attentivement, notamment sous abri. Les conditions météorologiques, avec des températures régulièrement supérieures à 15-20°C en journée, sont favorables à leur développement et à l'accélération de leur cycle biologique. Pour rappel, les **aleurodes** sont **vecteurs de virus**. *Bemisia tabaci* véhicule le virus ToLCNDV (*Tomato Leaf Curl New Dehli Virus*) et le ToCV (*Tomato Chlorosis Virus*).

Méthodes prophylactiques

- Détecter les premiers individus à l'aide de plaques jaunes engluées.
- Éliminer rapidement les feuilles infestées et les résidus de culture.
- Détruire les plants fortement attaqués en fin de cycle.
- Nettoyer les abris (structures, outils) entre deux cultures.
- Éviter la proximité avec d'autres cultures sensibles (aubergine, concombre).
- Maintenir une bonne aération pour limiter les conditions trop favorables.



Produits de biocontrôle : Faire des lâchers d'auxiliaires tels que *Encarsia formosa*, *Macrolophus pygmaeus* et *Eretmocerus eremicus*.
Renseignez-vous sur les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

• Pucerons

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : On signale des individus sur 1/4 des sites suivis du réseau et près d'1/3 des plants des exploitations sont affectés par des dégâts (principalement sur jeunes organes).

Evaluation du risque :

Bien que leur présence soit encore **faible** voire **modérée** sur certains sites, dans le contexte de douceur observé ces dernières semaines, leur activité a progressivement repris. **Les températures actuelles, souvent supérieures à 10–12°C et parfois plus élevées en journée, sont favorables à leur développement et à une multiplication rapide**, notamment en cas de conditions abritées ou peu ventilées.

Une attention particulière doit être portée à l'évolution des foyers, car les pucerons peuvent coloniser rapidement les cultures et entraîner des dégâts directs, mais aussi favoriser la transmission de virus. Une surveillance régulière des parcelles est donc recommandée afin de détecter précocement toute montée en pression.

Méthodes prophylactiques

- Éliminer les adventices autour et dans les parcelles.
- Supprimer les plants ou parties de plants infestés.
- Maintenir une bonne aération, surtout sous abri, pour réduire les conditions favorables à la prolifération.
- Observer régulièrement les jeunes organes des plants.
- Installer éventuellement des pièges englués pour détecter précocement les populations.
- Utiliser des auxiliaires parasitoïdes tels que *Aphelinus abdominalis*, *colemani*, *ervi* ou encore des insectes prédateurs comme *Aphidoletes aphidimyza*, *Macrolophus pygmaeus*, chrysopes, syrphes ou coccinelles.
- Utiliser les plantes de service : le thym et les œillets d'Inde éloignent les pucerons, la capucine les attire.
- **Pour favoriser les ennemis naturels ciblés, des infrastructures agroécologiques (bandes enherbées/haies diversifiées) peuvent être mises en place. Le site <https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/> propose des espèces végétales (flore, arbres et arbustes) adaptées à votre région et votre sol.**

Produits de biocontrôle

Des hyménoptères parasitoïdes des genres *Praon*, *Aphidius* et *Aphelinus* existent ainsi que de nombreux prédateurs (chrysope, syrphe, coccinelle, cécidomyie). Renseignez-vous sur les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire. Des PNPP, utilisables en agriculture bio existent aussi tels que la préparation à base d'ortie.

Aubergine

➔ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **15 ha** de cultures en Lot-et-Garonne.

Ravageurs

• Punaises (*Nezara viridula*)

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : On observe des individus adultes (notamment **Nezara**) sur moins d'1/4 des parcelles visitées du réseau avec une intensité d'attaques encore anecdotique.

Evaluation du risque :

Cette semaine, le risque relatif à ces individus est encore **faible**, mais les conditions météorologiques relativement douces favorisent une activité précoce et une possible augmentation des populations. Les piqûres sont observables en particulier sur les boutons floraux et les jeunes fruits, pouvant induire des dégâts directs. Un suivi régulier des cultures est recommandé pour détecter toute montée en pression et anticiper les mesures de gestion.

Méthodes prophylactiques

- Observer fréquemment les jeunes feuilles, boutons floraux et fruits pour détecter les piqûres ou la présence d'adultes et de larves.
- Éliminer ou détruire les plants fortement infestés pour éviter la propagation.
- Retirer les adventices et les plantes hôtes secondaires autour des parcelles, qui servent de réservoirs.
- Maintenir une bonne aération et éviter l'excès d'humidité qui favorise leur survie et leur prolifération.
- Favoriser les ennemis naturels (oiseaux, amphibiens, araignées, libellules, et hyménoptères parasitoïdes ((Tachinidae), *Trissolcus* et *Telenomus* (Scelionidae), *Anastatus* (Eupelmidae) et *Ooencyrtus* (Encyrtidae)).
- Traitements à base du nématode *Steinernema carpocapsae* contre *Nesidiocoris*.
- Introduction d'auxiliaires *Trissolcus basalus* contre la *Nezara viridula*.

• Sciarides

Diptères grêles, souvent noirs, morphologiquement proches des Cecidomyiidae. Les larves s'attaquent aux organes végétatifs souterrains des plantes cultivées sous-abris ou sont mineuses de feuilles et de tiges.

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : On en observe d'ores et déjà sur la totalité des ateliers surveillés du secteur, à l'instar de l'intensité des attaques sur plants. Il s'agit pour le moment seulement de détections, aucuns dégâts n'est encore à déplorer.

Pour rappel, les larves se développant dans le sol se nourrissent des racines et des jeunes tissus, ce qui peut ainsi ralentir la croissance des plantes, provoquer un jaunissement ou un affaiblissement, et à terme réduire la vigueur des fruits dans le cas où les populations sont trop nombreuses.

La situation est semblable en cultures de **poivron / piment**.

Evaluation du risque :

Pour le moment, le risque estimé est encore **faible**. Ils peuvent néanmoins représenter un risque dans les cultures sous abri, notamment quand les substrats restent humides et riches en matière organique (conditions favorables à leur reproduction et au développement des larves dans le sol ou le substrat).

Les conditions humides associées aux températures modérées sous abri constituent un contexte propice aux proliférations des populations, surtout en phase de croissance active des jeunes plants. Une surveillance des substrats et des plants, notamment autour des jeunes racines, reste donc recommandée pour détecter toute présence précoce et anticiper une montée en pression.

Méthodes prophylactiques

- Éviter l'excès d'eau et les substrats détrempés et maintenir un arrosage équilibré pour limiter les conditions favorables aux larves.
- Assurer un bon drainage et une aération des substrats.
- Retirer les feuilles mortes et les débris végétaux sur et autour des plants.
- Observer régulièrement les jeunes racines et les plants pour repérer les larves et signes d'affaiblissement.
- Introduire des prédateurs naturels ou nématodes entomopathogènes spécifiques aux larves de sciarides comme *Steinernema feltiae*.
- Favoriser un écosystème d'auxiliaires dans les cultures sous abri.
- Utiliser des substrats stérilisés ou traités pour limiter la présence initiale des larves.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Maraîchage / Edition Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes :

Cadralbret, CDA 47, ATFL Gironde, CDA33, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Bio Pays Landais, INVENIO, EPLEFPA de Ste Livrade, Midi Agro Consultant, Scaafel / Belloc Sud-Ouest, Valprim, VDL, Vitivista, Terre du Sud, Koppert, , Agrobio 40, Agrobio Périgord, Agrobio 33, CIVAM Bio du Pays Basque, CIVAM Bio du Béarn, Bio Pays Landais, Top Légumes, Vallée du Lot, Biobest, ALCOR Agro-Solutions, CTIFL Lanxade, La Ceinture Verte de Pau, La Ceinture Verte Nouvelle-Aquitaine + agriculteurs et observateurs.

Parcelles de références : FREDON Nouvelle-Aquitaine (toutes cultures)

.....
• **Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).**
.....