



N°05
28/05/2025



Animateur filière

Louise FURELAU-MEYNIER
FREDON N-A
louise.furelau@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Maraîchage
Edition Sud NA
N°05 du 28/05/2025 »



Edition Sud Nouvelle-Aquitaine

Départements 19/24/33/40/47/64

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Consultez les [événements agro-écologiques](#) près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Situation météorologique

Le **tableau** ci-dessous récapitule le risque de la semaine passée et à venir **pour chaque bioagresseur** selon ce code couleur :

Très Faible	Faible	Modéré	Fort	Très Fort
-------------	--------	--------	------	-----------

Tomates

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<i>Agrobacterium spp.</i>		
<i>Botrytis cinerea</i>		
Aleurodes		

Aubergine

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<i>Botrytis cinerea</i>		
Punaises		
Pucerons		
<i>Tuta absoluta</i>		

Poivron/piment

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
Pucerons		
Sciarides		
Punaises		

Concombre

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<i>Botrytis cinerea</i>		
Acariens		



Produits de biocontrôle

Consultez la *note de service DGAL/SDSPV* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

De manière générale et pour toutes les cultures, observez et soyez vigilant quant à la conservation de vos auxiliaires naturels dans vos stratégies de protection des cultures.

Situation générale

Entretien des cultures : Les cultures en place sous serres chauffées poursuivent leur développement.

Situation météorologique

Les températures moyennes de ces deux dernières semaines ont globalement été équivalentes aux moyennes de saison voire légèrement au-dessus (jusqu'à 2°C de plus par secteur). Les minimales étaient comprises entre 6 et 14°C et les maximales entre 17 et 32°C.

La pluviométrie de ces deux dernières semaines a été assez hétérogène selon les localisations, surtout depuis lundi dernier où nous avons pu retrouver selon les secteurs des précipitations allant de légères à diluviennes (apportant jusqu'à plus de 35 mm par endroit, surtout en Lot-et-Garonne).

Cette semaine nous devrions retrouver de belles éclaircies ainsi que des températures assez hautes sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine (jusqu'à 31°C de prévus par endroit). Néanmoins les averses ainsi que les orages seront de retour dès ce week-end.

Prévision du 28 mai au 3 juin 2025 (source : Météo France)

Station	Prévisions pour les 7 jours à venir :						
	MERCREDI 28	JEUDI 29	VENDREDI 30	SAMEDI 31	DIMANCHE 01	LUNDI 02	MARDI 03
Agen (47)	 11° / 27° ▲ 15 km/h	 14° / 30° ► 5 km/h	 14° / 32° ▼ 10 km/h	 16° / 33° ▲ 10 km/h	 16° / 28° ▲ 15 km/h	 15° / 24° ▲ 10 km/h	 13° / 22° ► 20 km/h
Podensac (33)	 9° / 25° ▲ 15 km/h	 12° / 30° ► 5 km/h	 12° / 33° ↻ 5 km/h	 16° / 33° ▲ 10 km/h	 15° / 28° ▲ 15 km/h	 14° / 24° ► 10 km/h	 12° / 22° ► 15 km/h
Bassillac (24)	 11° / 26° ▲ 15 km/h	 13° / 28° ◀ 10 km/h	 15° / 33° ► 15 km/h	 16° / 30° ► 15 km/h	 15° / 28° ▲ 20 km/h	 14° / 21° ► 20 km/h	 12° / 22° ► 20 km/h

Tomates

→ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **75,3 hectares** de cultures de tomates sous serre en Lot-et-Garonne.

Maladies

- ***Agrobacterium spp.***

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Cette semaine on relève la présence de cette bactérie pathogène sur presque 1/3 des exploitations surveillées avec les 3/4 des plantes impactées par les symptômes. L'intensité des attaques varie actuellement de moyenne à forte selon les sites touchés.

Evaluation du risque : Le risque de développement de ce bioagresseur est actuellement **moyen**. **Il convient de continuer à surveiller vos serres.**

Méthodes prophylactiques

- Nettoyer et désinfecter soigneusement les pépinières et les abris

- **Cladosporiose**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des signalements ont été réalisés sur quelques parcelles suivies du réseau (<2%) avec plus de 3/4 des plantes présentant des symptômes (intensité faible).



Taches chlorotiques de Cladosporiose (Crédit photos : L. FURELAU-MEYNIER – FREDON NA & *Ephytia*)

Evaluation du risque : Le risque de développement de ce bioagresseur est actuellement **faible**, du fait du temps pluvieux de ces derniers jours. **Il convient de continuer à surveiller vos serres.**

Méthodes prophylactiques

- Vérifier sur les faces supérieures des feuilles l'absence de taches chlorotiques jaunâtres accompagnées de légers feutrages de moisissures verdâtres par-dessus. Les premières à être attaquées sont généralement les feuilles du bas.
- Enlever les feuilles atteintes pour éviter de contaminer les autres.

- **Botrytis cinerea (pourriture grise)**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Cette semaine, la présence de ce champignon parasite a significativement diminué. On retrouve toujours des symptômes mais désormais seulement sur 1/4 des exploitations surveillées du secteur. Les intensités d'attaques se sont quant à elles stabilisées (environ 5% de plants impactés par atelier). Quelques chancres de la maladie sont observés sur tige. La pression est néanmoins assez variable : elle est dite faible à moyenne selon les secteurs.



Symptômes du *Botrytis* sur feuilles et fruits (Crédit photos : Ephytia)

Evaluation du risque : Avec les températures plutôt chaudes prévues ces prochains jours, le risque de développement du *Botrytis* est repassé à **faible**. **Continuez à surveiller vos serres !**

Méthodes prophylactiques

- Enlever les parties contaminées.
- Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au *Botrytis* et pratiquer la rotation des cultures.
- Eliminer les débris végétaux (feuilles, fruits non récoltés...) régulièrement.
- Une bonne maîtrise du climat est primordiale afin d'éviter les excès d'humidité et de condensation sous abris : Aérer les cultures en effeuillant et en respectant les densités de plantation.

- **Oïdium**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Quelques taches poudreuses sont encore observées sur 1/4 d'exploitations suivies. L'intensité d'attaque sur les plants a quant à elle légèrement diminué depuis le dernier BSV (seuls 7% sont maintenant touchés).

Evaluation du risque : **Restez vigilants et observez vos parcelles** : le risque est encore **faible**, mais pourrait augmenter dès le retour d'un temps plus ensoleillé.

Méthodes prophylactiques

- Réaliser une désinfection des structures et une suppression des adventices (hôtes potentiels des champignons)
- Raisonner la fertilisation & pratiquer la rotation des cultures
- Eliminer les débris végétaux, les feuilles atteintes, les plantes hôtes (sénéçon, datura)
- Veiller à une bonne maîtrise du climat, en évitant un excès d'humidité
 - Observer régulièrement vos plants, la détection des premiers symptômes est primordiale car une fois déclarées, ces maladies sont difficiles à contrôler



➤ Produits de biocontrôle et autres méthodes alternatives

- La bactérie *Bacillus amyloliquefaciens*. D'autres produits existent. Consulter la liste [ici](#).
- Des SDP, Stimulateurs de Défense des Plantes, peuvent également être utilisés.

• Mildiou

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Nous relevons cette semaine quelques symptômes sur certaines parcelles impactées du secteur (<1/4). Le peu d'ateliers touchés présente également une faible intensité d'attaque du pathogène avec là encore moins d'1/4 de plants touchés.

Evaluation du risque : **Restez vigilants et observez vos parcelles** : le risque est encore **faible**, mais pourrait augmenter dès le retour d'un temps plus ensoleillé.

Méthodes prophylactiques

- Aérer les abris.
- Maintenir un bon désherbage.

Ravageurs

• Acariose bronzée (causée par *Aculops lycopersici*)

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Cette semaine, on recense des symptômes sur moins d'1/4 d'ateliers du réseau avec de rares plantes affectées par les dégâts.

Evaluation du risque : Observez vos parcelles, même si le risque relatif est pour le moment encore **faible**.

Méthodes prophylactiques

- Maintenir la serre propre, sans adventices
- Limiter la présence de plantes hôtes (liseron, morelle, datura...) à proximité de la serre.
- Eliminer les déchets de cultures régulièrement
- Mettre en place un nettoyage complet en fin de culture
- Une détection précoce est indispensable pour gérer ce ravageur

• Aleurodes

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : A l'instar de l'intensité d'attaque, leur présence se fait ressentir sur plus d'1/3 d'ateliers du secteur. Les dégâts causés ont significativement augmenté depuis le dernier BSV : plus des 3/4 des plants sont impactés. Des individus sont aussi repérés sur environ 2 ha d'exploitations en bio.

Seuil indicatif de risque : Au-dessus de 100 aleurodes par plante.

Evaluation du risque : Cette semaine le risque est **moyen**. Pour rappel, les aleurodes sont vecteurs de virus. *Bemisia tabaci* véhicule le virus ToLCNDV (*Tomato Leaf Curl New Dehli Virus*) et le ToCV (*Tomato Chlorosis Virus*).

Méthodes prophylactiques

- Détecter les premiers individus à l'aide de plaques jaunes engluées.



Produits de biocontrôle : Faire des lâchers d'auxiliaires tels que *Encarsia formosa*, *Macrolophus pygmaeus* et *Eretmocerus eremicus*.

Renseignez-vous sur les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

• Punaies (*Cyrtopeltis*, *Nezara*, *Nesidiocoris* & *Halyomorpha*)

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On signale cette semaine des ***Cyrtopeltis*** sur 3 sites dont 1 où la situation semble délicate. De manière générale on dénombre à présent moins d'1/4 de plants touchés et une faible intensité.

Quelques signalements de **Nezara** ont également été faits sur moins d'1/4 des ateliers et avec un peu moins d'1/3 de plantes touchées pour le moment.

Les punaises **Nesidiocoris** sont aussi signalées sur quelques parcelles du secteur. La gravité des attaques est encore modérée mais environ près de la moitié des plants semblent avoir été touchés.

De plus, la présence des punaises **Halyomorpha halys (diaboliques)** commence elle aussi à s'intensifier dans ce secteur.

Evaluation du risque : Sans moyen de lutte efficace, les punaises présentent un risque non négligeable. De plus, elles sont vectrices de bactéries et de levures pouvant endommager les fruits. Cette semaine, le risque estimé est encore **faible**. **Surveillez vos ateliers dès le retour de conditions plus ensoleillées.**

Méthodes prophylactiques

- Enlever et détruire manuellement les adultes, les larves et les œufs observés sur les cultures.
- Enlever et détruire les débris végétaux et les résidus de culture.
- Entretenir les abords de parcelle et parcelles en jachères.
- Installer des filets insect-proof aux ouvertures des abris.
- Favoriser les ennemis naturels (oiseaux, amphibiens, araignées, libellules, et hyménoptères parasitoïdes ((Tachinidae), *Trissolcus* et *Telenomus* (Scelionidae), *Anastatus* (Eupelmidae) et *Ooencyrtus* (Encyrtidae)).
- Installation de panneaux englués jaunes pour la détection et le piégeage de *Nesidiocoris*.
- Traitements à base du nématode *Steinernema carpocapsae* contre *Nesidiocoris*.
- Introduction d'auxiliaires *Trissolcus basalis* contre la *Nezara viridula*.

• *Tuta absoluta*

Comment différencier les larves *Tuta absoluta* et la mineuse *Agromyzidae* ? (Crédit photo : ephytia.inra.fr)


Tuta absoluta



Larves et adulte de *Tuta*

Mouches mineuses du genre *Agromyzidae*

Famille de diptères cyclorraphes, dont les asticots sont phytophages, mineurs de feuilles ou foreurs de tiges.



Larves (a), pupe (b) et Mouche *Agromyzidae* (c)

Dégâts de *Tuta absoluta*



Sur les feuilles apparaissent des **grandes galeries blanchâtres** relatives au parenchyme dévoré par la larve laissant l'épiderme à nu. Ces taches deviennent ensuite brunes et nécrotiques. La larve attaque aussi bien les feuilles que les fruits.

Des excréments noirs sont visibles sur les feuilles. Dans les mines, on relève des **larves de lépidoptères** (photo ci-dessus) de couleur crème lors du stade L1 à une couleur verdâtre/rose clair pour les 3 autres stades.

Dégâts de la mineuse (*Liriomyza trifolii*)



Mines de la mineuse américaine ***Liriomyza trifolii*** dont l'hôte est principalement la tomate en France.

Sur les feuilles apparaissent de **fines mines plus ou moins nombreuses** le long des nervures. Dans les mines, on peut relever des larves de **diptères (asticot)** de couleur crème à la naissance puis jaune brillant ensuite.

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On signale encore des individus sur les sites à historique avec moins d'1/4 d'exploitations touchées. L'intensité des attaques a significativement réaugmenté depuis le dernier BSV en passant désormais à plus de la moitié de plantes impactées.

Evaluation du risque : La vigilance est de mise notamment dans les parcelles à historique. Le risque est encore **faible**.


Méthodes prophylactiques

- Installer des pièges à phéromones pour repérer le début du vol de la ***Tuta absoluta***
- Éliminer les feuilles, fruits et tiges atteints, voire le plant entier s'il est fortement attaqué
- Ramasser et détruire les fruits et les débris végétaux au sol
- Mettre en place la confusion sexuelle de la ***Tuta absoluta***
- En fin de culture, brûler les résidus de culture.

• Autres bioagresseurs

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : La présence de **mineuses** est actuellement signalée sur quelques ateliers surveillés du réseau (7%) et de très rares plants présentent des dégâts. Situation semblable pour les **pucerons**.



Pucerons sur tige et feuilles (Crédit photos : L. FURELAU-MEYNIER – FREDON NA)

On note également la présence d'**acariens** sur un peu plus d'1/4 des parcelles surveillées et de légers dégâts sont observés.

Aubergine

➔ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **20 ha** de cultures en Lot-et-Garonne.

Maladies

• *Botrytis cinerea* (pourriture grise)

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On observe des symptômes relatifs à ce champignon parasite sur la totalité des parcelles. L'intensité d'attaque a considérablement augmenté depuis la parution du dernier BSV : plus des 3/4 des plants sont affectés.

Évaluation du risque : Surveillez vos parcelles, le temps humide et doux favorise grandement cette maladie. Cette semaine, le risque est donc estimé **moyen** à **fort** selon les secteurs.

Méthodes prophylactiques

- Pratiquer une bonne aération des abris pour contrôler l'humidité.
- Enlever les parties contaminées.
- Effeuillement des parties âgées au plus près de la tige.



Produits de biocontrôle


Des substances naturelles d'origine fongique permettent de stimuler la défense des plantes. Consultez la liste des produits disponibles [ici](#).

Ravageurs

• Punaises (*Nezara*, *Halyomorpha*)

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On observe des individus (notamment la **Nezara** ainsi que la **Halyomorpha / diabolique**) sur la totalité des parcelles du réseau avec une intensité des attaques encore assez faible pour le moment ($< 1/3$). Des accouplements ainsi que des pontes et des larves sont signalés.



Nezara sur feuilles (Crédit photos : J. RIVIERE - SCAAFEL)

Évaluation du risque : Le risque relatif à ces individus cette semaine est estimé plutôt **fort**.

• Pucerons

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On en observe cette semaine sur la moitié des ateliers surveillés du secteur avec seulement 1/4 de plantes endommagées. Leur présence est aussi notable en bio. Sur certaines parcelles, on note également leur cohabitation avec des populations de **fourmis**.

Pour rappel : Les dégâts causés par les fourmis sont généralement minimes, mais il arrive toutefois que les populations soient plus importantes et par conséquent que les piqûres fragilisent trop la structure de plants (les piquant essentiellement au niveau des porte-greffes), pouvant ainsi causer une perte de rendements et ce sans solution adéquate. C'est le cas sur un plant d'un atelier du secteur.

Il est aussi probable qu'une augmentation des populations de fourmis peut être proportionnelle à celles des pucerons, qui, en échange d'une protection procurent aux fourmis des apports supplémentaires riches en sucre : du miellat.



Macrosiphum sur feuilles d'aubergine
(Crédit photo : B. CAVALON - CDA47)

Evaluation du risque : Cette semaine, le risque est redescendu à **moyen**. Restez vigilants, d'autant plus si les températures remontent !

Méthodes prophylactiques

- Éliminer les adventices dans la serre
- Utiliser des auxiliaires parasitoïdes tels que *Aphelinus abdominalis*, *colemani*, *ervi* ou encore des insectes prédateurs comme *Aphidoletes aphidimyza*, *Macrolophus pygmaeus*, chrysopes, syrphes ou coccinelles.
- Utiliser les plantes de service : le thym et les œillets d'Inde éloignent les pucerons, la capucine les attire.
- **Pour favoriser les ennemis naturels ciblés, des infrastructures agroécologiques (bandes enherbées/haies diversifiées) peuvent être mises en place.** Le site <https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/> propose des espèces végétales (flore, arbres et arbustes) adaptées à votre région et votre sol.



Produits de biocontrôle

Des hyménoptères parasitoïdes des genres *Praon*, *Aphidius* et *Aphelinus* existent ainsi que de nombreux prédateurs. Renseignez-vous sur les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire. Des PNPP, utilisables en agriculture bio existent aussi tels que la préparation à base d'ortie.

• Aleurodes

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des signalements d'aleurodes sont réalisés sur plus d'1/4 des parcelles surveillées du secteur avec encore peu de plantes touchées pour le moment. Pour l'heure, l'intensité des dégâts causés est toujours faible.

Evaluation du risque : Cette semaine, le risque est encore estimé **faible**. Restez vigilants !

• *Tuta absoluta*

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Cette semaine encore, on note la présence de ces individus sur la moitié des ateliers visités avec seulement 1/3 des plants touchés par les dégâts.

Evaluation du risque : La vigilance est de mise afin de suivre l'évolution des dégâts sur les cultures ! Le risque est encore **modéré**.

• Doryphores

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Les signalements d'individus, autant adultes que larvaires, se poursuivent : 1/3 des ateliers sont concernés mais encore très peu de plantes impactées pour le moment.



Accouplement, œufs et larve de doryphores (Crédit photos : L. FURELAU-MEYNIER – FREDON NA & B. CAVALON – CDA47)

Evaluation du risque : Restez vigilants afin de suivre l'évolution des populations même si le risque cette semaine est encore **faible**.

Mesures prophylactiques

- Enlever et détruire manuellement les adultes, les larves et les œufs observés sur les cultures.
- En plein champ, favoriser la présence des oiseaux qui font partie de leurs prédateurs.
- Pratiquez si possible la rotation des cultures entre plantes hôtes, les Solanacées, et non hôtes.
- Limitez la présence de repousses de solanacées et de plantes adventices et ornementales hôtes comme les morelles, le datura, le physalis, le lyciet et le tabac.



Produits de biocontrôle

Le bactérie *Bacillus thuringiensis* var. *tenebrionis* est entomopathogène. D'autres produits existent. Consulter la liste [ici](#).

• Autres bioagresseurs

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On note une fréquence d'observation pour les **acariens** équivalente à un peu plus d'1/4 d'ateliers touchés avec très peu de plantes endommagées.

On relève également la présence de **chenilles défoliatrices** sur de rares parcelles impactées (5%) avec très peu de dommages causés pour l'instant.

Poivron / Piment

→ Les observations pour réaliser ce BSV ont été réalisées sur **15 ha** de cultures en Lot-et-Garonne.

Ravageurs

• Pucerons

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des populations ont été repérées sur les 3/4 des exploitations surveillées sous forme de foyers. Des dégâts considérables sont également notables sur la moitié des plants.

Evaluation du risque : Bien que leur présence soit généralisée dans tout le secteur, le risque relatif à ces individus reste toujours estimé **fort**.



Les macro-organismes disponibles en PBI

- Les parasitoïdes : les micro-hyménoptères *Praon spp.*, *Aphidius spp.* et *Aphelinus spp.*
- Les prédateurs : la **chrysope**, le **syrphe**, la **coccinelle** et la **cécidomyie**.

Méthodes prophylactiques

- Eliminer les adventices dans la serre
- Détecter les premiers individus grâce aux panneaux jaunes englués

• Thrips

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Leur présence s'est intensifiée sur plus d'1/3 des exploitations surveillées avec encore très peu de plantes endommagées.

Evaluation du risque : Compte tenu des températures assez chaudes (voire trop) prévues pour les prochains jours, le risque estimé pour ces individus est plutôt **faible**.

- **Sciarides**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Les signalements pour ces ravageurs deviennent de plus en plus fréquents, à tel point qu'on les retrouve désormais sur un peu moins de la moitié des parcelles suivies du réseau. Plus des 3/4 des plants sont actuellement impactés.

Evaluation du risque : Cette semaine, le risque relatif à ces individus est dit **moyen**.

- **Punaises (*Nezara*)**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des individus ont été repérés sur plus des 3/4 des parcelles du réseau avec une intensité de dégâts encore très faible (<1/4). Tous les stades sont observés.

Evaluation du risque : Cette semaine, le risque d'évolution estimé de ce bioagresseur est estimé **fort**. Attention aux températures en augmentation prévues ces prochains jours, pouvant faciliter leur reproduction.

Concombre

➔ Les observations sur ces cultures ont été réalisées sur près d'**1,2 ha** de cultures en Lot-et-Garonne.

Maladies

- ***Botrytis cinerea* (pourriture grise)**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : Des symptômes relatifs à ce champignon pathogène ont été observés sur la moitié des ateliers visités du secteur. L'intensité de l'attaque est quant à elle assez faible (<1/4 de plantes atteintes).

Evaluation du risque : Après les derniers jours pluvieux ainsi que les températures estivales prévues prochainement, le risque est donc estimé **moyen**. **Restez vigilants !**

Ravageurs

- **Acariens**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On retrouve désormais des populations seulement sur la moitié des ateliers du réseau avec encore très peu de plants impactés (< 1/4).

Evaluation du risque : Cette semaine, le risque est estimé **modéré**. **Restez vigilants !**

- **Punaises**

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On retrouve des populations sur de rares ateliers concernés du réseau (7%) avec encore assez peu de plants impactés (un peu plus d'1/4).

Evaluation du risque : Le risque relatif à ces populations est encore estimé **faible**.

Panier de légumes

Situation sur le terrain

Lot-et-Garonne : On note une présence de plus en plus importante des **pucerons** adultes (*Macrosiphum* et *Aphis*) sur cultures de **courgettes** bio sous serre.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Maraîchage / Edition Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes : Parcelles flottantes :

Cadralbret, CDA 47, ATFL Gironde, CDA33, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Bio Pays Landais, INVENIO, EPLEFPA de Ste Livrade, Midi Agro Consultant, Scaafel / Belloc Sud-Ouest, Valprim, VDL, Vitivista, Terre du Sud, Koppert, , Agrobio 40, Agrobio Périgord, Agrobio 33, CIVAM Bio du Pays Basque, CIVAM Bio du Béarn, Bio Pays Landais, Top Légumes, Vallée du Lot, Biobest, ALCOR Agro-Solutions, CTIFL Lanxade, La Ceinture Verte de Pau, La Ceinture Verte Nouvelle-Aquitaine + agriculteurs et observateurs.

Parcelles de références : FREDON Nouvelle-Aquitaine (toutes cultures)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".