



Myrtille

N°10
05/08/2026



Animateur filière

Magalie LEON
CHLORIS ARBO
cmagalie@hotmail.com

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Myrtille National
N°X du JJ/MM/AA »

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Myrtille

- **Météo** : températures élevées et nouvel épisode de pluies attendu à la fin du week-end.
- **Stades phénologiques** : fin de récolte, redémarrage de plants ou dépérissements...
- **Drosophila suzukii** : vol limité avec les températures élevées. Pas de dégâts sur fruits.
- **Maladies sur fruits** : risques faibles.
- **Dépérissements** : accélération des dessèchements des cannes ou des arbres visibles avec les fortes chaleurs.
- **Cochenilles** : début d'essaimage des L1, faible présence des L1 sur les parcelles du réseau.
- **Cécidomyies** : fin du vol des adultes en Centre Val de Loire, dégâts visibles sur toutes les parcelles.
- **Campagnols terrestres** : présence importante sur jeunes arbres.
- **Autres ravageurs** : oiseaux : dégâts très importants !!
- **Auxiliaires** : chrysopes.
- **Mauvaises herbes** : fort développement des adventices !

6 régions participent aux observations de parcelles : Nouvelle-Aquitaine, Sud Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Bourgogne Franche Comté, Auvergne-Rhône-Alpes.



**Après la récolte, le chantier de
désherbage va commencer !**

Liseron sur myrtillier

Bretagne

3 août 2026


(Crédit Photo : F. Gueguen - producteur)



• METEO

Données météo issues de la Base de données Météo France (Infoclimat.fr et data.gouv.fr)


Température 2026 moyenne journalière au niveau national comparée à des indicateurs moyens pluriannuels :



Evaluation de la situation

Les températures sont toujours très élevées sur l’ensemble des régions. **L’année est historiquement exceptionnellement chaude.**
Le Sud-Ouest est particulièrement touché. **Les incendies en Gironde et dans Les Landes** ont été entretenus par des vents importants.
Un épisode pluvieux lundi 3 août a apporté des quantités de 0 à 50mm avec de fortes variations d’une parcelle à l’autre sur une même zone !
Un autre épisode pluvieux est attendu dimanche et lundi.

Exemple de relevés météo sur Agen



• STADES PHENOLOGIQUES

Situation sur le terrain

Toutes les régions ont fini ou sont en fin de récolte.

Sud-Ouest : pleine récolte Centrablue. Limousin : fin Legacy, Darrow.

Bretagne : fin Darrow.

Grand Est : fin Elisabeth, Coville, Chandler.



Elisabeth



**Coville
Grand Est
03/08/2026**

(Crédit Photo : C. Barbier – Productrice)



Chandler.

Impacts des incendies dans le Sud-Ouest :

Un verger d'une trentaine d'hectares en Gironde a subi un incendie : 60% des myrtilliers ont brûlé.

Sur d'autres vergers de myrtilliers en Gironde et dans Les Landes, les flammes se sont arrêtées aux clôtures grâce à l'intervention des pompiers.

Impacts de la canicule :

La canicule de fin juin a eu pour conséquences principales des fruits mous ou brûlés, le blocage du grossissement des myrtilles, le dessèchement des baies (fruits fripés). Les fruits les plus exposés au soleil sont les plus touchés (moins de dégâts à l'intérieur du buisson).

L'intensité des dégâts est faible (dans le Grand Est, la Bretagne, l'Auvergne Rhône-Alpes) à très importants selon les vergers en Nouvelle Aquitaine (Les Landes et la Gironde) et le Centre val de Loire.

Et les températures restées élevées qui ont suivi, contribuent encore à une diminution du calibre dans toutes les régions.



Myrtilles touchées par les coups de soleil et la chaleur : elles n'arrivent pas à maturité.

**Nouvelle Aquitaine
10/07/2026**

(Crédit Photo : M. Léon-Chapoux - Chloris Arbo)

On note un regroupement des récoltes. **La fin des récoltes a été anticipée sur certains vergers** du fait de ce regroupement des maturités et des calibres trop faibles qui nécessitent trop de temps de main d'œuvre pour maintenir un coût de production économiquement viable.

Des dégâts de cannes ou de plants entiers desséchés sont aussi observés, notamment sur les plants les moins bien irrigués en bout de rangs ou quand les goutteurs sont bouchés.



**Dessèchement des
feuilles sur arbres sous
irrigués suite à une
problème d'irrigation.**

**Nouvelle Aquitaine
20/07/2026**

(Crédit Photo : M. Léon-
Chapoux - Chloris Arbo)

Les vergers correctement irrigués peuvent être aussi impactés. Dans les régions où la canicule a le plus sévi, les vergers bien irrigués et protégés par des filets d'ombrage ou équipés d'une aspersion sur frondaison semblent avoir passé le cap des fortes chaleurs sans aucun dégât.

Mais quand les arbres sont bien alimentés, les pousses peuvent redémarrer : signalement dans le Grand Est, le Centre Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine :



**Myrtille avec de belles pousses qui redémarrent :
Patriot, Bluecrop et Drapper.
Grand Est
03/08/2026**

(Crédit Photo : C. Barbier – Productrice)



**Myrtille qui redémarrent : toutes les variétés
Centre Val de Loire
03/08/2026**

(Crédit Photo : C. Savoure – Productrice)

Evaluation du risque

Sans pluies la situation est très compliquée sur de nombreux vergers.

Les producteurs ont la crainte d'avoir des restrictions d'utilisation d'eau ou de voir leurs réserves d'eau vides.

Sur certains sols, le goutte à goutte ne suffit pas bien à humecter les bulbes. Des plants risquent de dessécher partiellement ou totalement.

Le risque incendie est toujours très élevé dans le Sud-Ouest.

• DROSOPHILA SUZUKII


Reconnaissance

Voir BSV National Myrtille n°7 du 18/06/2026

Situation sur le terrain

Avec les températures élevées depuis début juin, les drosophiles ne sont pas présentes sur les fruits. Aucun dégât observé ces dernières semaines sur l'ensemble des régions du réseau.

Le Ctifl à La Morinière (Centre Val de Loire) a mis en place 2 pièges d'adultes pour suivre le vol des mouches femelles et mâles. Le piégeage est bas et n'évolue pas.



Evaluation du risque

Risque important à partir du moment où les fruits commencent à bleuir. Les températures élevées sont défavorables à la drosophile, le cycle est ralenti.

Méthodes alternatives :

La récolte rapide et totale des fruits mûrs. Augmenter la fréquence des récoltes en cas de présence de drosophiles.

Balayer les fruits mûrs tombés au sol pendant la récolte et les détruire (dans un sac fermé au soleil ou au congélateur).

Entretenir les inter-rangs pour éviter les lieux humides.

Supprimer les eaux stagnantes.

Aérer le buisson par une taille d'hiver plus importante.

Protéger avec des filets anti-drosophiles.

Réaliser du piégeage massif en bordure de parcelles.

• MALADIES SUR FLEURS ET FRUITS

Reconnaissance des maladies

[Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026](#)

Situation sur le terrain

Pas de maladies identifiées sur les fruits.

Evaluation du risque

Risque de contamination faible avec les conditions très sèches annoncées ces prochains jours.

Méthodes alternatives :

A la plantation, éviter les sites humides (planter sur buttes, drainer la parcelle), préférer les sols aérés

Adapter ses pratiques aux variétés : Patriot, Berkeley, Blue One sont sensibles. Bluetta, Aurora sont moins sensibles.

Réaliser une taille importante pour aérer les arbustes


Limiter l'irrigation par aspersion jusqu'à la chute des pétales.

• DEPERISSEMENTS

Situation sur le terrain

Signalement de dessèchements de cannes ou d'arbres un peu dans tous les vergers. Les causes sont multiples selon les situations : manque d'eau, frottements de gibiers, attaques de champignons, campagnols, sésies.

Sur les arbres, des décolorations des tiges et parfois dessèchements sont visibles. Leur fréquence sur le verger est augmentée depuis ce dernier mois de sécheresse intense.



**Dépérissement de cannes
sur Bluecrop
spécifiquement.
Grand Est
20/07/2026**
(Crédit Photo : C. Barbier –
Productrice)



**Taches sur rameaux de Blue One.
Centre Val de Loire
24/07/2026**
(Crédit Photo : C. Savoure– Productrice)

Evaluation du risque

Avec les conditions sèches et les températures élevées, les dépérissements sont accélérés et bien visibles.

• COCHENILLES (*Parthenolecanium corni*)

Rappel du cycle biologique

[Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026](#)

Situation sur le terrain

Présence importante dans tous les vergers du Sud-Ouest, Centre Val de Loire et Grand Est avec une pression élevée.

Pression moins importante dans les autres régions signalée sur les parcelles du réseau.

Les larves L1 commencent à apparaître sous les feuilles dans toutes les régions.



**Larve L1 présentes sur la face inférieure des feuilles.
Vosges (Grand Est)
15/06/2026**

(Crédit Photo : C. Barbier - productrice)

Evaluation du risque

Essaimage des larves L1 vers les feuilles et les fruits en cours, stade sensible.

Méthodes alternatives :

Pendant la taille d'hiver il faut supprimer les cannes fortement infestées.


• CECIDOMYIES (*Dasineura oxycoccana*)

Identification

[Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026](#)

Situation sur le terrain

Le Ctifl de la Morinière a commencé cette année un suivi du vol de la Cécidomyie sur son verger expérimental : le vol se termine.



Dégâts visibles et significatifs sur les pousses terminales des rameaux poussants sur l'ensemble des parcelles.

Les pousses attaquées sont arrêtées et de nouvelles ramifications sont reparties sous l'attaque.

Evaluation du risque

Fin de vol en cours. Risque faible.

• CAMPAGNOL TERRESTRE

Identification

[Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026](#)

Situation sur le terrain

Présence signalée sur les parcelles en Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté avec des dégâts importants sur les jeunes plants.



**Dégâts de campagnol sur un jeune plant de myrtillier.
Auvergne Rhône-Alpes
05/08/2026**

(Crédit Photo : F. Assezat, GIE DES Monts du Velay)

Evaluation du risque

Risque localement élevé.

Méthodes de lutttes alternatives :

Favoriser les habitats des prédateurs :

- Créer des corridors écologiques (haies)
- Mettre en place des perchoirs pour les rapaces,
- Poser des nichoirs pour les chouettes,
- Créer des abris pour les mustélidés (hermine, fouine...)

Déranger le campagnol :

- détruire les galeries par le travail du sol.
- ne pas laisser les touffes d'herbes (zones de refuge des campagnols)
- contrôler les populations de taupes

Piéger massivement du printemps à l'automne :

- les pièges TOPCAT : piège à guillotine en acier.
- les pièges à pinces

Mettre en place des barrières mécaniques :

- des paniers en grillage autour de la motte du plant.
- l'enfouissement d'un grillage tout autour de la parcelle, couplé aux pièges.

• AUTRES RAVAGEURS DEGATS LOCALISES

• Les oiseaux

Les oiseaux constituent sur beaucoup de parcelles un fléau tout aussi important que la drosophile : étourneaux, corbeaux, merles, grives...

Les parcelles entourées d'arbres de hauts jets (pins, chênes...) sont souvent soumises à une pression très forte : jusqu'à plus de 10% de perte de fruits.



Attaques d'insectes phytophages. Grand Est

20/07/2026

(Crédit Photo : C. Barbier – Productrice)

Dégâts d'oiseaux sur myrtilles : chute au sol, et fruits piqués.

Centre Val de Loire

15 juin 2026

(Crédit Photo : C. Savoure)

• Les blaireaux

Présence de blaireaux signalés sur une parcelle du réseau : ils mangent les fruits...

• Les insectes phytophages

Présence de quelques feuilles dévorées par des insectes phytophages : phyllobes, chenilles, cécidomyie...



Carences en calcium sur feuilles

07/2026

(Crédit Photo : C. Barbier – Productrice)

A ne pas confondre avec des carences en calcium sur feuilles sur des arbres souvent poussant :



• AUXILIAIRES

Les observateurs notent une présence de nombreux chrysopes.



Œuf de chrysopes
Centre Val de Loire

20/07/2026

(Crédit Photo : C. Savouré, Productrice)

Œuf de Chrysope sur myrtille

Grand Est

29/06/2026

(Crédit Photo : J. Nogapoe, CA Nièvre)



• MAUVAISES HERBES

Les conditions sont favorables au développement des mauvaises herbes qui bénéficient de l'irrigation. Le risque est de favoriser la présence de la *Drosophila suzukii*.

Présence de liseron qui grimpe sur les cannes des myrtilliers. Le risque est le dépérissement de l'arbre.



**Développement du liseron étouffant les
plants de myrtillier**

Sud Bretagne

03/08/2026

(Crédit Photo : F. Gueguen, Producteur)

Evaluation du risque

Risque très élevé sur toutes les parcelles.

Note nationale BSV Abeilles - Pollinisateurs :



Le déclin des insectes pollinisateurs est ...

... une réalité mondiale impliquant de nombreux facteurs de stress notamment d'origine biologique, toxicologique, alimentaire et environnementale (climat, pertes d'habitats, érosion de la biodiversité florale...).

La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Abeilles- Pollinisateurs](#)

Note nationale Biodiversité 'Insectes Auxiliaires' :



La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Insectes auxiliaires](#)

Note nationale Biodiversité 'Araignées' :



La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Araignées](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Myrtille National sont les suivantes :

Chloris Arbo, Ctifl, Chambres d'Agriculture du Lot et Garonne, de la Dordogne, du Sud Bretagne, de la Nièvre, de Côte d'Or, Cadralbret, Valprim, Gaïa Care, GIE des Monts du Velay, la Station Expérimentale d'Auray, Planète Légumes et Plantes et les agriculteurs observateurs de l'APMF (Association des Producteurs de Myrtilles de France)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).