



Châtaignier

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT** en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Châtaignier

- **Stades phénologiques** : grossissement des bogues.
- **Chancre de l'écorce** : actif.
- **Pourritures des châtaignes** : infections possibles en cours sur les fleurs femelles.
- **Septoriose** : apparition de symptômes précoces.
- **Tordeuses** : vol en cours.
- **Carpocapse** : début du vol
- **Zeuzères et Sésies** : vols en cours.
- **Auxiliaires** : œufs de chrysopes visibles.

N°05
31/07/2024



Animateur filière

Magalie LEON-CHAPOUX
Chloris Arbo
cmagalie@hotmail.com

Directeur de publication

Luc SERVANT
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Grand Sud-Ouest Châtaignier
N°X du JJ/MM/AA »

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Bournette 29 juillet 2024
Beynat, Corrèze
(Crédit Photo : P. Coste – Producteur)



- **Stades Phénologiques**

Situation sur le terrain

Stade grossissement de la bogue.

Peu de bogues observées sur Bouche de Bétizac (50 à 100% de pertes) et Marigoule (moins 50%).

Certaines variétés s'en sortent mieux selon les secteurs : Marlhac, Bournette, Bourruie de Juillac.

- **Chancre de l'écorce du châtaignier (*Cryphonectria (Endothia) parasitica*)**

Situation sur le terrain

Les chancres sont actifs.

Éléments de biologie et méthodes de luttés : [voir BSV n°2](#)

Les chancres doivent être éradiqués ou soignés pour éviter leur propagation dans la parcelle.



Chancre avancé, sur bois jeune

Evaluation du risque – chancre du châtaignier


Risque de dissémination naturelle en période humide, un taux d'humidité élevé et la pluie favorisant la propagation du champignon vers les organes sains.

Un chancre non suivi pouvant entraîner la mort de l'arbre, il est recommandé de surveiller régulièrement les troncs et charpentières, pour agir au plus vite.

- **Pourritures sur fruits**

La contamination des châtaignes se ferait principalement au moment de la floraison. Elle est d'autant plus favorisée par les températures élevées, le vent et les insectes qui transportent les spores (conidies et ascospores) du champignon qui se trouvent sur le sol, et les organes du châtaignier (bois, galles, pollen). L'expression de la maladie évolue à l'intérieur de la châtaigne selon les conditions climatiques précédant la chute des fruits, les conditions de températures et d'humidité au sol, et les conditions de stockage des châtaignes.

Cycle biologique et période de contaminations :



Evaluation du risque : le risque de contamination diminue avec la fin de la floraison.

- **Septoriose** (*Septoria castanicola*)

Situation sur le terrain

Symptômes visibles sur différentes variétés. Cette année les symptômes arrivent précocement. Toutefois l'année dernière des vergers ont été très touchés par la septoriose sans pour autant provoquer la chute des feuilles, et la récolte n'a pas été impactée.

Cependant, même sur les hybrides moins sensibles il est important de surveiller la pression tous les ans pour évaluer les éventuels impacts à long terme sur la production (mise en réserve). Avec le changement climatique, il faut rester vigilant.

Éléments de biologie

Les attaques débutent fin juin/juillet les étés particulièrement humides ou dans des parcelles en fonds de vallée où les rosées et brouillards sont importants. Les symptômes ne sont généralement visibles qu'au mois d'août.

Des variétés sont reconnues très sensibles notamment en Ardèche : Sardonne, Marron de Goujounac, Bouche Rouge, Maraval.



Début de contamination sur Bournette

(Crédit Photo : M. LEON-CHAPOUX – Chloris Arbo)

Taches sur Maraval


• Tordeuse de la châtaigne (*Pammene fasciana*)

Le vol continue.

Papillon dont la larve attaque la châtaigne, et au vol plus précoce (première quinzaine de juin) que le carpocapse (fin juillet à début août), auquel il ressemble. La tordeuse provoque notamment des chutes de bogues précoces observables en août. Depuis quelques années, dans le Sud-Ouest, ses larves sont régulièrement observées sur fruits.

Globalement le nombre moyen de papillons capturés par piège est moins important (5 par piège) que les 4 années précédentes (20 par piège) à la même période.

Toutefois sur certaines parcelles, les captures peuvent atteindre 30 papillons par piège.



Remontées du réseau de 43 pièges suivis par les producteurs du Bassin Sud-Ouest

Evaluation du risque : pontes et sortie des larves en cours.




Un produit de biocontrôle à base de *Bacillus thuringiensis* est disponible et à utiliser au moment du vol.

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

biocontrôle

• Carpocapse de la châtaigne (*Cydia splendana*)

Observations du réseau : début du vol.



Remontées du réseau de 43 pièges suivis par les producteurs du Bassin Sud-Ouest

Papillon adulte (Imago) de carpocapse de la châtaigne

(*Cydia splendana*) Crédit photo : INPN



A retenir dans ces suivis de vols :

1. **Une seule génération par an** (« univoltin », comme la tordeuse de la châtaigne), qui se développe chez nous **de fin juillet à fin septembre**.
2. **La ponte**, sur une feuille à proximité des bogues, **début 4 à 5 jours après l'accouplement des femelles**.
3. **L'éclosion débute 10 à 12 jours après la ponte**.

La larve peut atteindre jusqu'à 12 à 16 mm et présente une couleur blanche ou rosée en fin de développement. Elle passe par plusieurs stades larvaires :

- **Le stade baladeur** : la chenille accède à la bogue en circulant sur le feuillage et les rameaux. Elle y pénètre jusqu'à l'intérieur de la châtaigne.
- **5 stades larvaires** : la chenille poursuit sa croissance dans le fruit pendant 40 à 45 jours, durant lesquels elle se nourrit de l'amande et creuse une galerie qui contient ses excréments.
- **À la fin de sa croissance**, la larve perce l'enveloppe de la châtaigne et s'enfonce dans le sol. Elle tisse un cocon (hibernaculum) et entre en diapause pour se métamorphoser l'été suivant.

Dégâts

Fruits véreux, particulièrement sensibles au développement des pourritures des châtaignes. Les pontes tardives peuvent entraîner des développements de larves dans les fruits commercialisés.

Evaluation du risque : début de vol en zones précoces. Pontes en cours et premières éclosions des larves « baladeuses ».



Des produits de biocontrôle à base de diffuseurs sexuels et *Bacillus thuringiensis* sont disponibles et à utiliser au moment du vol.

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-](https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle)

[biocontrôle](https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle)

- **Zeuzère** (*Zeuzera pyrina*) et **Sésie** (*Synanthedon*)

Éléments de biologie : [Voir BSV n°2](#)



Deux produits de biocontrôle à base de diffuseurs sexuels et *Bacillus thuringiensis* sont disponibles et à utiliser au moment du vol.

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-](https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle)

[biocontrôle](https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle)

Evaluation du risque – Zeuzère et Sésie

Vols en cours.

- **Présence d'auxiliaires**



Œufs de Chrysopes sur bogue de Marigoule

29 juillet 2024

Vignols, Corrèze

(Crédit Photo : M. Léon-Chapoux – Chloris Arbo)

Note nationale BSV Abeilles - Pollinisateurs :



Le déclin des insectes pollinisateurs est ...

... une réalité mondiale impliquant de nombreux facteurs de stress notamment d'origine biologique, toxicologique, alimentaire et environnementale (climat, pertes d'habitats, érosion de la biodiversité florale...).

La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Abeilles- Pollinisateurs](#)

Note nationale Biodiversité :



La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Flore des bords des champs](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Grand Sud-Ouest Châtaignier sont les suivantes :

Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Chambres départementales d'agriculture de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot, SCA SOCAVE, La Périgourdine, LIMDOR, Invenio, Valcausse, Terres du Sud, et les agriculteurs observateurs

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".