



Châtaignier

N°08
09/09/2026



Animateur filière

Magalie LEON
Chloris Arbo
cmagalie@hotmail.com

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Grand Sud-Ouest Châtaignier
N°X du JJ/MM/AA »

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

CHATAIGNIER

- **Météo** : toujours pas de pluies significatives.
- **Stades phénologiques** : Début de chute des premières châtaignes.
- **Pourritures** : Risque élevé d'expression avec les températures élevées.
- **Tordeuse de la châtaigne** : Fin du vol de papillons, larves actives.
- **Carpocapse des châtaignes** : Pic du vol des papillons, risque élevé de présence des larves.
- **Sangliers** : dégâts sur le sol.



**Bouche de Bétizac, début de chute des châtaignes
avec péricarpe qui se décolle facilement**

Verger non irrigué, Corrèze

07/09/2026

(Crédit Photo : M. Léon-Chapoux, Chloris Arbo)



• Météo

Cette semaine une baisse des températures est constatée toujours sans pluies significatives...
Un retour des températures avoisinant les 30 degrés est annoncé pour le début de la semaine prochaine.

• Stades phénologiques

Situation sur le terrain

Début de chute des premières châtaignes en Charentes, Limousin, Dordogne, Lot et Garonne, Lot.

Evaluation du risque :

Le manque de pluies peut nuire au grossissement des fruits voire provoquer le décollement du péricarpe de l'amande.

• Pourritures sur fruits

Éléments de biologie

Plusieurs souches de champignons sont à l'origine de dégâts sur les châtaignes : *Phoma endogena*, *Botrytis cinerea*, *Fusarium roseum*, *Penicillium expansum*, *Ciboria batschiana*... et le dernier champignon identifié depuis quelques années et qui prend une ampleur très importante à l'échelle de l'Europe : ***Gnomoniopsis castaneae***.

Ce champignon a la particularité de se développer dans l'amande de la châtaigne depuis l'arbre jusque dans les frigos où sont stockées les châtaignes.


Des travaux sont engagés par les instituts de recherche à l'échelle européenne pour mieux connaître le cycle de ce champignon et les facteurs qui favorisent les contaminations et l'expression des symptômes. De même, des produits de biocontrôle sont testés au verger et en station de traitement du fruit pour limiter les dégâts engendrés par *Gnomoniopsis castaneae*.

La contamination principale des châtaignes se ferait au moment de la floraison. Elle est d'autant plus favorisée par les températures élevées et le vent qui transportent les spores (conidies et ascospores) du champignon qui se trouvent sur le sol (sur les résidus des organes du châtaigniers tombés à l'automne et pendant l'hiver), et les organes du châtaignier (bois, galles, pollen).

Au plus près de la récolte (le mois d'août et septembre), les températures élevées favorisent l'expression du champignon dans l'amande des châtaignes.

Evaluation du risque : L'expression de la maladie augmente pendant le grossissement du fruit et les températures élevées au plus près de la récolte. Risque moyen à élevé.


Cycle biologique et période de contaminations



- **Tordeuse de la châtaigne** (*Pammene fasciana*)

Situation sur le terrain :

Fin du vol en cours mais il y a toujours quelques papillons piégés.



Éléments de biologie

Voir cycle biologique : [BSV Nouvelle Aquitaine n°5 du 24 juillet 2026](#)


Évaluation du risque : le pic de sortie des larves est en cours. Risque élevé d'infestation sur les fruits.

- **Carpocapse de la châtaigne** (*Cydia splendana*)

Observations du réseau :

Pic du vol toujours en cours. Piégeages particulièrement importants cette année.

Au total ce sont 44 pièges qui sont positionnés en Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, Lot et Garonne, Lot et Cantal.



Éléments de biologie

Voir cycle biologique : [BSV Nouvelle Aquitaine n°5 du 24 juillet 2026](#)

Evaluation du risque : Risque très élevé. Montée en puissance des émergences des chenilles dans les parcelles les plus touchées.



Des produits de biocontrôle à base de diffuseurs sexuels et *Bacillus thuringiensis* sont disponibles et à utiliser au moment du vol.

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

• Sangliers

Les passages de sangliers à l'aube de la récolte sont visibles. Le sol est labouré rendant impossible la récolte mécanique.



Dégâts de sangliers sur le sol

(Crédit Photo : M. Léon-Chapoux, Chloris Arbo)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Grand Sud-Ouest Châtaignier sont les suivantes :

Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, Chambres départementales d'agriculture de la Dordogne, de la Corrèze, du Lot, du Lot et Garonne et du Cantal, SCA SOCAVE, Périgourdine, LIMDOR, Invenio, Valcausse, Terres du Sud, Chloris Arbo et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).