



Fruits à noyau

Prunier - Pêcher - Amandier - Cerisier

N°20
10/09/2026



Animateur filière

Emmanuelle MARCHESAN
FREDON 47
e.marchesanfredonaqui@laposte.net

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Fruits à
noyau N°X
du JJ/MM/AA »**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Pêcher Amandier

- **Tordeuse orientale** : période à risque d'éclosions.

Tous fruits à noyau

- **Pucerons** : la période de retour des formes ailées sur les arbres fruitiers va débuter.
- **Punaies phytophages** : captures en augmentation depuis mi-août.
- **Bactériose** : la défeuillaison constitue une période à risque.



Données météorologiques

Depuis début août, les températures moyennes journalières sont restées majoritairement au-dessus des valeurs de saison. Des températures minimales comprises entre 11 et 23°C et des maximales entre 21 et 41°C ont été enregistrées. Depuis ce milieu de semaine les températures sont en baisse.

Les précipitations orageuses parfois accompagnées de vent et de grêle qui ont eu lieu au cours du mois d'août ont apporté de 24 à 100 mm selon les stations. Depuis début septembre, de faibles pluies sont intervenues (0.5 à 15 mm).

Pour les jours à venir, un temps sec et des températures qui devraient redevenir supérieures aux normales sont annoncés.

Prévisions du 11 au 17 septembre (source : Météo France)

	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15	MERCREDI 16	JEUDI 17
Ste Livrade sur Lot (47)	 10° / 27° ▲ 10 km/h	 13° / 28° ▼ 10 km/h	 11° / 30° ▼ 10 km/h	 13° / 34° ▲ 5 km/h	 15° / 33° ▲ 20 km/h	 15° / 27° ▲ 15 km/h	 11° / 27° ▼ 10 km/h
Pompignac (33)	 13° / 25° ▼ 20 km/h	 14° / 27° ▲ 10 km/h	 15° / 30° ▼ 10 km/h	 15° / 33° ▲ 5 km/h	 17° / 31° ▲ 20 km/h	 15° / 25° ▲ 15 km/h	 13° / 25° ▲ 15 km/h
Bergerac (24)	 9° / 28° ▼ 10 km/h	 12° / 30° ▼ 10 km/h	 10° / 30° ▼ 10 km/h	 11° / 34° ▲ 5 km/h	 13° / 32° ▲ 20 km/h	 15° / 27° ▲ 15 km/h	 10° / 26° ▼ 10 km/h
Jonzac (17)	 9° / 27° ▲ 15 km/h	 10° / 28° ▲ 10 km/h	 11° / 31° ▲ 5 km/h	 12° / 33° ▲ 10 km/h	 15° / 30° ▲ 20 km/h 40 km/h	 17° / 26° ▲ 15 km/h	 12° / 26° ▲ 15 km/h
Orthez (64)	 11° / 25° ▼ 15 km/h	 13° / 27° ▲ 10 km/h	 13° / 29° ▲ 10 km/h	 13° / 33° ▲ 10 km/h	 14° / 30° ▲ 20 km/h 40 km/h	 13° / 26° ▼ 15 km/h	 11° / 26° ▲ 15 km/h

Prunier

- Stades phénologiques

Prunier d'Ente : en Lot-et-Garonne, la récolte est terminée ou se termine.

- Carpocapse des prunes (*Cydia funebrana*/*Grapholita funebrana*)

Sur notre réseau de piégeage, les captures sont faibles.

Dans les parcelles du réseau d'observation, les niveaux de dégâts ont été inférieurs à ceux observés l'année dernière.

Mesures alternatives :


Afin de limiter les populations de chenilles foreuses, l'apport de nématodes au sol à l'automne est possible sur sol humide et par conditions douces.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)





• Stockage des pruneaux

Au cours du stockage, les fruits secs peuvent être parasités par différents ravageurs des denrées stockées. Les plus préjudiciables et les plus couramment rencontrés sont : la teigne des fruits secs, les carpophiles et l'acarien du pruneau.

Mesures prophylactiques :

Afin de limiter les pertes dans la phase de stockage des fruits séchés, il est important de :


- stocker uniquement des fruits suffisamment séchés ;
- conserver les fruits dans un local réservé exclusivement à cet usage et vide de tout emballage de carton susceptible d'héberger les ravageurs des denrées stockées ;
- nettoyer régulièrement les abords du lieu de stockage ;

Le suivi de certains parasites est possible par piégeage (Cf. [BSV n°19 du 6 août 2026](#)).

Pêcher Amandier


• Tordeuse orientale du pêcher (*Cydia molesta*)

Sur le réseau de piégeage, les captures sont globalement faibles.



Données de modélisation : selon les données du modèle tordeuse orientale DGAL-ONPV/INOKI®, un cinquième vol a démarré à partir des 14-20 août et à ce jour, 60 à 80 % du potentiel de pontes et 30 à 60 % du potentiel d'éclosions de la cinquième génération auraient été réalisés. Les pontes pourraient rester soutenues jusqu'aux 10-15 septembre et les éclosions jusqu'aux 15-20 septembre.

Données de modélisation Tordeuse orientale



Evaluation du risque

Le risque est particulièrement présent dans les situations tardives avec présence de dégâts liés aux générations précédentes.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :


Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

• Chancre à *Fusicoccum*

Fusicoccum amygdali provoque des dessèchements de rameaux (rameaux d'un an et pousses feuillées de l'année en cours) qui se manifestent de façon typique depuis le départ de la végétation. Les rameaux portent à leur base une ou plusieurs lésions chancreuses.

Evaluation du risque

Fusicoccum est un parasite de blessure, la période de chute des feuilles sera une époque où les risques de contamination par le champignon pourront être importants.



Chancre sur pêcher

(Crédit Photo : E. Marchesan – FREDON 47)

Mesures prophylactiques :

En hiver, la taille devra être mise à profit pour éliminer tous les rameaux porteurs de chancres afin de réduire l'inoculum.

Tous fruits à noyau

• Pucerons

En début d'été, de nombreuses espèces de pucerons rencontrées en vergers (puceron vert du prunier, puceron vert du pêcher...) migrent sur des plantes hôtes secondaires. A partir du mois de septembre, ils retournent sur les arbres fruitiers pour y déposer les œufs d'hiver qui vont éclore au printemps prochain.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Juste après la récolte, la gestion des parcelles vis-à-vis des pucerons peut être raisonnée en prenant des mesures alternatives. La mise en place d'une barrière physique par l'application d'une pellicule d'argile ou autre produit minéral sur le végétal permet de limiter leur retour sur les arbres fruitiers et de réduire ainsi le potentiel de population pour la saison prochaine.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter les liens suivants : [Ephytia Guide Eco-Fruits-Barrières physiques](#), [Ecophyto PIC substances naturelles à effet barrière](#), [Les argiles en arboriculture](#)

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

• Acariens rouges

Les populations d'acariens observées actuellement en vergers sont globalement faibles. Quelques dégâts de tétranyques tisserands et de bryobes ont été observés sur certaines parcelles.

La présence d'acariens prédateurs (phytoséiides) et de coccinelles *Stethorus* a également été observée.

Evaluation du risque


Il n'est pas nécessaire de lutter contre les acariens à cette époque mais il est important de repérer les parcelles les plus affectées cette année afin de les surveiller au printemps prochain.

Seuil indicatif de risque : en saison, le seuil est de 60 % de feuilles occupées par une forme mobile d'acarien rouge sur prunier. En présence de phytoséiides (au minimum 30 % de feuilles occupées), ce seuil peut être porté jusqu'à 80 %.

• Punaises phytophages

En parcelles de référence, quelques adultes et larves de punaises phytophages sont observés.

En vergers de pruniers, plusieurs espèces de punaises phytophages sont présentes. De très rares dégâts sans conséquence économique sont observés mais il est difficile d'identifier les symptômes entre les différentes espèces.



Larve et adulte d'*Halyomorpha halys* sur fruits et dégâts de punaises sur fruits

(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

Sur notre réseau de piégeage punaise diabolique *Halyomorpha halys*, des captures d'adultes et de larves (stades L2 à L5) sont enregistrées. Une hausse des prises est notée depuis mi-août.

• Drosophile à ailes tachetées (*Drosophila suzukii*)

Sur notre réseau de piégeage les captures restent faibles.

Mesures prophylactiques :

Les mesures prophylactiques telles que la destruction des fruits atteints afin de limiter son développement sont à privilégier.

• Flatide pruineux (*Metcalfa pruinosa*)

En parcelles de référence, les populations sont relativement faibles. Le parasitisme par l'hyménoptère *Neodryinus typhlocybae* est noté. Des larves parasitées (présence de cocons) sont observées.



Mesures prophylactiques :

Afin de limiter son extension, les mesures prophylactiques telles que le débroussaillage des environs très propices (bords des cours d'eau avec ronces et orties...) et le broyage des adventices sont à privilégier.

• Bactérioses

Le développement des bactéries pathogènes est stimulé en présence de facteurs favorables : sensibilité variétale, stress hydrique, déséquilibre alimentaire, accidents climatiques (grêle), conduite (taille : plaies profondes...). Elles pénètrent dans le végétal à la faveur de blessures naturelles (plaies pétiolaires, écartement des écailles des bourgeons, stomates au niveau des feuilles) ou accidentelles (plaies de taille, micro-lésions liées au gel ou à la grêle).

Evaluation du risque

La période de chute des feuilles va constituer une période à risque de contamination.

• Auxiliaires

Des coccinelles, des chrysopes et des araignées sont actuellement observées.



Coccinelle *Stethorus* et *Trombidium*
(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

• Incidents climatiques

Les pluies du mois d'août ont engendré des fentes sur fruits en vergers de pruniers non irrigués. Des dégâts de grêle ont été observés localement suite notamment aux orages de la dernière semaine d'août.




Dégâts de grêle
(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

Notes nationales biodiversité

Trois nouvelles notes sont disponibles en cliquant sur les images ci-dessous :



Autres notes accessibles en cliquant sur les images ci-dessous :



Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Fruits à noyau sont les suivantes : BIP, CDA 47, CETA de Guyenne, AgroCampus47, FREDON 47, FREDON Nouvelle-Aquitaine, SYPRUSI, SYNPPA, UCA France Prune, UPF, UPI

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).