



N°8
24/03/2026



Animateur filières
Céréales à paille / Maïs
Khalid KOUBAÏTI
FREDON Nouvelle-Aquitaine
khalid.koubaiti@fredon-na.fr

Oléagineux - Protéagineux
Solana VERA / Terres Inovia
s.vera@terresinovia.fr

Animateurs délégués

Céréales à paille / Maïs
Clément GRAS / ARVALIS
c.gras@arvalis.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°8 du 24/03/26 »**

Edition **Poitou-Charentes**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Blé tendre

- **Stade** : majorité à 1 – 2 nœuds (BBCH 31-32), les plus précoces sont à 3 nœuds (BBCH32).
- **Piétin verse** : à observer pour évaluer le risque notamment pour les variétés non résistantes.
- **Rouille jaune et brune** : à surveiller sur les variétés sensibles ([fiche de prélèvement pour analyse de la rouille jaune](#)).
- **Septoriose du blé** : la période de risque est amorcée, surveillez l'évolution des contaminations.

Orge d'hiver

- **Stade** : en majorité à 1 nœud (BBCH 31),
- **Helmintosporiose, rhynchosporiose et rouille naine de l'orge** : les orges sont en période de risque, surveillez le développement de ces maladies notamment sur les variétés sensibles.

Pour information : Gestion des résistances aux fongicides : [note commune 2026 INRAE, Anses, Arvalis – Institut du Végétal](#)

Maïs

- **Situation** : les semis ont débuté localement.
- **Limaces** : à surveiller.

Colza

- **Stade** : entre D2 et G4 (BBCH 53 et 73), majoritairement à F2 (BBCH 61).
- **Sclerotinia** : repérer l'apparition du stade F1 (BBCH 60) pour anticiper le stade G1 (BBCH 70).
- **Meligèthes** : à dénombrer pour les rares parcelles sans fleurs.
- **Pucerons cendrés** : à surveiller.
- **Autres bioagresseurs** : mycosphaerella.

Pois protéagineux de printemps

- **Stade** : 1 à 4 feuilles.
- **Sitone du pois** : à surveiller en parcelle.
- **Thrips du lin et des céréales** : non observés cette semaine.



Blé tendre


Après le temps calme et doux de ces derniers jours (avec des températures printanières) le temps devient changeant à partir de ce mercredi. Les températures se refroidissent sensiblement et des averses sont annoncées localement.

Prévisions selon MétéoFrance pour les stations de :

	MERCREDI 25	JEUDI 26	VENDREDI 27	SAMEDI 28	DIMANCHE 29	LUNDI 30
Poitiers	 7° / 13° ↗ 25 km/h	 2° / 13° ↘ 20 km/h	 1° / 13° ↘ 10 km/h	 8° / 13° ↘ 20 km/h	 3° / 13° ↘ 20 km/h	 6° / 17° ↗ 20 km/h
Niort	 7° / 14° ↗ 20 km/h	 2° / 14° ↘ 20 km/h	 2° / 14° ↘ 10 km/h	 7° / 13° ↘ 20 km/h	 3° / 14° ↘ 20 km/h	 4° / 18° ↗ 15 km/h
Saintes	 8° / 15° ↗ 30 km/h	 4° / 14° ↘ 20 km/h	 3° / 15° ↘ 10 km/h	 7° / 14° ↘ 20 km/h	 3° / 14° ↘ 25 km/h	 4° / 16° ↗ 25 km/h
Angoulême	 6° / 15° ↗ 20 km/h	 2° / 14° ↘ 20 km/h	 2° / 14° ↘ 15 km/h	 7° / 14° ↘ 20 km/h	 2° / 14° ↘ 25 km/h	 2° / 16° ↗ 20 km/h

• Stade phénologique et état de la culture


Les stades des blés varient d'épi 1cm (BBCH 30) à 3 nœuds (BBCH 33), la majorité sont à 1-2 nœud(s) (BBCH 31-32).



Ne pas confondre stade épi 1 cm et redressement

Pour éviter de confondre redressement et stade épi 1 cm, prélever une vingtaine de plantes dans une zone homogène de la parcelle, en évitant les passages de roues et les bordures, observer une dizaine de maîtres-brins (tige la plus développée de la plante) en fendant la tige au cutter. Mesurer la longueur entre le sommet de l'épi et le plateau de tallage sur chaque maître brin et faire la moyenne de ces mesures. Cette moyenne permettra de savoir si le stade épi 1 cm est atteint.

Stade épi 1cm : **le sommet de l'épi est à 1 cm de la base du plateau** de tallage sur au moins la moitié des tiges mesurées.




Source Vigicultures

• Rappel pour les maladies foliaires du blé

Période de risque pour les maladies du blé

Rouille Jaune	Rouille Brune	Septoriose
A partir d'épi 1 cm	A partir de 2 nœuds	A partir de 2 nœuds



• Piétin verse

Les premiers symptômes de ce champignon, se développant sur gaine à partir du stade épi 1 cm, sont signalés dans quelques parcelles (les plus avancées).

La présence du piétin verse est notée dans 1 des 26 parcelles observées du réseau. Le taux d'attaque dans cette parcelle (qui est à 1 nœud) est faible.


Ce champignon du bas de la tige est favorisé par les rotations contenant fréquemment du blé, des variétés sensibles (note strictement inférieure à 5), des semis précoces et des sols à dominance de limons. Dans une moindre mesure, le labour peut être favorable s'il remonte les résidus en surface. Une

• Rouille jaune


Non détectée cette semaine dans les 16 parcelles observées. Cependant, elle a été notée la semaine dernière dans 2 parcelles en Deux-Sèvres sur Ascott et Celibrity (aux stades BBCH 31 et 32) et signalée précédemment dans 2 parcelles en Charente-Maritime sur la variété Prestance.

L'évolution de l'indice de rouille jaune selon le modèle est proche de celle de l'année de référence haute pour les semis précoces. Le modèle permet une description de l'épidémie à partir du climat hivernal de l'année, sans prendre en compte la sensibilité variétale.


Rouille Jaune - Parcelle : CELEBRITY 1510 SAINTES, Station SAINTES - Date de semis 15/10, Année Haute 2014 - Année Basse 2006




Rouille Jaune - Parcelle : CELEBRITY 1011 SAINTES, Station SAINTES - Date de semis 10/11, Année Haute 2014 - Année Basse 2006




Rouille Jaune - Parcelle : CELEBRITY 1510 CHALAIS -RIOUX-MARTIN - Date de semis 15/10, Année Haute 2014 - Année Basse 2006



Rouille Jaune - Parcelle : CELEBRITY 1510 NIORT, Station NIORT SOUCHE - Date de semis 15/10, Année Haute 2014 - Année Basse 2006



Rouille Jaune - Parcelle : CELEBRITY 1510 POITIERS, Station POITIERS -BIARD - Date de semis 15/10, Année Haute 2014 - Année Basse 2006



Période de risque : à partir du stade « épi 1 cm ».

Seuil indicatif du risque :

- Pour les variétés résistantes (note ≥ 7) et à partir du stade 2 nœuds: si présence de pustules.
 - Pour les variétés sensibles (note ≤ 6) et les mélanges variétaux dès qu'il y a une variété sensible dans le mélange :
 - Au stade «épi 1cm» uniquement en présence de foyer actif de rouille jaune (pustule pulvérulente).
 - Au stade « 1 nœud », dès la présence des premières pustules dans la parcelle.
- Cette année, la surveillance doit être d'autant plus importante à la suite de l'arrivée de deux nouveaux pathotypes (V17ANemoVChevignon et Champion). Certaines variétés connues comme résistantes jusqu'à présent pourraient présenter des symptômes.
- Concrètement, toutes les variétés sont à surveiller et en particulier les variétés suivantes pour la région : Academy, Arcachon, Balzac, Belzebuth, Chevignon, Facility, Forcali, Intensity, Jeriko, Kardigan, Kws Millesime, KWS Ultim, Lg Acrobat, Lg Anouk, Rgt Valparaiso, Spirou.

En cas de présence sur ces variétés un prélèvement (de 7 à 8 feuilles de blé avec des lésions bien sporulantes par parcelle de préférence non traitées les jours précédents, ensachées dans une enveloppe papier) serait utile pour vérifier l'évolution des pathotypes.

[Télécharger la fiche de renseignement nécessaire pour l'envoi d'échantillons au laboratoire INRAE - UR1290 BIOGER.](#)

 Echelle de résistance à la rouille jaune (mise à jour 2025)

Résistance des variétés de blé tendre à la Rouille jaune - échelle 2025								
Références			Nouveautés et variétés récentes					
Résistants								
	SHREK	RGT PROPULSO	INTENSITY	RGT MAJESKO	INTRODUCTOR			
	SY TRANSITION	LG AIKIDO	KWS ASTRUM	CONQUISTADOR	KARABOL	KINGKONG	LG AERO	OLAF
				ACCOMPLY	RGT INDEXO	RGT KOESIO	SU MASTER	THERMIDOR
				PAILLEDOR				
Assez résistants								
KWS SPHERE	KWS EXTASE	KWS ERRUPTIUM	JUNIOR	ACADEMY	KAKTUS	KWS ETOILE	KWS GLOBE	SU ELECTRON
	RGT PACTEO	LG ABRAZO	LG ABILENE					
PONDOR	KWS ULTIM	ARCACHON		OUTDOOR	SU HYLORD	WPB MEDINA		
		KWS PERCEPTIUM	BALZAC	SU HYANKEE				
Moyennement sensibles								
			KAROQUE	GEOPOLIS	LG NIKLAS	RGT FARMEO	SU HYCLASS	SU PULSION
	RGT LETSGO	LG AUDACE	LG ABSALON	SPIROU	SU SAUVIGNON			
			RGT LUXEO	FABULOR	RGT NOBELLO	RGT SUNDEO	SU HYSTORIC	
Assez sensibles								
			LG ARLETY	SU HYBISCUS				
				BELZEBUTH	FACILITY	KARDIGAN	SU HORIZON	
	JERIKO	CHEVIGNON		GENERIK	KWS MILLESIME	LID PAVANE	RGT PROFUSIO	RGT VALPARAISO
Très sensibles								
	SU HYREAL	COMPLICE						
		CELEBRITY		CHAMDOR	LID MACUMBA	RGT LOOKEO		
				AUCHY				
		PRESTANCE						

() à confirmer

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES).

Évaluation du risque

En présence de symptôme, le risque est fort.

Il convient de rester vigilant et de surveiller d'éventuelles apparitions de symptômes.

Surveillez en priorité les variétés sensibles et rester attentif sur son développement sur les variétés tolérantes.

• Septoriose

Elle est présente sur les feuilles basses dans de nombreuses parcelles (13 des 25 observées) mais ce n'est qu'à partir du stade 2 nœuds que sa progression vers les feuilles supérieures impacte le potentiel. Cependant, 11 des 25 parcelles observées sont à 2 ou 3 nœuds et la septoriose est notée sur les F3 dans 5 de ces 11 parcelles. La F2 est concernée pour une seule parcelle au stade 2 nœuds.

Le modèle Septo-LIS® d'Arvalis montre une légère progression du risque septoriose (tableau ci-dessous) pour les semis précoces notamment pour les variétés assez sensibles les plus précoces.

Septo-LIS® d'Arvalis

Simulation : 23/03/2026		Variete : LG ABSALON, semée le :		Variete : PRESTANCE, semée le :		Variete : CELEBRITY, semée le :	
ARVALIS	Station :	15/10/2025	10/11/2025	15/10/2025	10/11/2025	15/10/2025	10/11/2025
Departement : 16	CHALAIS -RIOUX-MARTIN	--	--	--	--	--	--
Departement : 17	SAINTES	--	--	++	--	++	--
Departement : 79	NIORT SOUCHE	--	--	--	--	--	--
Departement : 86	POITIERS -BIARD	--	--	--	--	--	--

Risque Fort +++ Risque Modéré ++ Risque Faible --

Période de risque : à partir du stade « 2 nœuds ».

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : si plus de 20 % des feuilles F4 définitives (=la F2 du moment au stade 2 nœuds) présentent des symptômes (4 feuilles sur 20).
- Variétés peu sensibles : si plus de 50 % des feuilles F4 définitives présentent des symptômes.
- Pour les parcelles à base de mélange variétal de différentes sensibilités à cette maladie, il n'existe pas de seuil de référence. Il convient de diminuer le risque au prorata du taux des variétés tolérantes dans votre mélange. Ainsi, la décision de protection contre cette maladie doit être raisonnée en fonction de vos observations (sur un échantillon plus important que pour les mono- variétés) et le niveau moyen de sensibilité des variétés en mélange.

Rappel :

Au stade 2 nœuds :

- La feuille pointante deviendra la F2 définitive.
- La F2 du moment déployé deviendra la F4 définitive.

A partir du stade Dernière Feuille Etalée (BBCH 39), l'observation se fait sur la F3 définitive, avec le seuil de 20 % pour les variétés sensibles et 50 % pour les variétés peu sensibles.

Il convient de faire attention au moment de l'observation à ne pas compte des faux nœuds et de bien suivre le déploiement progressif des futures feuilles qui sont déjà formées au stade 2 nœuds.


Au stade 2 nœuds (Z32)
la F2 définitive est pointante

tenir


Feuille pointante pas comptée car non encore déployée

Tableau de correspondance entre feuilles visibles et feuilles définitives sur céréales à paille, en année normale :

Feuille déployée	Au stade 1 nœud BBCH 31	Au stade 2 nœuds BBCH 32	Au stade dernière feuille pointante BBCH 37	Au stade dernière feuille étalée BBCH 39
	Cela correspond aux feuilles définitives suivantes :			
F1	F4	F3	F2	F1
F2	F5	F4	F3	F2
F3	F6	F5	F4	F3



Feuilles du moment à observer



F2 = Feuille pour décider

Évaluation du risque

Près de 1/3 des parcelles ont atteint le stade 2 nœuds et sont en période de risque. Les prévisions climatiques des prochains jours deviennent favorables à de nouvelles contaminations. **Le risque est faible en général, mais il devient modéré** pour les parcelles précoces avec des variétés sensibles, ayant atteint le stade 2 nœuds.

Surveillez l'apparition des symptômes à partir du stade 2 nœuds.

Ce risque doit être évalué par l'observation, **sur les 3 derniers étages foliaires**, en fonction de la sensibilité variétale.

Surveillez en priorité les variétés sensibles, semées en octobre.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Les produits de biocontrôle sont listés dans la note de service DGAL/SDSPV/ 2026-72 datant du 11/02/26. [Téléchargez la liste.](#)

• Rouille brune

Cette maladie est notée (très faiblement) dans 1 des 15 parcelles. Cette parcelle est encore au stade 1 nœud.

Période de risque : à partir du stade « 2 nœuds ».

Seuil indicatif du risque : apparition de pustules sur l'une des 3 feuilles supérieures.

Évaluation du risque

Le **risque rouille brune est faible**.

Le retour des pluies peut favoriser la germination des spores, mais la chute des températures (< 15°C) peut être défavorable pour le développement de ce champignon. C'est à partir de 2 nœuds qu'une attaque précoce peut survenir et devenir nuisible.

Surveillez les variétés sensibles, au stade de sensibilité, notamment sur les parcelles de la bordure océanique, où humidité et douceur peuvent favoriser son développement.

• Autres maladies ou ravageurs :

Rhizoctone : il est observé dans 2 des 13 parcelles.


Fusariose base tige : il est observé dans 2 des 13 parcelles.

• Stade phénologique et état de la culture

Les orges d'hiver du réseau sont entre épi 1cm et 2 nœuds (BBCH 30 - 32), la majorité est à 1 nœud (BBCH 31).



Stades des Orges en Poitou-Charentes (en % parcelles)



• Rappel pour les maladies foliaires

Période et seuil indicatif du risque pour les maladies :

	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Rouille Naine
Période de risque	A partir de 1 Noeud	A partir de 1 Noeud	A partir de 1 nœud
Seuil indicatif de risque	<u>Variétés sensibles</u> : Plus de 10% des feuilles atteintes <u>Variétés moyennement et peu sensibles</u> : Plus de 25% des feuilles atteintes.	<u>Variétés sensibles</u> : plus de 10% des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le stade « 1 nœud » <u>Variétés moyennement et peu sensibles</u> : plus de 10% des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1mm depuis le stade « 1 nœud »	<u>Variétés sensibles</u> : Plus de 10% des feuilles atteintes <u>Variétés moyennement et peu sensibles</u> : Plus de 50% des feuilles atteintes.
	Comptabiliser ensemble les tâches de Rynchosporiose et d'Helminthosporiose dès le stade « 1 nœud » : ⇒ Si la somme des feuilles atteintes par l'une ou l'autre des maladies dépasse 10 ou 25% (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint		

• Rhynchosporiose de l'orge

Elle n'est pas présente dans les 8 parcelles observées cette semaine.

Période de risque : du stade « 1 nœud » (31) au stade « sortie des barbes » (49).

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 nœud » (31).
- Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 nœud » (31).
-

Évaluation du risque

Les orges sont en période de risque. Le risque pour de nouvelles contaminations peut évoluer en fonction de la pluviométrie annoncée.

Le délai d'incubation très long (30 jours environ) impose de rester vigilant. Les symptômes sont en cours d'apparition. Observez vos parcelles.

Pour les parcelles ayant atteint le stade 1 nœud (31), en cas de présence également d'helminthosporiose, le risque est à évaluer en comptabilisant l'ensemble des taches de ces deux maladies dès le stade « 1 nœud » (si la somme des feuilles atteintes par l'une ou l'autre des maladies dépasse 10 ou 25 % (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint.

• Helminthosporiose de l'orge

Cette maladie est observée dans 2 des 8 parcelles, dont une est au stade 1 nœud, mais étant peu sensible le seuil indicatif du risque n'est pas encore atteint.

Les symptômes d'helminthosporiose sont en cours de développement.

Période de risque : du stade « 1 nœud » (31) au stade « gaine éclatée » (47).

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes.
- Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25 % des feuilles atteintes.

Évaluation du risque

La majorité des parcelles sont en période de risque. Les conditions climatiques à venir peuvent devenir favorables à de nouvelles contaminations. **Le risque est modéré** pour le moment. **Observez vos parcelles.**

Pour les parcelles ayant atteint le stade 1 nœud (31), en cas de présence également de Rhynchosporiose, le risque est à évaluer en comptabilisant l'ensemble des taches de ces deux maladies dès le stade « 1 nœud » (si la somme des feuilles atteintes par l'une ou l'autre des maladies dépasse 10 ou 25 % (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint.



Méthodes alternatives.

Choix variétal : privilégier les variétés présentant une bonne tolérance Note >6.

• Rouille naine de l'orge :

Non encore observée dans les parcelles du réseau. La douceur de fin février début mars est favorable à la maladie, à surveiller dès l'approche du stade 1 nœud.

Période de risque : du stade « 1 nœud » (31) au stade « gaine éclatée » (47).

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : Plus de 10% des feuilles atteintes,
- Variétés moyennement et peu sensibles : Plus de 50% des feuilles atteintes.

Évaluation du risque

La majorité des parcelles est au stade 1 nœud et le **risque peut évoluer** dans ces parcelles. Surveillez les variétés sensibles en période de risque.

Guide de l'observateur Céréales à paille pour vous aider

Un guide de l'Observateur *céréales à paille* a été édité par le réseau des BSV Grandes cultures Nouvelle-Aquitaine. Il permet de mettre en place des observations sur votre exploitation, avec des protocoles d'observations pour chaque pathogène, des détails et photos d'identifications, des astuces d'observations et des éléments de comparaison avec d'autres pathogènes. Vous y trouverez aussi des informations sur les facteurs favorisant le pathogène et les méthodes prophylactiques à mettre en place pour limiter l'installation ou le développement du pathogène. Ce guide est composé à la fois :

- de fiches générales qui rappellent les bonnes pratiques d'observations, les outils d'aides à l'analyse de risque (modèles, grille de risques...),
- de fiches individuelles par bio-agresseur qui permettent d'identifier les bio-agresseurs et leurs symptômes, d'éviter les confusions, ... pour affiner l'analyse de risque et la gestion des parcelles.

Vous pouvez **télécharger le guide complet et/ou les fiches individualisées par pathogène** : [Guide observateur céréales à paille](#).




Les notes nationales de biodiversité à découvrir : [Oiseaux & santé des agro-écosystèmes](#)

Colza


- **Météo ([cliquez ici](#))**
- **Stade phénologique et état de la culture**

39 parcelles du réseau Poitou-Charentes sont observées cette semaine.

La floraison est toujours en cours dans les parcelles du réseau : 33% des parcelles sont au stade F1 « début floraison, 1ère fleur ouverte », la parcelle est verte » et 51% au stade F2 « allongement de la hampe florale, nombreuses fleurs ouvertes ».



Carte des parcelles de colza observées du 18 au 24 mars 2026
(Terres Inovia)



Evolution des stades du colza en % de parcelles
(Terres Inovia)

Rappel des stades

Stade E (BBCH 55) : « Boutons séparés avec des pédoncules floraux allongés et inflorescences secondaires dégagées ».

Stade F1 (BBCH 60) : « début floraison, 1ère fleur ouverte », la parcelle est verte ».

Stade F2 (BBCH 61) : « Allongement de la hampe florale, nombreuses fleurs ouvertes ».


Stade G1 (BBCH 70) : « Chute des premiers pétales. Les 10 premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm ».



Stades du colza
(Crédit Photo : Terres Inovia)

• Sclérotinia

Il est important de repérer le stade F1 pour pouvoir anticiper l'apparition du stade G1 qui marque le début de la période de risque vis-à-vis du sclérotinia. La date d'apparition du stade F1 varie selon la précocité à floraison des variétés ainsi que le contexte pédoclimatique. En fonction des températures, le colza mettra de 6 à 12 jours pour passer du F1 au stade G1 (100 dj, base 0).



Période de risque : à partir de la chute des pétales (BBCH 70) jusqu'à la fin de la floraison.

• Meligèthes

Observations terrain

Les méligèthes sont observés sur plantes dans 5 parcelles de colza cette semaine. Toutes les parcelles concernées sont au stade F1.

*Rappel : Les adultes de méligèthes perforent les boutons floraux du colza pour se nourrir du pollen et également pour pondre mais les larves n'ont aucune incidence sur le développement du bouton. Les adultes en endommageant le pistil, provoquent l'avortement des boutons floraux. **Cependant, dès l'apparition des premières fleurs, ils ne sont plus nuisibles car le pollen est accessible et ces insectes deviennent au contraire des pollinisateurs.***

Les populations de méligèthes sont régulées par de nombreux prédateurs notamment des hyménoptères (petites abeilles) qu'il convient de préserver pour jouer leur rôle de régulateur.

Période de risque : du stade D1 (boutons accolés) au début de la floraison F1.

Seuil indicatif de risque : il dépend du stade et de la vigueur du colza :

Etat du colza	Stades du colza	
	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza vigoureux (sol profond, bonne vigueur des plantes, peuplement optimal, pas d'autres dégâts)	3 méligèthes par plante, <i>mais il est aussi possible d'attendre le stade E selon le contexte de croissance de l'année pour ré-évaluer le risque plus tard.</i>	6 à 9 méligèthes par plante
Colza stressé ou peu développé (climat stressant, déficit hydrique, peuplement trop faible ou trop important, vigueur faible des plantes, autres dégâts)	1 méligèthe par plante	2 à 3 méligèthes par plante

Évaluation du risque

La majorité des parcelles du réseau n'est plus en période de risque. Le risque a dû être pris en compte.

Le comptage des méligèthes est à maintenir dans les parcelles sans fleurs.

Le dénombrement sur plante est le seul moyen pour définir le risque. Il doit se combiner en plus **avec le stade de la culture et l'état du couvert.**



Attention : les méligèthes sont résistants à la plupart des pyréthrinoïdes actuels.



Méthodes alternatives : Mélange variétal

La stratégie de lutte vis-à-vis des méligèthes vise à maintenir la population à un niveau tolérable (et non à l'éradiquer) pour que la floraison puisse s'engager sans retard important et que les compensations puissent s'exprimer au maximum. Le colza est une plante présentant d'importantes capacités de compensation. Lorsque la culture est vigoureuse, elle peut faire face à des attaques de méligèthes même très fortes.

Dans les situations où les attaques de méligèthes sont généralement faibles à modérées, **l'association d'une variété haute et très précoce à floraison** en mélange à 5-10% avec la variété d'intérêt peut permettre de rester en dessous des seuils d'intervention. Cette variété haute et très précoce sera en effet **plus attractive** pour les méligèthes « protégeant » ainsi les plantes de la variété d'intérêt.

Dans les situations à forte pression, les plantes pièges ne seront pas suffisantes.

Pour aller plus loin :

[Surveillance et lutte contre le méligèthe](#)

- **Pucerons cendrés**

Observations terrain

Une observation (sur 16 parcelles renseignées) de pucerons cendrés en bordure est signalée dans une parcelle de colza située à BREUIL-LA-RÉORTE (17), avec 2 colonies par m² en bordure.

Avec la limitation des solutions efficaces pour la prise en compte du risque pucerons cendrés lorsque les colonies sont bien implantées, il est encore plus important de diagnostiquer plus tôt le début des infestations.

Période de risque : A partir de la montaison jusqu'à la fin du stade G4 (10 premières siliques sont bosselées).

Seuil indicatif de risque : 2 colonies présentes par m² de culture.

Évaluation du risque

Avec les données disponibles le risque est **nul** à ce jour.

La présence d'auxiliaires est à prendre en compte dans la limitation du développement des insectes en parcelle.

Pour rappel : différence entre colonie et manchon



Colonie de pucerons (une dizaine d'individus ; photos de gauche) et manchon (plusieurs générations ; photo de droite)
(Terres Inovia)

- **Autres bioagresseurs**

Mycosphaerella

La maladie est observée sur feuilles dans 7 parcelles du réseau sur 13 renseignées :

- La présence est faible dans 5 parcelles
- La présence est moyenne à forte dans 2 parcelles

Les parcelles concernées sont situées en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres.


Lors de la prise en compte du risque sclérotinia au stade G1 (BBCH 70), il faudra également considérer la présence de mycosphaerella.


Le risque lié à cette maladie est faible à modéré actuellement.

Pois protéagineux de printemps

- **Stade**

4 parcelles de pois de printemps sont actuellement enregistrées dans le réseau BSV Poitou-Charentes. Les stades sont entre le stade 1 feuille à 4 feuilles.





Carte des parcelles de pois de printemps observées du 18 au 24 mars 2026


• Sitone du pois (*Sitona lineatus*)

La présence de morsures de sitones est observée cette semaine sur deux parcelles, à la note de 1 au stade 2F et 4F (1 à 4 morsures).

Les sitones sont observés dans de nombreuses parcelles hors réseau.

Période de risque : de la levée au stade 6 feuilles

Seuil indicatif de risque : note 2 : 5 à 10 morsures par plante, sur les dernières feuilles.



Évaluation du risque

Le risque est actuellement **faible** avec les informations disponibles.

Les parcelles de pois de printemps qui lèveront dans les prochains jours et inférieures à 6F doivent faire l'objet d'une surveillance attentive.

Leviers agronomiques

Soigner l'implantation permet une levée rapide des pois, les rendant plus à même de résister aux attaques des ravageurs de début de cycle.



- **Thrips du lin et des céréales (*Thrips angusticeps*)**

La présence de thrips n'est pas observée cette semaine sur les parcelles suivies.

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles

Seuil indicatif de risque : en moyenne 1 thrips par plante.

Toutefois, le thrips même en grand nombre n'engendre de dégâts importants que si les pois ont une levée lente, liée notamment à de mauvaises conditions climatiques, telles que des températures froides par exemple.

Évaluation du risque

Le risque est actuellement **faible** pour les parcelles inférieures à 3 feuilles.

Leviers agronomiques

Soigner l'implantation permet une levée rapide des pois, les rendant plus à même de résister aux attaques des ravageurs de début de cycle.

- **Maladies du pois**

Aucune maladie n'est signalée cette semaine dans le réseau.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes : Agriculteurs, Agri Distri Services, ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL, Bien aimé négoce, CA 17, CA79, CA86, CAP Faye sur Ardin, CAVAC, CAVAC Villejeus, CEA Loulay, Coop La Tricherie, Coop de Mansle-Aunac, Coop Saint Pierre de Juillers, Coop Sèvre et Belle, Ets Lamy, FDCETA 17, FREDON N-A, Lycée Xavier Bernard, NEOLIS, OCEALIA, Soufflet Agriculture, Terre Atlantique, Terrena Innovation, Terres Inovia.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).