



Kiwi

N°06
19/03/2026



Animateur filière

Emmanuelle MARCHESAN
FREDON 47
e.marchesanfredonaqui@laposte.net

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Kiwi N°X du
JJ/MM/AA »**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Kiwi

- **PSA** : des écoulements d'exsudats sont observés sur certaines parcelles, la surveillance est à maintenir.



• Données météorologiques

Depuis le dernier bulletin, les températures moyennes ont été proches à inférieures aux normales de saison. Elles sont repassées au-dessus des valeurs de saison en ce milieu de semaine. Selon les postes, des températures minimales comprises entre 1.1 et 8°C et des maximales entre 11 et 24.6°C ont été relevées. Côté précipitations, selon les stations 11 à 37 mm ont été enregistrés entre le 13 et le 16 mars.

Pour les prochains jours, un temps sec est prévu sur la majorité des secteurs avec des températures qui devraient être proches des normales de saison. Un temps perturbé est annoncé à partir du milieu de semaine prochaine.

Prévisions du 20 au 26 mars (source : Météo France)

	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23	MARDI 24	MERCREDI 25	JEUDI 26
Ste Livrade sur Lot (47)	 3° / 21° ◀ 10 km/h	 3° / 20° ☀ 5 km/h	 3° / 19° ▼ 15 km/h	 3° / 18° ◀ 5 km/h	 3° / 19° ◀ 10 km/h	 6° / 14° ▲ 20 km/h 55 km/h	 4° / 14° ▲ 20 km/h 50 km/h
Pompignac (33)	 6° / 20° ◀ 10 km/h	 6° / 19° ▶ 10 km/h	 6° / 18° ▼ 15 km/h	 5° / 18° ▲ 10 km/h	 5° / 19° ◀ 10 km/h	 7° / 14° ▲ 20 km/h 50 km/h	 5° / 14° ▲ 20 km/h 50 km/h
Bergerac (24)	 1° / 22° ◀ 10 km/h	 1° / 20° ▶ 10 km/h	 2° / 18° ▼ 15 km/h	 3° / 19° ▼ 10 km/h	 4° / 19° ◀ 10 km/h	 7° / 15° ▲ 20 km/h 50 km/h	 4° / 14° ▲ 20 km/h 50 km/h
Jonzac (17)	 6° / 20° ▶ 15 km/h	 4° / 19° ▶ 15 km/h	 4° / 18° ▶ 20 km/h	 3° / 19° ▲ 10 km/h	 4° / 18° ▲ 15 km/h	 7° / 14° ▲ 20 km/h 55 km/h	 4° / 13° ▲ 20 km/h 50 km/h
Orthez (64)	 4° / 21° ◀ 10 km/h	 5° / 22° ▶ 10 km/h	 8° / 19° ▲ 20 km/h	 6° / 18° ▶ 5 km/h	 2° / 20° ◀ 10 km/h	 7° / 15° ▲ 20 km/h 50 km/h	 5° / 14° ▲ 20 km/h 50 km/h

• Stades phénologiques

Hayward : stade « bourre visible » (BBCH 07) - stade « nervures des jeunes feuilles visibles » (BBCH 09) à stade « première feuille étalée » (BBCH 11).



« Bourre visible »



« Nervures des jeunes feuilles visibles »



« Première feuille étalée »

Variétés à chair jaune : stade « boutons floraux visibles » (BBCH 51).



« Boutons floraux visibles »

(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

- **PSA** (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

En sortie d'hiver-début de printemps la bactérie se manifeste par des écoulements d'exsudat sur les troncs et charpentières. Les variétés précoces (kiwi à chair jaune, kiwi vert précoce et pieds mâles de Hayward) sont particulièrement sensibles.

Des écoulements d'exsudat rougeâtre sont observés. Les symptômes sont plus nombreux que l'année dernière sur certaines parcelles.



Exsudats rougeâtres

(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

Evaluation du risque

Les conditions humides ont été favorables à l'expression de la bactérie, les parcelles sont à surveiller attentivement. Le temps sec en cours et annoncé pour les jours à venir sera moins favorable.

Mesures prophylactiques :

Afin de limiter les risques de contaminations, il faut éviter (dans la mesure du possible) de tailler par temps humide, veiller à désinfecter régulièrement le matériel de taille (trempage dans de l'alcool à 70°, alcool à brûler...), tailler en dernier les parcelles et les arbres contaminés et organiser les chantiers de taille afin de protéger rapidement les plaies occasionnées.

📖 **Consultez la fiche « [Bactérie responsable du chancre bactérien du kiwi \(PSA\)](#) » du Guide de l'Observateur**

- **Cochenille blanche du mûrier**

Selon nos simulations la période de ponte sous les boucliers va débuter en situation précoce et la migration des jeunes larves ne devrait pas intervenir avant les 5-10 avril.

Evaluation du risque

La période à risque débutera lors de la migration des jeunes larves.

Mesures prophylactiques :

La prophylaxie passe par l'élimination et la destruction des branches les plus envahies. Un décapage mécanique à la lance (eau sous pression) et/ou par brossage des charpentières et des troncs atteints permet d'éliminer une partie des cochenilles.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

📖 **Consultez la fiche « [Cochenilles](#) » du Guide de l'Observateur**

- **Xylébore disparate** (*Xyleborus dispar*)

L'essaimage des adultes s'effectue de façon très étalée et discontinue (février à mai). Il a lieu aux heures les plus chaudes de la journée, lorsque la température atteint au moins 18°C (voir le cycle biologique dans le [BSV n°2 du 05/02/26](#)).

Des captures ont été enregistrées à partir de la dernière semaine de février.



Evaluation du risque

Les températures en cours sont favorables aux émergences.

Mesures prophylactiques :

Les mesures prophylactiques sont à privilégier, la taille et la destruction des bois attaqués en les brûlant sont une précaution indispensable. Il est également nécessaire, en parallèle, d'essayer d'agir sur les « causes » qui favorisent les attaques de xylébore (présence de mouillères, carences...) par des aménagements et/ou méthodes culturales adaptées.

• Escargots

La présence d'escargots est notée sur certaines parcelles. Des dégâts sur bourgeons ont été signalés sur jeunes vergers.

• Auxiliaires

A cette période l'année, on observe principalement des araignées qui sont des prédateurs généralistes (Cf. Note nationale biodiversité Araignées ci-après). La présence d'acariens prédateurs du genre *Trombidium* est également notée sur certaines parcelles.

• Seuils de sensibilité au gel

Sensibilité au gel : stades phénologiques et seuils critiques

					
	Stade B Bourre visible	Stade C Nervures visibles	Stade D Feuilles étalées	Stade E Boutons floraux visibles	Stade F Début floraison
Kiwi	- 2°C	- 1°C	- 0.5°C	- 0.5°C	0°C

Source seuils critiques INRA - CTIFL

Remarque : les seuils retenus ont été déterminés à partir d'anciennes variétés, compte tenu de l'arrivée de nombreuses nouvelles variétés, ces seuils ne sont qu'indicatifs.

• Notes nationales biodiversité

Les notes sont accessibles en cliquant sur les images ci-dessous :



Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Kiwi sont les suivantes : BIK, Cadralbret, CDA 47, FREDON 47, FREDON 64, Garlanpy, Vergers Cancel, Les 3 domaines, SCAAP Kiwifruits de France, Vallée du Lot

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).