



Kiwi

N°19
06/08/2026



Animateur filière

Emmanuelle MARCHESAN
FREDON 47
e.marchesanfredonaqui@laposte.net

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Kiwi N°X du
JJ/MM/AA »**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Kiwi

- **PSA** : la surveillance des parcelles est à maintenir.
- **Punaises phytophages** : période à risque de pontes et d'éclosions.
- **Cochenille blanche** : la période de migration des jeunes larves de deuxième génération est terminée en situations précoces.



• Données météorologiques

Depuis le dernier bulletin, une petite baisse des températures moyennes a été enregistrée entre le 25 et le 27 juillet mais elles sont restées majoritairement supérieures aux valeurs de saison (températures minimales comprises entre 12 et 21°C et maximales entre 24 et 41°C).

Les précipitations orageuses qui sont intervenues entre le 24 juillet et le 3 août ont apporté de 4 à 50 mm selon les stations.

Pour les jours à venir, après un risque d'orages annoncé pour cette fin de semaine, le temps devrait rester chaud et globalement sec.

Prévisions du 7 au 13 août (source : Météo France)

	VENDREDI 07	SAMEDI 08	DIMANCHE 09	LUNDI 10	MARDI 11	MERCREDI 12	JEUDI 13
Ste Livrade sur Lot (47)	 14° / 33° ▼ 10 km/h	 17° / 37° ▲ 10 km/h	 21° / 35° ▲ 10 km/h	 19° / 34° ► 10 km/h	 20° / 37° ◀ 10 km/h	 21° / 37° ▲ 10 km/h	 20° / 35° ▲ 10 km/h
Pompignac (33)	 16° / 32° ▲ 10 km/h	 19° / 35° ▲ 10 km/h	 20° / 31° ▲ 15 km/h	 18° / 32° ► 10 km/h	 20° / 36° ◀ 10 km/h	 21° / 33° ▲ 15 km/h	 18° / 33° ▲ 15 km/h
Bergerac (24)	 13° / 34° ► 10 km/h	 15° / 37° ▲ 15 km/h	 19° / 35° ▲ 15 km/h	 19° / 34° ▼ 10 km/h	 18° / 37° ◀ 5 km/h	 20° / 38° ▲ 10 km/h	 19° / 36° ▲ 10 km/h
Jonzac (17)	 15° / 32° ▲ 15 km/h	 17° / 35° ▲ 20 km/h	 18° / 31° ▲ 15 km/h	 17° / 32° ► 10 km/h	 18° / 36° ◀ 10 km/h	 19° / 34° ◀ 15 km/h	 18° / 33° ▲ 15 km/h
Orthez (64)	 15° / 32° ► 15 km/h	 18° / 35° ▲ 15 km/h	 19° / 35° ▲ 20 km/h	 20° / 33° ► 10 km/h	 19° / 37° ▼ 15 km/h	 20° / 34° ▲ 15 km/h	 20° / 33° ▲ 15 km/h

• Stades phénologiques

Stade développement du fruit (BBCH 78-79 pour Hayward).

• PSA (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

Des taches sur feuilles (taches nécrotiques avec halos jaunes) sont observées sur certaines parcelles. On ne note pas d'évolution des symptômes.

Evaluation du risque

Les conditions chaudes et sèches ne sont pas favorables à la bactérie. Attention cependant aux épisodes orageux (les blessures occasionnées par la grêle et le vent constituent des portes d'entrée pour PSA).

La surveillance des parcelles doit être maintenue.

Mesures prophylactiques :

Afin de limiter les risques de contaminations, les opérations de taille et d'éclaircissage (qui contribuent à ouvrir des voies d'entrées pour la bactérie) sont à réaliser par temps sec (si possible lorsque la température est supérieure à 25°C) en veillant à désinfecter régulièrement le matériel de taille (trempage dans de l'alcool à 70°, alcool à brûler..).

- **Dépérissements**

Des dépérissements sont observés dans certains vergers suite aux épisodes caniculaires.

- **Punaises phytophages**

En parcelles, des éclosions et des larves de punaises phytophages sont observées.

Sur notre réseau de piégeage punaise diabolique *Halyomorpha halys*, des captures d'adultes et de larves (stades L2 à L5) sont enregistrées. Les prises sont en augmentation cette semaine.



Eclosions et larve d'*Halyomorpha halys*, larve de punaise Coreidae
(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

Evaluation du risque

Période à risque de pontes et d'éclosions.

 **Consultez la fiche « [Punaises phytophages](#) » du Guide de l'Observateur**

- **Cochenille blanche du mûrier (*Pseudaulacaspis pentagona*)**

En parcelles de référence (secteur Lot-et-Garonne), la migration des jeunes larves de deuxième génération est terminée. Des larves mobiles sont encore observées sur le secteur Landes.

Mesures prophylactiques :

L'élimination des branches les plus envahies ainsi qu'un décapage mécanique à la lance et/ou par broissage des charpentières et des troncs permettent d'éliminer une partie des cochenilles.

- **Flatide pruineux (*Metcalfa pruinosa*)**

En parcelles de référence, les populations sont relativement faibles actuellement.

Le parasitisme par l'hyménoptère *Neodryinus typhlocybae* est noté. Des larves parasitées (présence de kyste sous l'ébauche alaire de la larve de *Metcalfa* et de cocons) sont observées.

Mesures prophylactiques :

Afin de limiter son extension, les mesures prophylactiques telles que le débroussaillage des environs très propices (bords des cours d'eau avec ronces et orties...) et le broyage des adventices sont à privilégier.



Larves de *Metcalfa* parasitées (cocons)
(Crédit Photo : E. Marchesan – FREDON 47)

- **Drosophile à ailes tachetées (*Drosophila suzukii*)**

Sur notre réseau de piégeage *Drosophila suzukii*, les captures sont faibles.

- **Cicadelles**

La présence de cicadelles vertes (larves et adultes) est notée sur certaines parcelles.

- **Auxiliaires**

Des chrysopes et des araignées sont actuellement observées.



Œufs de chrysope et trombidium
(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

• Notes nationales biodiversité

Les notes sont accessibles en cliquant sur les images ci-après :



Guide de l'observateur Fruits à pépins pour vous aider

Un Guide de l'Observateur fruits à pépins a été édité par le réseau des BSV Arboriculture fruitière Nouvelle-Aquitaine. Il permet de mettre en place des observations sur votre exploitation, avec des protocoles d'observations pour chaque pathogène, des détails et photos d'identifications, des astuces d'observations et des éléments de comparaison avec d'autres pathogènes. Vous y trouverez aussi des informations sur les facteurs favorisant le pathogène et les méthodes prophylactiques à mettre en place pour limiter l'installation ou le développement du pathogène. Ce guide est composé à la fois :

- de fiches générales qui rappellent les bonnes pratiques d'observations, les outils d'aides à l'analyse de risque (modèles, grille de risques...),
- de fiches individuelles par bio-agresseur qui permettent d'identifier les bio-agresseurs et leurs symptômes, d'éviter les confusions, ... pour affiner l'analyse de risque et la gestion des parcelles.

Vous pouvez **télécharger le guide complet et/ou les fiches individualisées par pathogène** :
[Guide observateur fruits à pépins](#) [Fiches individualisées par pathogène](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Kiwi sont les suivantes : BIK, Cadralbret, CDA 47, FREDON 47, FREDON 64, Garlanpy, Vergers Cancel, Les 3 domaines, SCAAP Kiwifruits de France, Vallée du Lot

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).