



Kiwi

N°20
10/09/2026



Animateur filière

Emmanuelle MARCHESAN
FREDON 47
e.marchesanfredonaqui@laposte.net

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Kiwi N°X du
JJ/MM/AA »**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Kiwi

- **PSA** : la surveillance des parcelles est à maintenir.
- **Punaies phytophages** : captures d'adultes et de larves.
- ***Drosophila suzukii*** : les captures restent faibles.



• Données météorologiques

Depuis début août, les températures moyennes journalières sont restées majoritairement au-dessus des valeurs de saison. Des températures minimales comprises entre 11 et 23°C et des maximales entre 21 et 41°C ont été enregistrées. Depuis ce milieu de semaine les températures sont en baisse.

Les précipitations orageuses parfois accompagnées de vent et de grêle qui ont eu lieu au cours du mois d'août ont apporté de 24 à 100 mm selon les stations. Depuis début septembre, de faibles pluies sont intervenues (0.5 à 15 mm).

Pour les jours à venir, un temps sec et des températures qui devraient redevenir supérieures aux normales sont annoncés.

Prévisions du 11 au 17 septembre (source : Météo France)

	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15	MERCREDI 16	JEUDI 17
Ste Livrade sur Lot (47)	 10° / 27° ▲ 10 km/h	 13° / 28° ▼ 10 km/h	 11° / 30° ▼ 10 km/h	 13° / 34° ▲ 5 km/h	 15° / 33° ▲ 20 km/h	 15° / 27° ▲ 15 km/h	 11° / 27° ▼ 10 km/h
Pompignac (33)	 13° / 25° ▼ 20 km/h	 14° / 27° ▲ 10 km/h	 15° / 30° ▼ 10 km/h	 15° / 33° ▲ 5 km/h	 17° / 31° ▲ 20 km/h	 15° / 25° ▲ 15 km/h	 13° / 25° ▲ 15 km/h
Bergerac (24)	 9° / 28° ▼ 10 km/h	 12° / 30° ▼ 10 km/h	 10° / 30° ▼ 10 km/h	 11° / 34° ▲ 5 km/h	 13° / 32° ▲ 20 km/h	 15° / 27° ▲ 15 km/h	 10° / 26° ▼ 10 km/h
Jonzac (17)	 9° / 27° ▲ 15 km/h	 10° / 28° ▲ 10 km/h	 11° / 31° ▲ 5 km/h	 12° / 33° ▲ 10 km/h	 15° / 30° ▲ 20 km/h 40 km/h	 17° / 26° ▲ 15 km/h	 12° / 26° ▲ 15 km/h
Orthez (64)	 11° / 25° ▼ 15 km/h	 13° / 27° ▲ 10 km/h	 13° / 29° ▲ 10 km/h	 13° / 33° ▲ 10 km/h	 14° / 30° ▲ 20 km/h 40 km/h	 13° / 26° ▼ 15 km/h	 11° / 26° ▲ 15 km/h

• Stades phénologiques

Stade développement du fruit (BBCH 79-81 pour Hayward).

• PSA (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

Dans nos parcelles de référence, on ne note pas d'évolution des symptômes sur feuilles (taches nécrotiques avec halos jaunes).

Evaluation du risque

Les conditions chaudes et sèches ne sont pas favorables à la bactérie. Attention cependant aux épisodes orageux (les blessures occasionnées par la grêle et le vent constituent des portes d'entrée pour PSA).

La surveillance des parcelles doit être maintenue.

Mesures prophylactiques :

Afin de limiter les risques de contaminations, les opérations qui contribuent à ouvrir des voies d'entrées pour la bactérie sont à réaliser par temps sec (si possible lorsque la température est supérieure à 25°C). Il convient de veiller à désinfecter régulièrement le matériel de taille (trempage dans de l'alcool à 70°, alcool à brûler...).

- **Dépérissements**

Des dépérissements sont observés dans certains vergers.

- **Punaises phytophages**

En parcelles, des larves de punaises phytophages sont observées ainsi que quelques piqûres sur fruits.

Sur notre réseau de piégeage punaise diabolique *Halyomorpha halys*, des captures d'adultes et de larves (stades L2 à L5) sont enregistrées. Une hausse des prises est notée depuis mi-août.



Larves d'*Halyomorpha halys* et dégâts
(Crédit Photos : E. Marchesan – FREDON 47)

Evaluation du risque

Période à risque.

📖 **Consultez la fiche « [Punaises phytophages](#) » du Guide de l'Observateur**

- **Cochenille blanche du mûrier (*Pseudaulacaspis pentagona*)**

En parcelles de référence (secteur Lot-et-Garonne), la formation des boucliers de cochenille blanche est en cours et ils commencent à être visibles sur les fruits.

Mesures prophylactiques :

L'élimination des branches les plus envahies ainsi qu'un décapage mécanique à la lance et/ou par brossage des charpentières et des troncs permettent d'éliminer une partie des cochenilles.



Bouclier sur fruit

(Crédit Photo : E. Marchesan – FREDON 47)

📖 **Consultez la fiche « [Cochenilles](#) » du Guide de l'Observateur**

- **Flatide pruineux (*Metcalfa pruinosa*)**

En parcelles de référence, les populations sont relativement faibles.

Le parasitisme par l'hyménoptère *Neodryinus typhlocybae* est noté. Des larves parasitées (cocons) sont observées.

Mesures prophylactiques :

Afin de limiter son extension, les mesures prophylactiques telles que le débroussaillage des environs très propices (bords des cours d'eau avec ronces et orties...) et le broyage des adventices sont à privilégier.

- **Drosophile à ailes tachetées (*Drosophila suzukii*)**

Sur notre réseau de piégeage *Drosophila suzukii*, les captures restent faibles.

📖 **Consultez la fiche « [Drosophile suzukii](#) » du Guide de l'Observateur**

- **Cicadelles**

La présence de cicadelles vertes (larves et adultes) est notée sur certaines parcelles.

• Auxiliaires

Des coccinelles et des araignées sont actuellement observées.



Coccinelle *Stethorus*

(Crédit Photo : E. Marchesan – FREDON 47)

• Notes nationales biodiversité

Trois nouvelles notes sont disponibles en cliquant sur les images ci-dessous :



Autres notes accessibles en cliquant sur les images ci-après :



Guide de l'observateur Fruits à pépins pour vous aider

Un Guide de l'Observateur fruits à pépins a été édité par le réseau des BSV Arboriculture fruitière Nouvelle-Aquitaine. Il permet de mettre en place des observations sur votre exploitation, avec des protocoles d'observations pour chaque pathogène, des détails et photos d'identifications, des astuces d'observations et des éléments de comparaison avec d'autres pathogènes. Vous y trouverez aussi des informations sur les facteurs favorisant le pathogène et les méthodes prophylactiques à mettre en place pour limiter l'installation ou le développement du pathogène. Ce guide est composé à la fois :

- de fiches générales qui rappellent les bonnes pratiques d'observations, les outils d'aides à l'analyse de risque (modèles, grille de risques...),
- de fiches individuelles par bio-agresseur qui permettent d'identifier les bio-agresseurs et leurs symptômes, d'éviter les confusions, ... pour affiner l'analyse de risque et la gestion des parcelles.

Vous pouvez **télécharger le guide complet et/ou les fiches individualisées par pathogène :**

[Guide observateur fruits à pépins](#) [Fiches individualisées par pathogène](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Kiwi sont les suivantes : BIK, Cadralbret, CDA 47, FREDON 47, FREDON 64, Garlanpy, Vergers Cancel, Les 3 domaines, SCAAP Kiwifruits de France, Vallée du Lot

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).