



Légumes de plein champ et d'industrie

N°07
17/09/2026



Animateur filière

Aurore TAILLEUR
FREDON N-A
aurore.tailleur@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale de ce
bulletin autorisée. Reproduction
partielle autorisée avec la
mention « extrait du bulletin de
santé du végétal Nouvelle-
Aquitaine Légumes de plein
champ et d'industrie N°7
du 17/09/26 »

Edition Sud Nouvelle-Aquitaine

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur **[formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Asperge

- **Criocères** : toujours des adultes visibles dans les parcelles.
- ***Stemphylium*, Rouille** : forte pression, surveillez les parcelles irriguées.

Carotte

- **Adventices** : problématique majeure.
- **Nématodes** : présence de dégâts sur de nombreuses parcelles.

Maïs doux

- **Sésamie, Pyrale, *H. armigera*** : pression chenilles en bout d'épis, soyez vigilants !

Haricot

- ***H. armigera*** : soyez vigilants risque élevé sur toutes les parcelles.
- **Nématodes** : présence de parcelles avec d'importants dégâts.

Tomate

- **Les récoltes se terminent.**

Notes nationales

- **[« Flore des bords de champs & santé des agroécosystèmes »](#)**
- **[Notes nationales - Biodiversité](#)**



Prévisions météorologiques (source : Météo France)

Stations	Prévision pour les 7 jours à venir :				
Blaye (33)	VENDREDI 18  15° / 23° ▼ 15 km/h	SAMEDI 19  12° / 25° ▼ 15 km/h	DIMANCHE 20  12° / 26° ▼ 15 km/h	LUNDI 21  14° / 27° ► 15 km/h	MARDI 22  14° / 29° ► 15 km/h
Saint-Jean- d'Illac (33)	VENDREDI 18  15° / 24° ► 15 km/h	SAMEDI 19  10° / 27° ▼ 10 km/h	DIMANCHE 20  11° / 27° ▼ 10 km/h	LUNDI 21  13° / 28° ► 10 km/h	MARDI 22  12° / 30° ► 10 km/h
Herm (40)	VENDREDI 18  15° / 23° ► 15 km/h	SAMEDI 19  10° / 26° ◀ 5 km/h	DIMANCHE 20  10° / 28° ▼ 10 km/h	LUNDI 21  12° / 28° ▼ 10 km/h	MARDI 22  11° / 30° ▼ 10 km/h
Denguin (64)	VENDREDI 18  13° / 24° ▲ 15 km/h	SAMEDI 19  10° / 27° ▲ 5 km/h	DIMANCHE 20  12° / 28° ► 10 km/h	LUNDI 21  14° / 28° ► 5 km/h	MARDI 22  12° / 30° ► 5 km/h
Marmande (47)	VENDREDI 18  15° / 25° ► 15 km/h	SAMEDI 19  12° / 27° ↻ 5 km/h	DIMANCHE 20  13° / 28° ▼ 10 km/h	LUNDI 21  14° / 30° ▼ 10 km/h	MARDI 22  13° / 31° ► 10 km/h



Solutions de biocontrôle

Consultez la *note de service* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

De manière générale et pour toutes les cultures, soyez attentifs à la préservation des auxiliaires naturels dans vos stratégies de protection des cultures.

- **Surface renseignée**

Pour la rédaction de ce bulletin, 612 ha ont été renseignés : 412 ha dans les Landes et 200 ha dans le Blayais.

- **Etat sanitaire des cultures**

- **Criocère**

Landes : on note la présence d'adultes sur 147 ha (soit 36 % des parcelles observées), dont 30 ha avec plus d'un individu visible par mètre linéaire de rang. Des larves sont également visibles dans quelques parcelles.

Blayais : quelques rares individus adultes sont observés sur 10 ha (soit 5% des parcelles observées) avec moins d'un individu visible par mètre linéaire de rang, principalement sur les plantations 2026.

Seuil indicatif de risque :

Il existe un seuil à partir duquel il est risqué de laisser les populations se développer sur les stades juvéniles de l'asperge. Ce seuil est estimé à 3 criocères pour 10 mètres linéaires de rang.

Evaluation du risque :

Les conditions climatiques actuelles sont toujours favorables à l'activité des criocères. Les seuils indicatifs de risque sont atteints dans certaines parcelles des Landes. Soyez vigilants !

- **Mouches mineuses de l'asperge (*Ophiomyia simplex*)**

Landes : pas d'attaque signalée.

Blayais : des symptômes de mouches mineuses de l'asperge liés aux attaques de première génération au bas des tiges (mines) sont toujours en hausse et visibles sur 60 ha (soit 30% des surfaces observées) dont 20 ha avec présence sur plus de 5% des turions.

Evaluation du risque :

La période à risque touche à sa fin dans le Blayais avec la fin du second vol constatée.

- **Thrips**

Blayais : on note toujours la présence de quelques thrips, à des niveaux inférieurs au seuil indicatif de risque.

Seuil indicatif de risque : > 5 individus / frappe.

Evaluation du risque :

Les conditions climatiques 2026 sont favorables à la présence de ce ravageur.

- **Pucerons de l'asperge**

Blayais : aucun nouveau foyer n'a été détecté. La situation a été maîtrisée sur la parcelle infestée dans le dernier bulletin.

Evaluation du risque :

Les conditions climatiques 2026 sont favorables à la présence de ce ravageur.

- ***Stemphylium***

Landes : des symptômes de *Stemphylium* sont présents sur 100% des parcelles surveillées (soit 412 ha) avec présence sur cladodes et avec chute de cladodes de 5 à 60%, selon les parcelles. Les attaques les plus importantes sont constatées sur les plantations de l'année sous aspersion où les irrigations ont été soutenues et rapprochées.

Blayais : on observe une nette évolution sur les parcelles avec symptômes ainsi que des nouvelles contaminations sur les parcelles irriguées. On note des symptômes sur 110 ha (soit 55 % des parcelles observées) :

- 70 ha avec présence sur cladodes ;
- 40 ha avec chute des cladodes > 5%.

Evaluation du risque :

La période à risque vis-à-vis du *Stemphylium* est encore en cours dans les parcelles irriguées.

○ **Rouille**

Landes : la présence de rouille sur cladodes est signalée sur 244 ha (soit 59% des surfaces observées) dont 16 ha avec plus de 5 % du feuillage attaqué. Les parcelles observées les plus attaquées sont des parcelles conventionnelles avec systèmes de goutte-à-goutte ou des parcelles conduites en Agriculture Biologique sous aspersion.

Blayais : la maladie **est forte** progression. Des symptômes sont observés sur 100 ha (soit 50% des parcelles observées) dont 70 ha avec présence sur plus de 5% des turions et des attaques parfois très importantes sur les plantations 2026 irriguées par aspersion.



Rouille sur cladodes, ramifications principales et secondaires

(Crédit Photo : C. LABROUCHE – COPADAX)

Evaluation du risque :

La période à risque vis-à-vis de la rouille est encore en cours dans les parcelles irriguées.

○ **Rhizoctone violet**

Blayais : des symptômes de Rhizoctone violet sont signalés sur 2 ha (même parcelle que les années précédentes).

○ **Adventices**

Landes : la présence d'adventices dans les aspergeraies reste problématique. Dans certaines parcelles très touchées, **no note** des zones « noyées » sous des morelles, des nicandras et des digitaires, adventices difficiles à maîtriser. De plus, on constate cette année la présence marquée et significative du pourpier qui peut devenir très envahissant s'il n'a pas été géré à temps. Le souchet demeure une adventice très préoccupante dans les aspergeraies, car difficilement maîtrisable.

• Surface renseignée

Pour la rédaction de ce bulletin, environ 1 530 ha de carottes de saison ont été renseignés.

Les récoltes de carottes de saison sont en cours et avec des tonnages pas très élevés pour le moment, compris entre 30 et 40 tonnes / ha.

• Etat sanitaire des cultures

○ Nématodes

Carotte de saison : des dégâts de nématodes, notamment de *Meloidogyne sp.*, sont visibles sur plusieurs parcelles à la récolte à hauteur de 5% d'attaque. On note une parcelle avec une forte attaque de *Meloidogyne sp.*, soit 38 ha impactés avec plus de 50% des carottes qui présentent des galls. On note également quelques parcelles avec des attaques de *Pratylenchus sp.*, avec observation de carottes fourchues.

Dégâts de nématodes *Pratylenchus sp.* sur carottes

(Crédit Photo : C. CHATEAU – Invénio)



○ Maladies du feuillage

Carotte de saison : sur les feuillages plus âgés ainsi que sur carottes à maturité, on observe des feuillages grillés à 15-20% voire plus, ce qui nécessite, dans la majorité des cas, des récoltes par le sol. Pour les parcelles en grossissement, des symptômes sont visibles, mais à des niveaux d'attaque plus faibles (3 à 5%).

Evaluation du risque :

Les conditions climatiques actuelles (humidité et chaleur) sont favorables au développement de ces maladies. Cependant, les chaleurs de septembre permettent aux feuillages de sécher malgré l'humidité du matin.

○ *Pythium*

Carotte de saison : les parcelles récoltées avec du retard (primeur décalée, ou saison hors maturité) présentent des dégâts de *Pythium* avec 30 à 40% d'attaque. Dans les autres parcelles, on note quelques carottes présentant des lésions (5% d'attaque). On constate que certaines parcelles n'ayant jamais eu de carottes auparavant présentent malgré tout de fortes attaques de *Pythium*.

Dégâts de *Pythium* sur carottes

(Crédit Photo : C. CHATEAU – Invénio)



○ Adventices

Carotte de saison : la problématique majeure en carottes de saison est le désherbage.

La problématique du souchet est particulièrement importante. Le développement et la prolifération du **souchet** sont incontrôlables, il n'y a que peu de parcelles sans souchet. L'impact va de 1 à 2 ha répartis en ronds dans les parcelles à, dans certains cas, des parcelles envahies à 60%. Face au souchet la filière carotte est dans une réelle impasse ! On compte en surfaces détruites ou non récoltables (ronds dans les parcelles, ou parcelles complètes) environ 180 ha.

Dans les parcelles plus avancées - en grossissement, on note toujours beaucoup d'adventices, avec du désherbage manuel toujours en cours et/ou des écimages. Dans les parcelles les plus touchées, on compte plusieurs opérations de désherbages manuels par parcelle (jusqu'à 150 h/ha) et parfois plus de 2 écimages. On retrouve principalement des morelles noires, daturas, amarantes, pourpiers, nicandras et digitaires.

Dans les parcelles à maturité, les écimages sont réalisés afin de faciliter la récolte dans les parcelles avec des adventices. Lorsque les parcelles sont **très** sales, la récolte s'effectue par le sol.

Méthodes alternatives :

- Binages
- Ecimages
- Désherbages manuels



Invasion de souchets sur des carottes de saison + écimage du souchet

(Crédit Photo : C. SIMON / A. PRUILHO – Invénio)

Maïs doux



• Surface renseignée

Pour la rédaction de ce bulletin, 470 ha ont été renseignés. Les parcelles vont du stade « grossissement du grain » à « récolte ».

• Etat sanitaire des cultures

• Vers gris

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 0,31 *A. segetum* par piège et par jour et 0,19 *A. ipsilon* par piège et par jour. Cette semaine, 5 papillons d'*A. segetum* et 3 papillons d'*A. ipsilon* ont été piégés, en maïs dans le Sud Adour et les Sables.



Aucune attaque signalée cette semaine.

Période de risque : jeune maïs, « 2 feuilles » à « 8 – 10 feuilles »


Seuil indicatif de risque : 5% de pieds attaqués.

Evaluation du risque :

Dans la majorité des parcelles, le stade de sensibilité de la culture est dépassé.

○ **Pyrale**

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 2,42 pyrales par piège et par jour. Cette semaine, 29 pyrales ont été capturées en maïs dans les secteurs Sud Adour et Gaves.



Des attaques de pyrales en bouts d'épis sont constatées en Lot-et-Garonne.



Larve de pyrale sur épis de maïs doux
(Crédit Photo : A. TAILLEUR – FREDON NA)

Evaluation du risque :


Actuellement, les populations sont majoritairement au stade chenille à l'abri dans les cannes de maïs et dans les épis.

Il est trop tard pour la mise en place d'une gestion du risque. Prévoir les mesures prophylactiques suivantes :

- broyage très fin des tiges ;
- dessouchage des pivots.

○ **Sésamie**

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 5,32 sésamies par piège et par jour. Cette semaine, 234 papillons ont été capturés, dont 233 en maïs dans les secteurs Sud Adour, Gaves et Sables.



Aucune attaque signalée cette semaine.

Période de risque : maïs doux ayant atteint le stade « 3 – 4 feuilles » (BBCH 13 – 14).

Seuil indicatif de risque : le seuil indicatif de risque à la parcelle est atteint lorsqu'on observe 3 % de pieds flétris (pieds de pontes).

Evaluation du risque :


Actuellement, les populations sont majoritairement au stade chenille à l'abri dans les cannes de maïs et dans les épis. **Attention à la troisième voire quatrième générations dans les épis !**

Il est trop tard pour la mise en place d'une gestion du risque. Prévoir les mesures prophylactiques suivantes :

- broyage très fin des tiges ;
- dessouchage des pivots.

○ *Helicoverpa armigera*

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 0,57 *Helicoverpa armigera* par piège et par jour. Cette semaine, 23 papillons ont été capturés mais aucun en maïs.



Des attaques d'*Helicoverpa armigera* sont visibles en bout d'épis sur de nombreuses parcelles, notamment en Lot-et-Garonne.



Larves d'*Helicoverpa armigera* sur épis de maïs doux


(Crédit Photo : A. TAILLEUR – FREDON NA)

Evaluation du risque :

Les maïs doux proches du stade « floraison » sont particulièrement attractifs pour ce ravageur. Soyez vigilants pour les parcelles tardives !

○ *Spodoptera exigua*

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 3,17 *Spodoptera exigua* par piège et par jour. Cette semaine, 38 papillons ont été capturés, dont 32 en maïs, dans les Sables.



Aucune attaque signalée cette semaine.

○ **Autres bio-agresseurs**

Cicadelles : des attaques de cicadelles sont visibles sur 200 ha (secteurs Haute-Lande – Sud Gironde – Lot-et-Garonne) : 150 ha avec moins de 10 individus visibles par plantes attaquées et 50 ha avec 10 à 100 individus visibles par plantes attaquées.

Charbon commun : les symptômes de charbon commun sont très présents dans les parcelles de maïs doux mais pas ou peu d'incidence constaté sur la qualité des récoltes.

○ **Adventices**

De nombreuses adventices sont visibles dans les parcelles de maïs doux, notamment en Lot-et-Garonne : morelles, chénopodes, pourpiers, panics dichotomes, digitaires et souchets.

Haricot

• **Surface renseignée**

Pour la rédaction de ce bulletin, 830 ha ont été renseignés. Toutes les parcelles de référence ont été récoltées.

• **Aléas climatiques**

Depuis le dernier bulletin, l'impact des fortes chaleurs s'est fait ressentir :

- Avec des échaudages qui ont provoqué des hétérogénéités de densité dans les parcelles ;
- Avec du dégroupage de maturité (fortes chaleurs à la floraison) et donc des calibres hétérogènes notamment sur des parcelles d'extra-fins.

• **Etat sanitaire des cultures**

○ ***Helicoverpa armigera***

Dans les parcelles de haricot, des dégâts sont toujours constatés sur feuilles et sur gousses, avec présence de chenilles.

Sur le réseau de pièges à phéromones, nous sommes à 0,57 *Helicoverpa armigera* par piège et par jour. Cette semaine, 23 papillons ont été capturés dont 19 en haricot dans les Sables (cf. courbe paragraphe maïs doux).

Evaluation du risque :

Le risque d'attaque *Helicoverpa armigera* dans les parcelles est fort. Toutes les parcelles sont à surveiller.

○ Nématodes

Des attaques de nématodes sont signalées notamment sur 38 ha fortement impactés dans la zone des Sables.

Pertes de pieds liées à des attaques de nématodes en parcelles de haricot

(Crédit Photo : I. MATHIEU-FEKEI – FREDON NA)



○ Sclerotinia

La maladie est observée dans les parcelles et notamment sur 110 ha avec un pied attaqué pour 10 mètres linéaires de rang.

○ Adventices

La gestion des adventices est mieux gérée en cette fin de saison. Les principales problématiques concernent le pourpier, la morelle, l'amarante, le datura, le souchet, le galinsoga, les panics et les digitaires.



Adventices en parcelles de haricot

(Crédit Photo : A. TAILLEUR – FREDON NA)

Tomate

• Surface renseignée

Les récoltes se terminent.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Légumes de plein champ et d'industrie sont les suivantes :

Adar Blayais, Altus, Aquitaine Légumes Surgelés, Arvalis Institut du Végétal, Conserves France, Copadax, FREDON 64, Fredon Nouvelle-Aquitaine, GRCeta, Groupe Larrère, Invenio, Légum'Land, Lur Berri, Maïsador, Ombrière, Planète Végétal, Saga Végétal, Seretram, Soléal, Sonito, Terres du Sud Fruits et Légumes, Unilet, Vicampo

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).