



# Pomme de terre

**N°15**  
**07/07/2026**



**Animatrices filière**  
Zone Poitou-Charentes :  
Pauline CASTEL  
**ACPEL**  
pauline.castel@acpel.fr

Zone Limousin :  
Noëllie LEBEAU  
**CDA 23**  
noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr

**Directeur de publication**  
Bernard LAYRE  
Président de la Chambre  
Régionale Nouvelle-Aquitaine  
Boulevard des Arcades  
87060 LIMOGES Cedex 2  
accueil@na.chambagri.fr

**Supervision**  
DRAAF  
Service Régional  
de l'Alimentation  
Nouvelle-Aquitaine  
22 Rue des Pénitents Blancs

La stratégie  
**écophyto 2030**  
Réduire et améliorer  
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale  
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée  
avec la mention « extrait du  
bulletin de santé du végétal  
Nouvelle-Aquitaine Pomme de  
terre N°X du JJ/MM/AA »**

Bulletin disponible sur [bsv.na.chambagri.fr](https://bsv.na.chambagri.fr) et sur le site de la DRAAF [draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal](https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal)

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**  
en cliquant sur **[formulaire d'abonnement au BSV](#)**

## Ce qu'il faut retenir

### Situation générale

- Les conditions restent à l'heure actuelle toujours chaudes et très sèches sur tous les secteurs, et marquent les cultures. On observe des brûlures sur feuillage, des défanages précoces et des retards de développement.

### Situation sanitaire

- **Mildiou** : Aucun symptôme n'est relevé. Les conditions météorologiques ne sont pas du tout favorables aux contaminations. Le mildiou n'est pas la préoccupation du moment.
- **Doryphores** : Les coléoptères restent présents et actifs mais en faible nombre, les populations semblent ralenties par la chaleur sur certains secteurs.
- **Pucerons** : Il n'est pas observé d'individus cette semaine.
- **Enherbement** : Du datura est relevé sur certaines parcelles du réseau.
- **Dégâts sur récoltes** : On observe cette semaine des déchets de **gale** sur certaines récoltes et des désordres physiologiques (**re-germinations**), probablement liés aux précipitations du début de semaine.


**Lien vers la liste des produits  
phytopharmaceutiques de biocontrôle actualisée :  
[ICI](#)**

**Notes nationales Biodiversité : [ICI](#)**



## Secteur de production primeur de l'île de Ré :


Après la vague de chaleur de la mi-juin, les températures ont été plus clémentes jusqu'au 2 juillet (maximales de 26°C). Depuis le 3 juillet, les températures sont de nouveau en hausse et ont atteint un maximum de 32°C le 5 juillet. Aucune précipitation n'est enregistrée.



Les arrachages se terminent cette semaine sur l'île de Ré. Sur les dernières récoltes, on relève toujours des dégâts de rhizoctone brun ou taupins, plus ou moins importants selon les parcelles et variétés.



## Secteur de production du Limousin :

Dans le Limousin, les maximales oscillent autour des 30°C à 32°C. Le temps reste sec et chaud, et aucune précipitation n'est enregistrée.



Ce temps sec et très chaud occasionne de forts dégâts dans les cultures, qui présentent de plus en plus de symptômes de brûlures sur feuilles et sur tiges. Les plantes défanent prématurément alors que les calibres de récolte ne sont pas ou tout juste atteints.

## Secteur de production Aquitain :



**Pour le secteur Aquitain**, ces derniers jours ont également été chauds et très secs. Des températures maximales atteignant les 36°C sont enregistrées.

Selon les parcelles et les dates de plantation, les cultures se présentent à différents stades. Certaines zones peinent à se développer dans les conditions chaudes et sèches actuelles. Les récoltes se poursuivent sur les parcelles les plus avancées.

# Situation sanitaire

## • Mildiou (*Phytophthora infestans*)

La maladie est provoquée par le champignon *Phytophthora infestans*. Son caractère explosif et les pertes qu'elle peut engendrer sur les rendements la rendent particulièrement nuisible.

**Période de risque :** le champignon apprécie les conditions humides et douces (taux d'hygrométrie > 87 % pendant plusieurs heures et températures idéalement comprises entre 15 et 25°C). Des températures négatives ou au contraire très élevées (plus de 30°C) bloquent son développement. Les conditions météorologiques de la campagne jouent donc un rôle primordial, sachant que les attaques précoces au printemps sont généralement plus dommageables.

**Seuil indicatif de risque :** avant même l'apparition des taches si les conditions sont très favorables.

### Situation sur le terrain :

Sur les parcelles de l'Île de Ré, les observations sont très limitées car la quasi-totalité est défanée. Sur les parcelles des réseaux Aquitaine et Limousin, il n'est pas relevé de symptômes.

Évaluation du risque au 07/07/2026 avec Visiofarm® (ex Miléos®) :

Stations météorologiques	Pluviométrie sur les 7 derniers jours	Dépassements du seuil de risque sur les 7 derniers jours	Niveaux de risque
Ars-en-Ré (17)	0 mm	Le 3 juillet	Faible (VS, VI, VR)
Le-Bois-Plage-en-Ré (17)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Sainte-Marie-de-Ré (17)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Beaupuy (47)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Fumel (47)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Montpon Menesterol (24)	1 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Pauillac (33)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Retjons (40)	0,2 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Rion des Landes (40)	0,4 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Chabanais (16)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Melle (86)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Limoges (87)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Ahun (23)	5,5 mm	/	Faible (VS, VI, VR)
Voutezac (19)	0 mm	/	Faible (VS, VI, VR)

Les niveaux de risque (absent, faible, moyen, élevé, très élevé) sont issus de l'interprétation conjuguée des données du modèle MILEOS®, des prévisions météorologiques et de la situation notée sur le terrain.

Ils sont déclinés par variétés (VS : variétés sensibles, VI : variétés intermédiaires, VR : variétés résistantes).

**Évaluation du risque :** les conditions météorologiques actuelles et à venir ne sont pas du tout favorables aux contaminations. Le risque est très faible.

### Mesures de prophylaxie :

- Sous abris, les atmosphères confinées (chaudes et humides) sont favorables au développement de cette maladie, c'est pourquoi pour ce type de production, la bonne gestion de l'aération des tunnels est cruciale.
- L'eau et la présence d'humidité sont aussi primordiales. Ainsi, la pratique des irrigations doit permettre un ressuyage rapide et éviter toute stagnation de l'eau (choix des horaires d'arrosage, éviter les fuites à la base des asperseurs et au niveau des raccords...).

La présence « d'inoculum de départ » est aussi déterminante dans l'apparition des premiers foyers. Ainsi, il est important de ne pas « entreposer » des tas de déchets dans un coin de champ. En l'absence de gel, les repousses issues de ces déchets sont la première source de contamination. En fin de culture N-1, il est important de gérer ses déchets, complètement !

- **De même, des parcelles qui ont présenté des symptômes les années précédentes sont plus propices à des manifestations précoces.**

### • Alternariose (*Alternaria alternata* et *Alternaria solani*)

La maladie est provoquée par les champignons *Alternaria*. Les pertes de rendement sont généralement faibles, à moins de contaminations très précoces.

**Période de risque :** l'alternariose se développe à des températures comprises entre 20 et 30°C, avec alternance de périodes sèches et humides. Elle est favorisée en cas de senescence ou stress sur les cultures. C'est habituellement une maladie de fin de cycle.

**Seuil indicatif de risque :** dès l'apparition des premières taches en cas d'attaque précoce.

### Situation sur le terrain :

Des symptômes sont relevés en Creuse et Corrèze (seulement sur certaines variétés).

**Évaluation du risque :** en conditions irriguées, le stress climatique pourrait favoriser l'arrivée de l'alternariose sur les variétés les plus sensibles.

### Mesures de prophylaxie :

La lutte consiste à éviter les situations de stress, par de bonnes pratiques de fertilisation et d'irrigation, et choisir des variétés peu sensibles.

### • Doryphores (*Leptinotarsa decemlineata*)

Les doryphores sont des coléoptères phytophages qui s'attaquent aux feuilles des plantes solanacées et préférentiellement la pomme de terre. Leurs larves sont peu mobiles et très voraces. Durant les 3-4 semaines de leur développement, elles peuvent défolier complètement les plantes sur lesquelles elles se situent. Les dégâts s'observent par foyers et peuvent être considérables en maraîchage sur petites surfaces. Selon les années et les zones de production, on peut observer deux à trois générations sur la campagne.

**Facteurs de risque :** les adultes émergent de manière échelonnée au printemps (avril-mai). Leur activité est favorisée par l'absence de pluies et des températures élevées. L'historique et l'environnement des parcelles sont clairement des facteurs aggravants.

**Seuil indicatif de risque :** deux foyers de larves sur 1 000 m<sup>2</sup>

**Évaluation du risque :** les coléoptères sont toujours présents. Sur l'Île de Ré, l'impact sur les rendements est minime à ce stade. Dans les zones plus tardives et notamment le Limousin, le risque actuel semble modéré car la plupart des larves ont fini leurs cycles et sont en train de se nymphoser. Il faut désormais guetter les nouveaux adultes et surtout les pontes. Dans tous les cas, une observation des parcelles est nécessaire avant d'envisager toute intervention.

### Mesures de prophylaxie :

La présence de culture de pommes de terre en année n-1 ou à proximité favorisent l'arrivée des adultes émergents. Il est fortement recommandé d'espacer les pommes de terre dans l'espace et dans le temps.

- **Pucerons (*Myzus persicae* et autres espèces)**

Les pucerons croisés dans les champs de pommes de terre regroupent un grand nombre d'espèces, plus ou moins spécifiques de la culture, sous forme aptère ou ailée. Ils causent des dégâts directs en prélevant la sève, qui n'occasionnent des pertes qu'en cas de fortes pullulations. Ils causent surtout des dégâts indirects en disséminant de nombreux virus, d'où une surveillance accrue en production de plants.

**Période de risque :** l'activité des pucerons est favorisée par l'absence de pluies et des températures élevées. De fortes précipitations limitent l'arrivée d'individus ailés mais impactent moins les colonies d'aptères. L'environnement des parcelles peut être un facteur aggravant.

**Seuil indicatif de risque (non valable en production de plants) :** 50 % folioles porteuses

Il n'est pas observé d'individus cette semaine.

- **Enherbement**

Des parcelles, notamment dans le Limousin, présentent du **Datura**, qui semble bien s'accommoder des conditions chaudes et sèches.



**Datura en parcelle de pomme de terre dans le Limousin**  
(Crédit photo : Anne Laure Fuscien (CDA19))

- **Dégâts sur tubercules**

Sur l'Ile de Ré, on continue d'observer sur certaines récoltes des perforations de taupins ainsi que déchets dus au rhizoctone brun.

Dans le Limousin, certains producteurs ont commencé les arrachages (marché primeur). Sur les récents arrachages, les précipitations du début de semaine ont généré quelques désordres physiologiques (**re-germination**).



**Phénomène de re-germination observée cette semaine**  
(Crédit photo : Antoine Mear (Comité Centre et Sud))

De même, on observe des premiers dégâts de **gale** sur tubercules.



**Gale sur pomme de terre**  
(Crédit photo : Antoine Mear (Comité Centre et Sud))

- **Notes nationales et informations**
- **Lien vers la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle actualisée : [ICI](#)**
- **Notes nationales Biodiversité : [ICI](#)**



A ce jour, 7 notes ont été rédigées. Voici les liens pour chacune de ces différentes notes :

- Abeilles sauvages et santé des agroécosystèmes ([ICI](#))
- Abeilles – Pollinisateurs - Des auxiliaires à préserver ([ICI](#))
- Flore des bords de champs et santé des agroécosystèmes ([ICI](#))
- Oiseaux et santé des agroécosystèmes ([ICI](#))
- Vers de terre et santé des agroécosystèmes ([ICI](#))
- Coléoptères et santé des agroécosystèmes ([ICI](#))
- Papillons et leur rôle dans les agroécosystèmes ([ICI](#))

Il est important de considérer l'importance de ces alliées que sont les abeilles (ou plus largement les insectes pollinisateurs) sur les cultures et leur présence en abords des parcelles (talus, bandes enherbées, haies...).

### Deux fiches récentes :



Note Nationale Biodiversité




Cette note vise à accompagner la démarche agro-écologique portée par le Bulletin de Santé du Végétal. Elle propose une synthèse de 2 pages sur un volet biodiversité associé à la santé générale des agro-écosystèmes.



Note Nationale Biodiversité




Cette note vise à accompagner la démarche agro-écologique portée par le Bulletin de Santé du Végétal. Elle propose une synthèse de 2 pages sur un volet biodiversité associé à la santé générale des agro-écosystèmes.



**Coléoptères & santé des agro-écosystèmes**

**Brins d'infos**

**Coléo / diversité**  
 Monde : ~ 390 000 espèces décrites  
 France : ~ 12 000 espèces. Soit ~ un quart des insectes en France (77 % de l'entomofaune française, source : IFEN) [\(ici - info wikipedia.org\)](#)

**Coléo / tendances**  
 Plusieurs études européennes relèvent une chute moyenne de 70% de la biomasse d'insectes. Une grande partie est celle des coléoptères. Cette diminution de la biomasse est, par exemple mise en évidence par le "Syndrome du pare-brise propre". [\(ici - voir infoprivacy.fr\)](#)



**Papillons - leurs rôles dans l'agroécosystème**

**Brins d'infos**

**Papillons / description**  
 Communément appelés "papillons", les Lépidoptères sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est caractérisée par deux paires d'ailes membraneuses recouvertes d'écaillies colorées. En effet, "lepidos" signifie "écailles" en grec, et "pteros" désigne les ailes.  
 Les papillons ont un cycle de développement qui se caractérise par une métamorphose complète qui passe par quatre stades : œuf, larve, nymphe et imago. Ils sont ainsi dits holométaboles. Si la forme adulte (ou imago) s'appelle communément papillon, la larve est appelée chenille et la nymphe chrysalide. Certaines espèces peuvent faire plusieurs générations par an. [\(ici - voir infoprivacy.fr\)](#)

*(Cliquez sur l'image pour accéder au site ou sur les liens énoncés ci-dessus)*

### Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Pomme de terre sont les suivantes :

CDA 17-79, CDA 19, CDA 23, CDA 47, CDA 86, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Comité Centre et Sud, Midi Agro Consultant, Ortolan, ACEPEL et Coopérative UNIRE

**Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).**

