



Vigne

Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

N°17
21/07/2026



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre
Interdépartementale
d'agriculture Charente-
Maritime Deux-Sèvres
magdalena.girard@cmds.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°17 du 21/07/2026 »

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 33 – fermeture de la grappe

Mildiou

- Pas d'évolution
- Très faibles contaminations possibles localement

Black rot

- Pas d'évolution
- Contaminations possibles localement

Oïdium

- Légère progression dans quelques TNT
- Risque de très faibles contaminations localisées
- Fin de sensibilité des grappes

Tordeuses

- Deuxième vol d'Eudémis toujours en cours, intensité faible

Cicadelle verte

- Suivi des larves

Flavescence dorée

- Troisième traitement entre le 13 juillet et le 16 août

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#)



Phénologie

Toujours quasiment aucune évolution depuis la semaine dernière : le stade moyen calculé sur 19 parcelles observées est de 33 - Fermeture - BBCH 77.

Les baies ne grossissent pas et restent dures.

Toutefois, dans certaines parcelles, on peut commencer à observer quelques baies arrivant timidement à véraison.




Stade 33 – fermeture de la grappe



Véraison Cabernet Sauvignon
Ile de Ré

Climatologie

→ De la semaine passée



Températures

Les températures moyennes de la semaine baissent et atteignent 25.1°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble du vignoble est de 20 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Cognac-Centre 16.2 mm, Cognac-Est 21.7 mm, Cognac-Nord 27.7 mm, Cognac-Ouest 25.9 mm, Cognac-Sud 15.4 mm, Iles-Charente-Maritime 8.9 mm, Littoral-Charente-Maritime 26.9 mm (période du 14/07 au 20/07).

→ Prévisions météo

Du 21/07 au 27/07, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul de 11,5 mm. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 24,7 mm de pluie. L'épisode pluvieux le plus important aura lieu le 26/07 avec un cumul pouvant aller de 10,9 mm à 23,4 mm en moyenne sur le vignoble. Les températures maximales vont rester stables autour de 33°C puis diminuer de 33 à 26°C en fin de semaine. Les minimales seront stables autour de 18°C.



→ Episodes de grêle

Plusieurs épisodes de grêle, plus ou moins impactants, ont eu lieu entre le 14 et le 16 juillet :

- Secteur sud – Estuaire : Saint-Bonnet-sur-Gironde, Mirambeau, Montendre, Épargnes, Boisredon.
- Secteur sud-est : Barbezieux, Jonzac, Chantillac, Saint-Saturnin, Fléac.
- Cœur du vignoble : Salles-d'Angles, Jarnac-Champagne, Saint-Preuil, Segonzac, Genté, Moulidars, Mosnac-Saint-Simeux, Celles, Gensac-La-Pallue.
- Axe Pons – Matha : Saint-Césaire, La Chapelle-des-Pots, Chaniers, Échebrune, Lonzac.
- Secteur Nord-Ouest : Sonnac, Brie-sous-Matha, Verdille, Louzignac, Thors, Haimps, Siecq, Louzac-St-André, St-Sulpice, Burie, Bercloux.
- Île d'Oléron : Saint-Denis-d'Oléron.



Secteur de Mons (17)

(Crédit photo J. Bertin-Vignaud – CARC)

Maladies

→ Mildiou

Observations

Les observations réalisées cette semaine ne mettent en évidence aucune évolution de la maladie, ni dans les témoins non traités, ni dans les parcelles de référence.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée


La semaine dernière, le risque potentiel est resté faible à très faible sur le vignoble à l'exception de quelques zones délimitées où le risque a augmenté (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière généralisée dans le vignoble, 82 % des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Au cours de la semaine, le risque sera globalement très faible sur le vignoble, à l'exception de quelques zones délimitées où le risque sera fort voire très fort (cf. cartographie).

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble.



Evaluation du risque :**Niveau de risque en augmentation localement, mais toujours majoritairement très faible.****▲ Très faibles contaminations possibles localement**

Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

→ Black rot

Observations

Le black rot est demeuré stable au cours de la semaine, sans nouvelle évolution observée.

Modélisation

Sur la semaine passée

D'après le modèle, au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté très fort.

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité modérée à très forte, de manière généralisée dans le vignoble, 93% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera très fort.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité modérée, très localement dans le vignoble.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :**Risque théorique toujours très fort.****▲ Contaminations possibles localement**

Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur

→ Oïdium

Observations

L'oïdium poursuit sa progression localement dans 7 témoins non traités. Celle-ci reste limitée à Arthenac et Bréville, mais s'avère plus marquée à Préguillac, où 80 % des ceps présentent désormais des symptômes. La maladie continue également de progresser sur grappes dans les témoins de Champagne-Vigny et Foussignac. Dans les autres témoins concernés, l'évolution demeure plus modérée.

Coté parcelles de référence, la situation reste stable, avec une légère progression uniquement observée à Pouillac sur feuille et sur grappe.

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté fort à très fort, les conditions sont restées favorables à l'oïdium (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement



Oïdium sur grappe
(Crédit photo L. Davidou – Phloème)



dans le vignoble, 43% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).


Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera fort à très fort. Les conditions seront favorables à l'oïdium.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble.

Attention, le modèle ne tient pas compte de l'hygrométrie et de l'humectation, mais uniquement de la pluviométrie.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.



Evaluation du risque :

Niveau de risque théorique en légère baisse, mais toujours fort à très fort. Fin de sensibilité des grappes aux nouvelles contaminations mais risque de propagation de proche en proche.



Très faibles contaminations possibles localement

 Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

Ravageurs

→ Tordeuses


Observations

Cette semaine, 84 captures d'Eudémis ont été enregistrées dans les deux Charentes. Des captures ont été observées à Ambleville (5), Ars (14), Arthenac (6), Burie (2), Echallat (1), Jurignac (4), Lachaise (4), Lignières-Sonneville (23), Pouillac (4), Réaux (2), Rouillac (2), Saint-Simeux (12), Saint-Simon de Pellouille (1), Vénérand (2).



Ponte de tordeuse
(Crédit photo J. Kerrinckx – CA16)





Information observations

Le vol de deuxième génération n'est pas encore terminé. Cependant, remplacez dès à présent les plaques engluées et les capsules de vos pièges afin d'assurer le suivi de la fin du vol de deuxième génération, mais également de couvrir le vol de troisième génération.

Modèle Activ

A ce jour, le modèle indique l'émergence de 40 à 70% des papillons eudémis. Des pontes et des éclosions ont été calculées au cours de la semaine dernière.

Dans les sept jours à venir

Le modèle indique l'émergence de 70 à 90% des papillons eudémis cette semaine. Les pontes et les éclosions vont se poursuivre dans la semaine à venir. Des premières perforations devraient être observées dès ce début de semaine.

→ Cicadelles vertes

Observations

Cette semaine, seulement 33 nouvelles captures ont été réalisées dans le vignoble, soit une moyenne de 0,5 capture par piège observé. L'intensité des captures dans les pièges chromatiques a nettement diminué au cours de la semaine écoulée, le vol se termine. Les observations ont été réalisées à Ambleville, Lignières-Sonneville, Meursac, Montguyon, Mortagne-sur-Gironde et Segonzac.

Par ailleurs, des larves ont été observées cette semaine à Mortagne-sur-Gironde.

Seuil de nuisibilité

Le seuil de nuisibilité est de 100 larves pour 100 feuilles.


Information observations

Les relevés des pièges chromatiques ne sont désormais plus utiles. Les suivis doivent à présent se concentrer sur les larves de cicadelles vertes.

La semaine prochaine, vous devez suivre l'évolution des populations larvaires en observant la face inférieure des feuilles. Pour rappel, les larves de cicadelles vertes sont facilement reconnaissables par leur mode de déplacement en « crabe ».

Le comptage devra être fait sur les feuilles âgées situées au niveau des grappes, en les retournant délicatement. Comptabiliser toutes les larves observées.





Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- Observations phénologie
- Recherche des symptômes de mildiou/oïdium/black rot
- Relevés des pièges chromatiques cicadelle verte (dernière semaine)
- **Comptages de larves de cicadelle verte**
- **Changement des capsules Eudémis**
- Relevés des pièges sexuels et alimentaires

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, la Coopérative d'Orignolles, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Courvoisier, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

