



N°16
29/07/2025



Animatrice filière

Marion POMPIER
Chambre d'agriculture
de la Corrèze
marion.pompier@correze.chambagri.fr

Suppléance :
Karine BARRIERE
Chambre d'agriculture
de la Corrèze
k.barriere@correze.chambagri.fr

Rédactrice(s) :
Marion POMPIER ou
Karine BARRIERE
Chambre d'agriculture
de Nouvelle-Aquitaine,
avec l'appui de Stéphane LUCAS
Syndicat du Chasselas de
MOISSAC

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF - Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Limousin N°X
du JJ/MM/AA »



Edition **Limousin**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

PHENOLOGIE

- De fermeture de la grappe à véraison.

MILDIOU

- Quelques symptômes liés aux repiquages. Le risque est faible. Soyez attentifs aux prévisions météo sur les parcelles touchées.

OIDIUM

- Pas d'évolution. Restez vigilants sur parcelles à risque.

BLACK ROT

- Pas d'évolution.

VERS DE GRAPPE

- Nous serions, en majorité, au stade nymphose.

Cicadelle de la Flavescence Dorée

- En attente du T3 pour le conventionnel. En bio T3 terminé.

Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture :

[Lien de téléchargement](#)



Note commune résistance :

[Lien de téléchargement](#)

Données météorologiques

• Météo de ces derniers jours

Une météo perturbée cette semaine, avec des précipitations hétérogènes, parfois concentrées en quelques minutes. La grêle est tombée sur le secteur d'Allasac sans faire de gros dégâts. En conséquence, les températures furent basses pour la saison.

- Branceilles : 24 mm
- Voutezac : 60 mm
- Verneuil : 25 mm

Vignoble	Station								Cumul hebdomadaire	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (26/04/25)
		lundi 21 juillet 2025	mardi 22 juillet 2025	mercredi 23 juillet 2025	jeudi 24 juillet 2025	vendredi 25 juillet 2025	samedi 26 juillet 2025	dimanche 27 juillet 2025		
Limousin	Verneuil (radar)	4,5	0	11,6	6,7	1,8	0	0	24,6	118,3
Limousin	Branceilles (radar)	1,1	0,1	19,4	0,5	0,6	0	0,3	22	127,8

• Prévisions du 29 juillet au 4 août (Source Météo France)

	Date	mar 29/07	mer 30/07	jeu 31/07	ven 01/08	sam 02/08	dim 03/08	lun 04/08
19	Température (°C)	14-28	16-29	15-29	15-29	14-29	13-28	13-30
	Pluie (mm)	0	1	0	0	0	0	0
								
87	Température (°C)	11-24	13-25	14-26	13-24	13-24	13-26	13-25
	Pluie (mm)	0	2	0	0	0	0	2
								

Météo mitigée prévue cette semaine. Le ciel couvert devrait porter peu de pluies et nous devrions assister à une hausse des températures

Etat général du vignoble

• Stades phénologiques

La véraison débute sur le chardonnay, le sauvignon et le merlot. Pour le reste la véraison est imminente.

		
Stades BBCH	77	81
Descriptif des stades	Fermeture de la grappe	Tout début véraison
Chardonnay		
Chenin		
Sauvignon blanc		
Merlot		
Cabernet franc		
Cabernet sauvignon		

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

Maladies fongiques

- Mildiou (*Plasmopara Viticola*)**

Modélisation :

Situation au 27 juillet :

Le risque est toujours faible à très faible selon le secteur. Aucune contamination épidémique ni extériorisation de symptômes modélisées cette semaine.

Simulation au 3 août :


La pression augmente avec les dernières précipitations, le risque sera moyen à faible à J+7. Le cumul nécessaire pour entraîner des contaminations épidémiques est de 5 mm à Branceilles et de 60 mm sur Verneuil. Aucune extériorisation de symptômes n'est attendue. Le temps d'incubation modélisé est de 5 jours.

Situation sur le terrain

De nouvelles taches issues de repiquages sont observées à Brivezac. Sur Allasac, les symptômes ont séché et il n'y a pas de nouveaux symptômes. Par ailleurs, la situation reste globalement saine et sous contrôle.

Evaluation du risque :

Le risque est modélisé faible. Dans les situations où le mildiou est installé, il y a toujours un risque de repiquage depuis les symptômes sporulés. Soyez attentifs aux prévisions météo.




Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

- L'épamprage permet de diminuer le développement d'organes vert à proximité du sol qui sont d'autant de support pour des contaminations primaires
- Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

Chronologie des contamination épidémiques mildiou et de l'extériorisation des symptômes



Les histogrammes positifs indiquent la pluviométrie moyenne enregistrée sur le secteur et son impact en termes de contaminations Mildiou. Les histogrammes négatifs rappellent la hauteur de la pluie et la date correspond à la sortie des symptômes liée à cette pluie (date théorique à droite du trait rouge ou réelle à gauche de ce trait). Une croix sur ces sorties indique que la sortie théorique n'a pas été observée au vignoble, le signe √ indique une observation de ces symptômes.

• Oïdium (Erysiphe necator)

Éléments de biologie

Suivre ce lien : ephytia.inra.fr/Biologie-epidemiologie-de-l'oïdium

Même pour les cépages peu sensibles, la période de sensibilité démarre au stade boutons floraux séparés.

Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, il peut même être lessivé par des pluies abondantes. Cependant les humidités relatives élevées lui sont favorables ; son développement requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, il affectionne les vignes vigoureuses dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.



Oïdium sur Baies :
Crédit photo : Euphytia- INRA

Situation au vignoble

La situation n'a pas évolué depuis la semaine dernière. Toujours quelques symptômes visibles dans une parcelle sensible secteur Allasac.

Evaluation du risque : La période de risque s'achève au stade de la « fermeture de la grappe ». Sur les parcelles n'ayant pas atteint totalement ce stade, vous devez encore rester vigilants.

Lorsque le stade fermeture de la grappe est totalement atteint :

- Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.

- Sur parcelle présentant des symptômes, ou bien sensibles, il faut rester vigilant jusqu'à la véraison afin de limiter la propagation du champignon.

Portez une attention particulière sur les cépages sensibles et dans les zones à historique oïdium.

 **Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur**



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#).

• Black Rot (*Guignardia Bidwellii*)

Éléments de biologie

Suivez ce lien : [ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot](http://ephytia.inra-biologie-epidemiologie-du-black-rot.fr)

Situation sur le terrain

Il n'y a pas d'évolution. La situation est saine.

Evaluation du risque :

Le risque est faible sur les parcelles à historiques et les cépages sensibles. Restez vigilants jusqu'à la véraison. Sur le reste du vignoble la protection peut être stoppée.



Symptôme de Black Rot sur grappe

Photo Syndicat du Chasselas

Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

- Réduire l'humidité des parcelles (enherbement maîtrisé, drainage, combler les mouillères...).
- Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

Ravageurs

- **Vers de la grappe (Lobesia botrana)**

Éléments de biologie

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Vers de la grappe – Ephytia \(Biologie, Epidémiologie\)](#)

Modélisation

Dans le Lot, le stade nymphose est majoritaire.

Situation au vignoble

Pas de piègeages cette semaine.

 **Consultez la fiche « [tordeuses](#) » du Guide de l'Observateur**



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Dans le cadre de la confusion sexuelle, les diffuseurs doivent être mis en place avant l'émergence de la première génération. L'efficacité du dispositif dépend du bon respect des conditions de pose (respect des densités de diffuseurs, renforcement des bordures ...). Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#).

- **Cicadelle de la Flavescence dorée (Scaphoidus Titanus)**

Élément de biologie

L'insecte vecteur se contamine en piquant pour se nourrir dans les vaisseaux du phloème d'une plante malade : c'est l'acquisition. Mais l'insecte n'est pas immédiatement infectieux, c'est la période de latence qui dure environ 30 jours. Après cette période d' « incubation », l'insecte infectieux le reste toute sa vie mais ne transmettra pas le phytoplasme à sa descendance. **Il pourra disséminer le phytoplasme de la Flavescence dorée au cours de ses vols et contaminer des plantes saines.** L'organisme, injecté dans le phloème de la plante, s'y multiplie et se pérennise durant toute la vie du cep.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)

Situation dans les parcelles

Pas de symptômes observés.



Symptômes sur feuilles de flavescence dorée

Crédit photo Ephytia - INRA

La date de troisième traitement sera publiée dans les prochains jours.

Communication de la DRAAF Aquitaine :

[Note d'information Flavescence dorée 2025 sur les traitements obligatoires contre la Flavescence dorée sur le secteur de la Corrèze \(dates, nombre de traitements et communes\).](#)

Une surveillance soignée doit être engagée sur tous les secteurs. La détection précoce des foyers permet une plus grande efficacité de la lutte.

Quatre symptômes doivent vous alerter :

- La décoloration des feuilles : en jaune pour les cépages blancs et en rouge pour les cépages noirs.
- L'aoûtement partiel ou imparfait des bois provoquant un port retombant des rameaux.
- L'enroulement des feuilles.
- Lorsqu'elles sont présentes, les grappes peuvent être flétries.



Symptômes de Flavescence
Crédit phot FREDON BFC



Symptômes de Flavescence
Crédit photo M. Baudouin

- **Cicadelle des grillures (Empoasca Vitis)**

Élément de biologie

Éléments de biologie : suivre ce lien : [Cicadelle verte – Ephytia \(Biologie\)](#)

Situation sur le terrain

Toujours présence de symptômes. Les larves sont toujours bien présentes dans le feuillage.



Dégâts de grillures
Crédit photo EUPHYTIA

Evaluation du risque :

Le risque est toujours bien présent. Il faut surveiller l'apparition des premiers symptômes et ne pas tarder à agir en cas de symptômes sur feuilles et lorsque le seuil indicatif de risque est dépassé. Compte tenu de la virulence de ce ravageur l'année passée, il faut rester vigilant.

NB : Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure. Le seuil indicatif de risque est de 50 larves de cicadelle pour 100 feuilles.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Des solutions de biocontrôle existent. Elles sont à appliquer sur des larves jeunes ou de manière « préventive ». Par exemple, l'application d'argile comme barrière physique.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (*cliquer sur les images*)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Prochain BSV, le 5 août 2025

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Limousin sont les suivantes : Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle Aquitaine, la Chambre Départementale d'Agriculture de Corrèze, la Fédération des Vins de la Corrèze, le Syndicat Viticole du Vin Paillé de la Corrèze et les producteurs du groupe 30000 VITI CORREZE.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".