



N°17
05/08/2025



Animatrice filière

Marion POMPIER
Chambre d'agriculture
de la Corrèze
marion.pompier@correze.chambagri.fr

Suppléance :
Karine BARRIERE
Chambre d'agriculture
de la Corrèze
k.barriere@correze.chambagri.fr

Rédactrice(s) :
Marion POMPIER ou
Karine BARRIERE
Chambre d'agriculture
de Nouvelle-Aquitaine,
avec l'appui de Stéphane LUCAS
Syndicat du Chasselas de
MOISSAC

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF - Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Limousin N°X
du JJ/MM/AA »



Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

PHENOLOGIE

- Stades de mi-véraison à fin véraison

MILDIOU

- Toujours quelques symptômes liés aux repiquages. Anticipez les risques de pluie jusqu'à la véraison et maintenez un feuillage fonctionnel

OIDIUM

- Pas d'évolution. Restez vigilants sur parcelles à risque jusqu'à véraison.

VERS DE GRAPPE

- Le troisième vol est en cours

Cicadelle de la Flavescence Dorée

- T3 pour le conventionnel à réaliser jusqu'au 17 août. En bio T3 terminé.

Liste des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture :

[Lien de téléchargement](#)



Note commune résistance :

[Lien de téléchargement](#)

Données météorologiques

- Météo de ces derniers jours

La semaine passée, les températures étaient fraîches pour la saison et le ciel majoritairement couvert. Il n’y a pas eu de précipitations.

- Prévisions du 5 août au 11 août (Source Météo France)

	Date	mar 05/08	mer 06/08	jeu 07/08	ven 08/08	sam 09/08	dim 10/08	lun 11/08
19	Température (°C)	16-33	14-33	15-38	19-36	16-35	17-38	20-35
								
87	Température (°C)	16-29	14-30	12-34	15-31	15-31	15-36	19-33
								

Nous devrions profiter d’une météo estivale cette semaine, avec un ciel dégagé et des températures en hausse, au niveau des normales de saison, marquée par des pics de chaleurs jeudi et dimanche.

Etat général du vignoble

- Stades phénologiques

La véraison a débuté sur l’ensemble des parcelles et se termine pour les cépages les plus avancés.

		
Stades BBCH	83	83
Descriptif des stades	Mi-véraison	Fin-véraison
Chardonnay		
Chenin		
Sauvignon blanc		
Merlot		
Cabernet franc		
Cabernet sauvignon		

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

Maladies fongiques

- Mildiou (*Plasmopara Viticola*)**

Situation sur le terrain

De nouvelles taches issues de repiquages sont observées à Brivezac. Pas d'évolution sur les autres secteurs. La situation reste globalement saine et sous contrôle.

Evaluation du risque :

Les grappes ayant débuté la véraison, elles sont moins sensibles.
 Dans les situations où le mildiou est installé, il y a toujours un risque de repiquage depuis les symptômes sporulés. Soyez attentifs aux prévisions météo. Il est important de préserver l'état sanitaire du feuillage afin qu'il reste fonctionnel jusqu'à la maturation et la mise en réserve.



Mildiou sur grappe (rot brun) et sur feuille :
Crédit photo : Syndicat du Chasselas de Moissac

Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

- L'épamprage permet de diminuer le développement d'organes vert à proximité du sol qui sont d'autant de support pour des contaminations primaires
- En cas de symptômes sur jeunes feuilles, un rognage léger peut permettre de limiter l'évolution du champignon en empêchant les repiquages vers le bas de la végétation.
- Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

• **Oïdium (Erysiphe necator)**

Situation au vignoble

Pas d'évolution depuis la semaine dernière. Dans l'ensemble, les parcelles sont saines.

Evaluation du risque : La période de risque s'achève au stade de la « fermeture de la grappe ». Sur les parcelles n'ayant pas atteint totalement ce stade, vous devez encore rester vigilants.

Lorsque le stade fermeture de la grappe est totalement atteint :

- Sur parcelle saine, la protection peut être stoppée.
- Sur parcelle présentant des symptômes, ou bien sensibles, il faut rester vigilant jusqu'à la véraison afin de limiter la propagation du champignon.

Portez une attention particulière sur les cépages sensibles et dans les zones à historique oïdium.



Oïdium sur Baies :
Crédit photo : Euphytia- INRA

 Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#).

Ravageurs

- **Vers de la grappe (Lobesia botrana)**

Modélisation

Dans le Lot, le vol G3 est en cours et les toutes premières larves L1 sont modélisées dans les secteurs précoces.

Situation au vignoble

Pas de piègeages cette semaine.

Évaluation du risque : Même si la pression n'a pas été importante jusqu'à aujourd'hui, vous devez être attentifs aux symptômes de perforations. Ces dégâts sont un indicateur fiable de la pression parasitaire. Les informations en provenance des vignobles voisins doivent vous inciter à la plus grande vigilance.

Seuil indicatif de risque :

- * 10 perforations pour 100 grappes en fin de G2
- * 5 perforations pour 100 grappes en fin de G2 (parcelle en confusion)



Perforations d'Eudemis
Crédit Euphytia INRA



Larve d'Eudemis
Crédit Biolineagroscience.com

📖 Consultez la fiche « [tordeuses](#) » du Guide de l'Observateur



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Dans le cadre de la confusion sexuelle, les diffuseurs doivent être mis en place avant l'émergence de la première génération. L'efficacité du dispositif dépend du bon respect des conditions de pose (respect des densités de diffuseurs, renforcement des bordures ...). Consultez la liste des produits de bio-contrôle en [cliquant ici](#).

• Cicadelle de la Flavescence dorée (Scaphoidus Titanus)

Élément de biologie

L'insecte vecteur se contamine en piquant pour se nourrir dans les vaisseaux du phloème d'une plante malade : c'est l'acquisition. Mais l'insecte n'est pas immédiatement infectieux, c'est la période de latence qui dure environ 30 jours. Après cette période d'« incubation », l'insecte infectieux le reste toute sa vie mais ne transmettra pas le phytoplasme à sa descendance. **Il pourra disséminer le phytoplasme de la Flavescence dorée au cours de ses vols et contaminer des plantes saines.** L'organisme, injecté dans le phloème de la plante, s'y multiplie et se pérennise durant toute la vie du cep.

Pour plus d'informations, suivre ce lien : [Cicadelle de la flavescence dorée – Ephytia](#)



Adulte de Scaphoideus titanus
Crédit photo www1.pms-lj.si - Database of Invertebrate Pictures

Situation dans les parcelles

Pas de symptômes observés.

Pour les communes concernées, la date de troisième traitement est à réaliser avant le 17 août.

Communication de la DRAAF Aquitaine :

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/flavescence-doree-dates-du-traitement-adulticide-contre-la-cicadelle-de-la-a3349.html>

Une surveillance soignée doit être engagée sur tous les secteurs. La détection précoce des foyers permet une plus grande efficacité de la lutte.

Quatre symptômes doivent vous alerter :

- La décoloration des feuilles : en jaune pour les cépages blancs et en rouge pour les cépages noirs.
- L'aoûtement partiel ou imparfait des bois provoquant un port retombant des rameaux.
- L'enroulement des feuilles.
- Lorsqu'elles sont présentes, les grappes peuvent être flétries.



Symptômes de Flavescence – Crédit phot FREDON BFC



Symptômes de Flavescence – Crédit photo M. Baudouin

- **Cicadelle des grillures (Empoasca Vitis)**

Élément de biologie

Éléments de biologie : suivre ce lien : [Cicadelle verte – Ephytia \(Biologie\)](#)

Situation sur le terrain

Toujours présence de symptômes. Quelques larves visibles dans le feuillage.



Dégâts de grillures

Crédit photo EUPHYTIA

Evaluation du risque :

Le risque est toujours bien présent. Il faut surveiller l'apparition des premiers symptômes et ne pas tarder à agir en cas de symptômes sur feuilles et lorsque le seuil indicatif de risque est dépassé.

NB : Ce ne sont pas les adultes mais les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillure.

Le seuil indicatif de risque est de 50 larves de cicadelle pour 100 feuilles.



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Des solutions de biocontrôle existent. Elles sont à appliquer sur des larves jeunes ou de manière « préventive ». Par exemple, l'application d'argile comme barrière physique.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (*cliquer sur les images*)



Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Dernier Bulletin. Bonnes vendanges

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Limousin sont les suivantes : Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle Aquitaine, la Chambre Départementale d'Agriculture de Corrèze, la Fédération des Vins de la Corrèze, le Syndicat Viticole du Vin Paillé de la Corrèze et les producteurs du groupe 30000 VITI CORREZE.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".