

Bulletin de Santé du Végétal
Nouvelle-Aquitaine

Vigne

N°16
21/07/2026

Edition Limousin

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT en cliquant sur formulaire d'abonnement au BSV

Ce qu'il faut retenir

Stades phénologiques

- **Stade majoritaire est « début véraison ».**

Black Rot

- **Le risque est nul.**

Mildiou

- **Le risque est très faible à ce stade. Restez attentifs aux orages.**

Oïdium

- **A ce stade, le risque est présent uniquement sur les parcelles à historique.**

Vers de grappe

- **Stade majoritaire : nymphose. Début du vol imminent.**

Cicadelle de la flavescence dorée

- **Le troisième traitement est en cours. A faire du 15 au 22 juillet.**

Annexes : *Liste mesures alternatives et prophylaxie*

Note-technique-Résistance-vigne-2026.pdf

Animatrice filière
Marion POMPIER
Chambre d'agriculture de la Corrèze
marion.pompier@na.chambagri.fr

Suppléance :
Karine BARRIERE
Chambre d'agriculture de la Corrèze
k.barriere@correze.chambagri.fr

Directeur de publication
Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision
DRAAF - Service Régional de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée. Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Vigne / Edition Limousin N°X du JJ/MM/AA »

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB

Météo

• Météo de ces derniers jours

Nous avons eu à subir une longue période de canicule, avec des températures dépassant chaque jour les 36°C. Les nuits chaudes ont favorisé l'accumulation de la chaleur. Les températures sont en légère baisse depuis mercredi, avec la survenue de l'orage. Malheureusement les précipitations ont surtout été accompagnées de grêle. Les dégâts sur les cultures sont parfois importants.



Dégâts causés par la grêle sur feuilles de vigne.
Crédit photo M. POMPIER CA19

Vignoble	Station	lundi 13 juillet 2026	mardi 14 juillet 2026	mercredi 15 juillet 2026	jeudi 16 juillet 2026	vendredi 17 juillet 2026	samedi 18 juillet 2026	dimanche 19 juillet 2026	Cumul 7 derniers jours	Cumul depuis maturité moyenne de la masse des œufs en Midi Pyrénées (07/04/26)
Limousin	Allassac	0	0	7.4	0	2.5	0	0	9.9	183.1
Limousin	Verneuil (radar)	0	0	14.8	0.5	5.4	0	0	20.7	128.5
Limousin	Branceilles (radar)	0	0	0	15.7	1.4	0	0	17.1	194.5

- **Prévisions du 21 juillet au 27 juillet (Source Weenat)**

	Date	Mar 21/07	Mer 22/07	Jeu 23/07	Ven 24/07	Sam 25/07	Dim 26/07	Lun 27/07
19	Température (°C)	17-33	14-34	15-34	14-36	18-31	18-26	16-29
	Pluie (mm)	0-0	0-0	0-0	0-0	4-14	0-0	0-0
87	Température (°C)	15-28	14-30	15-29	14-32	16-29	16-25	14-26
	Pluie (mm)	0-0	0-0	0-0	0-0	2-7	1-5	0-0

Stades Phénologiques



Stade BBCH 81 : Début véraison ***Stade BBCH 83 : Mi véraison***

Tableau des stades phénologiques

Cépages	Début véraison	Mi véraison
Chardonnay		
Chenin		
Sauv. blanc		
Merlot		
Cabernet franc		
Cabernet sauv.		

Code couleur		Stade majoritaire
		Stade minoritaire

La sécheresse et les hautes températures induisent un ralentissement de la véraison. Pour autant, nous enregistrons toujours une avance dans les stades phénologiques.

BLACK ROT (Guignardia Bidwellii)

• Éléments de biologie

Suivez ce lien : ephytia.inra - Biologie-epidemiologie du Black Rot



Cycle biologique de *Guignardia bidwellii*, champignon responsable du black rot.
Crédit photo : Euphytia.inra

• Situation sur le terrain

Pas d'évolution cette semaine. La situation reste saine.

Evaluation du risque : A partir de la véraison, le risque devient nul.

Méthodes alternatives : Les mesures prophylactiques servent à diminuer les sources d'inoculum primaire.

📖 Consultez la fiche « black rot » du Guide de l'Observateur



Symptômes de Black Rot
Crédit Photo SCM

Mildiou (Plasmopara viticola)

- **Situation sur le terrain**

Pas d'évolution. La situation reste saine. Le contexte météorologique n'est pas favorable au développement du Mildiou.

Evaluation du risque : Le risque est faible. Le stade véraison signe la fin de la période de sensibilité. En cas de symptômes, des repiquages sont possibles sur feuilles. Restez attentifs aux orages.

📖 **Consultez la fiche « mildiou » du Guide de l'Observateur**



Vieille tache de mildiou sur feuille.
Crédit photo : Syndicat du Chasselas

Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

- L'épamprage permet d'éliminer la végétation basse, premiers relais des contaminations primaires de mildiou
- Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : liste des produits de biocontrôle

Oïdium (Erysiphe necator)

- **Éléments de biologie**

Suivre ce lien : ephytia.inra.-Biologie-epidemiologie de l'oïdium

- Ce champignon ne nécessite pas d'eau liquide pour germer et se développer, cependant il requiert une hygrométrie élevée et une faible luminosité. C'est pourquoi, **il affectionne les vignes vigoureuses** dans lesquelles la lumière pénètre moins bien.

- Les spores germent en conditions naturelles à des températures comprises entre 4°C et 35-40°C, avec un optimum de l'ordre de 20 à 25°C. La germination s'initie en 1 à 2 heures.

- **Les humidités relatives élevées sont favorables** au développement du champignon, ainsi que **l'irrigation**. Il en est de même pour les pluies fines, contrairement aux pluies importantes qui assurent un lessivage des conidies.

- **Le vent favorise la dissémination des conidies** et permet de limiter les températures estivales. Des vents importants (3m/s) sont nécessaires pour assurer la dispersion des spores.

- **Situation sur le terrain**

Pas d'évolution. La situation est saine dans l'ensemble.

Evaluation du risque : Le risque est considéré comme nul à ce stade.

Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en *cliquant ici*.

Consultez la fiche « oïdium » du Guide de l'Observateur



Symptôme d'oïdium sur baies
Crédit Photo : SCM

Vers de la grappe (Lobesia botrana)

- **Éléments de biologie**

Source Ephytia

Les adultes s'accouplent et les femelles pondent leurs oeufs de 2e génération isolément sur les baies vertes en cours de formation. L'oeuf incube durant une dizaine de jours avant de voir l'éclosion d'une jeune chenille. En deuxième génération, la chenille présente un stade errant, dit « stade baladeur » de moins de 24 h après lequel elle perfore une baie, approximativement au stade phénologique « petits pois ». Elle y forme une galerie sous l'épiderme, à l'intérieur de laquelle elle va se développer. La chenille pourra s'attaquer aux baies voisines formant ainsi un foyer de 3 à 5 baies, appelé « perforation ». Ces foyers sont bien visibles en fin de développement par l'oxydation des tissus consommés qui prennent une teinte violacée, contrastant avec celle verte des baies. C'est lors de la formation de ces foyers et des perforations dans les baies que l'eudemis joue le rôle de vecteur à Botrytis cinerea. Les larves âgées sortent ensuite des baies pour aller nymphoser avant de s'envoler pour un nouvel accouplement à l'origine de la troisième génération.



Cycle biologique d'eudémis.
Crédit photo : Euphytia-INRAE

- ## Situation dans les parcelles

Pas de capture cette semaine. Pas de perforations observées.

Selon le modèle nous serions au stade nymphose majoritaire et tout début du vol.

Evaluation du risque : Le risque est considéré comme faible en l'absence de population.



Larve d'Eudemis et perforation d'une baie
Crédit photo : Gil BENAC – Vigneron du Vallon

📖 Consultez la fiche « tordeuses » du Guide de l'Observateur

Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Dans le cadre de la confusion sexuelle, les diffuseurs doivent être mis en place avant l'émergence de la première génération. L'efficacité du dispositif dépend du bon respect des conditions de pose (respect des densités de diffuseurs, renforcement des bordures …). Consultez la liste des produits de bio-contrôle en *cliquant ici*.

Cicadelle verte (Empoasca vitis)

- **Element de biologie**

Eléments de biologie : suivre ce lien **:** **Cicadelle verte – Ephytia (Biologie)**



Larve de cicadelle des grillures-
Crédit photo V. HARDY - QUALISOL

- **Situation au vignoble**

Faible population de larves. Les symptômes de grillures n'évoluent pas.

> **Evaluation du risque :** Le risque est encore faible. Soyez attentifs à l'évolution de la population des larves.
>
> **Seuil indicatif de risque estival :** 50 larves pour 100 feuilles

B **Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :**

L'utilisation de moyens de bio-contrôle est possible et efficace. Consultez la liste des produits de bio-contrôle en *cliquant ici*.

Cicadelle de la Flavescence dorée (Scaphoideus Titanus)

- **Element de biologie**

D'après la fiche technique de l'INRAE consultable **ICI**

Scaphoideus titanus est inféodée à la seule espèce de vigne cultivée. Cet insecte présente une seule génération sexuée par an. Les femelles fécondées pondent plusieurs oeufs qui passent l'hiver en diapause (état de vie ralentie) et éclosent au printemps suivant. Les éclosions commencent dès le début de mois de mai et s'étalent sur 6 à 12 semaines.

Le cycle de développement larvaire comporte 5 stades, qui se succèdent en moyenne tous les 10 jours. Les larves se localisent principalement à la face inférieure des jeunes feuilles de la base des ceps et sur les gourmands. Cette cicadelle s'alimente préférentiellement du contenu de la sève élaborée et excrète une grande quantité de miellat.



Scaphoïdeus Titanus adulte.
Crédit photo : INRAE

Les adultes apparaissent entre mi-juillet et début août et restent présents au vignoble jusqu'en septembre.

De nombreux facteurs environnementaux, en particulier la température, peuvent conditionner le début et la durée des éclosions ainsi que celle des différents stades de développement. Par conséquent, les différentes étapes du cycle de vie sont

susceptibles de varier selon les sites et les années.

L'acquisition et la transmission du phytoplasme se fait passivement lors de la prise alimentaire de l'insecte. Lors de son alimentation sur une plante contaminée, des phytoplasmes peuvent être absorbés via l'ingestion de sève, et se multiplier activement au niveau des cellules de l'intestin, passent dans l'hémolymphe, gagnent les glandes salivaires et s'y multiplient (**période de latence d'environ un mois).** La contamination d'une nouvelle plante saine a lieu lorsque les phytoplasmes sont excrétés avec la salive dans la sève lors d'une prise de nourriture. La cicadelle devenue infectieuse le demeurera toute sa vie mais **ne transmettra pas les phytoplasmes à sa descendance.**

Dès qu'un foyer de maladie est présent, la propagation de la maladie au sein de la parcelle se fait de proche en proche à partir de ces ceps malades au cours du déplacement des larves infectieuses. Les adultes, se déplaçant par leur capacité de vol, peuvent aller contaminer des plantes plus éloignées. Les ceps en bordure de parcelle sont les plus exposés à l'arrivée de cicadelles adultes infectieuses car ils constituent un obstacle à leurs déplacements.

Par ailleurs, soulignons que le matériel végétal contaminé destiné à la production de greffon ou de porte-greffe joue un rôle majeur dans la dispersion à longue distance de la maladie. Dans ce cas, de nouveaux foyers primaires peuvent être introduits dans le vignoble avant même que les vecteurs soient installés.

- ## Situation dans les parcelles

Les adultes pourraient être visibles. Pas encore de symptômes sur feuilles observés.

La note d'information de la DRAAF est consultable ICI

T2	**Du 15 juin au 22 juin en conventionnel……**	**Terminé**
	Du 9 juin au 17 juin en Agriculture Biologique…..	**Terminé**
T3	**Du 15 juillet au 22 juillet**	**En cours**

Dans le département de la Corrèze, les zones de lutte obligatoire sont de deux types :

- Les communes où la maladie a été déclarée en 2024. Sur ces communes, les vignes doivent recevoir 3 traitements.
- Les communes anciennement contaminées (non contaminées en 2025), qui n'ont pas été prospectées 3 ans de suite, où les vignes doivent recevoir 2 traitements.

Communes contaminées en 2024 (3 traitements) :
Branceilles, Beaulieu sur Dordogne, La Chapelle aux Saints, Chauffour-sur-Vell, Meyssac, Saint-Julien-Maumont

Commune anciennement contaminée (2 traitements) :
Saillac (2020)

Une surveillance soignée doit être engagée sur tous les secteurs. La détection précoce des foyers permet une plus grande efficacité de la lutte.

Quatre symptômes doivent vous alerter :

- La décoloration des feuilles : en jaune pour les cépages blancs et en rouge pour les cépages noirs.
- L'aoûtement partiel ou imparfait des bois provoquant un port retombant des rameaux.
- L'enroulement des feuilles.
- Lorsqu'elles sont présentes, les grappes peuvent être flétries.



Symptômes de Flavescence
Crédit phot FREDON BFC



Symptômes de Flavescence
Crédit photo M. Baudouin

Divers



Brûlures du feuillage
Crédit photo : CA 19



Symptôme d'échaudage
Crédit photo CA32

Notes nationales Biodiversité – BSV *(cliquer sur les images)*

























Produits de Biocontrôle



Résistances aux pesticides

Dernier bulletin de l'année 2026. Bonnes vendanges !

Les structures et collectifs partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Limousin sont les suivantes :
Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle Aquitaine, la Chambre Départementale d'Agriculture de Corrèze, la Fédération des Vins de la Corrèze, le Syndicat Viticole du Vin Paillé de la Corrèze et les producteurs du groupe 30000 VITI CORREZE.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).