



Vigne

N°16
15/07/2026



Animateur filière

Etienne LAVEAU
**Chambre d'agriculture
de Gironde**
e.laveau@gironde.chambagri.fr

Marie-Charlotte MICHAUD
**Chambre d'agriculture
de Gironde**
mc.michaud@gironde.chambagri.fr

Suppléance :
Enrick GEORGES
**Chambre d'agriculture
de Dordogne**
enrick.georges@dordogne.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Nord Aquitaine
N°X du JJ/MM/AA »

Edition **Nord Aquitaine**
(Départements 24/33/47)

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen : le stade M34/toutes premières baies vérées se généralise.

Données climatiques

- Nouvelle semaine avec des températures caniculaires. Orage de grêle localisé dans les nuits du 10 au 11 juillet et du 14 au 15 juillet. Pas de précipitation significative lors de cette semaine.

Etat du vignoble

- Les signes de souffrance liés aux chaleurs et à la sécheresse se multiplient.

Mildiou

- Niveau d'expression de la maladie faible globalement.
- Risque potentiel globalement faible mis à part sur l'axe Bordeaux-Libourne et l'axe Langon-Sainte-Foy La Grande.
- Pas de contamination annoncée.

Black-Rot

- Situation saine. Pas de contamination annoncée.

Oïdium

- Situation saine. Fin de stade de sensibilité pour l'ensemble des parcelles du réseau.

Vers de la grappe

- Fin de vol de G2. Faible niveau de perforations globalement.

Cicadelles vertes

- Populations faibles globalement.

Cicadelles à Flavescence dorée

- Consulter les zones de traitement auprès de votre GDON.



Données météorologiques de la semaine passée

Les données météorologiques présentées sont celles allant du 07 au 14 juillet au soir.

La température moyenne hebdomadaire de la semaine passée était de 28,1°C contre 25,1°C la semaine précédente, soit une augmentation importante de 3°C. La température la plus froide a été enregistrée sur la station de Pécharmant (24) avec 15,9°C. La température la plus élevée est enregistrée à Parempuyre (33) avec 40,1°C. Des températures caniculaires ont encore été enregistrées lors de la semaine passée avec des températures maximales dépassant fréquemment les 35°C.

Les principaux cumuls ont eu lieu dans la nuit du vendredi 10 juillet au samedi 11 juillet. Des orages de grêle ont également été recensés à cette date.

Température en °C	Min	Max	Moyenne
	PECHARMANT	PAREMPUYRE	28,1
	15,9	40,1	
Pluviométrie en mm	Min	Max	Moyenne
	SEYCHES	VILLEFRANCHE DE LONCHAT	11,6
	0,0	33,8	

Ces impacts de grêle ont été principalement observés dans le secteur du Libournais. Les symptômes les plus observés sont des impacts sur feuilles et sur grappes. En ce qui concerne les grappes, les dégâts peuvent atteindre une fréquence entre 30 et 80% avec des intensités de grappes touchées entre 1 et 10%. Certains secteurs comme le secteur Figeac à Saint-Emilion et le secteur Hippodrome à Pomerol semblent présenter des dégâts plus significatifs.

Un nouvel orage de grêle semble également avoir touché de multiples secteurs durant la nuit du 14 juillet au 15 juillet. Les observations sont encore en cours pour déterminer toutes les zones concernées et l'ampleur des dégâts.

Afin de mieux localiser les orages de grêle et de connaître l'ampleur de ceux-ci, vous pouvez signaler les dégâts observés sur la plateforme Web Alerte Vigne. La saisie des aléas climatiques observés est possible soit par le site Epicure (https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/alertes/alerte_climat) ou au travers de l'application DiagnoPlant Vigne.



Dégâts de grêle sur grappe -
©N.Poppe-Phloeme

Ces remontées peuvent permettre une meilleure caractérisation des épisodes de grêle et peuvent permettre d'activer un dispositif de dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti (TFNB).

Etat général du vignoble

• Stades phénologiques

Le stade phénologique moyen en Nord-Aquitaine est le stade M34/Toutes premières baies vérées. Ce stade se généralise avec presque la moitié des parcelles l'ayant atteint (40 parcelles sur 88). Les parcelles les plus avancées du réseau BSV atteignent le stade M35/Début véraison.

20 parcelles



Majorité des parcelles

L33/Fermeture de la grappe

40 parcelles



Secteurs et/ou parcelles précoces


M34/Toutes premières baies vérées

28 parcelles



Secteurs et/ou parcelles très précoces

M35/Début véraison



Graphique de la phénologie moyenne des derniers millésimes en Nord-Aquitaine

Le stade moyen M34 est atteint avec deux semaines d'avance par rapport aux millésimes les plus précoces 2022 et 2023.

Etat du vignoble

Les fortes chaleurs ainsi que la sécheresse installées depuis plusieurs semaines entraînent la multiplication des signes de souffrances de la vigne. Des symptômes de carences induites, des jaunissements et dessèchements partiels ou totaux de feuilles, des syndromes d'ESCA/BDA (apoplectiques ou pas), des brûlures de baies exposées au soleil et des dessèchements de la rafle et/ou de baies continuent leurs progressions. Dans les parcelles les plus touchées par la sécheresse et la canicule, des symptômes de défoliation sont observés. Des intensifications de ces symptômes sont observées sur les parcelles à risque

(sols filtrants ou à faible réserve hydrique, jeunes vignes...) n'ayant pas reçu de cumuls de précipitations lors des dernières pluies.



Divers symptômes de souffrance aux chaleurs et à la sécheresse ©E.Laveau-CA33 et E.Georges-CA24

Attention :

Certaines AOC ont donné des autorisations d'arrosage des vignes en place. Cette autorisation ne donne malheureusement pas tous les droits et les viticulteurs qui souhaitent arroser leur vigne doivent en premier lieu respecter la réglementation sur l'irrigation et les arrêtés de restriction de prélèvement.

A titre d'exemple, vous trouverez, ci-dessous, le message de la Chambre d'Agriculture de la Gironde sur le dernier arrêté en cours de la Préfète de la Gironde (en date du 3 juillet), accompagné de la cartographie des niveaux de gravité de restrictions.

<https://mailchi.mp/17337d36ce25/6a8jkoyjgc-21451287?e=0380fb7178>

Maladies fongiques

• Mildiou

Sporée

Cette semaine, seule 7 échantillons sont positifs sur les 20 analysés. Seuls les secteurs Médoc et Bordeaux ont des échantillons analysés. Le nombre de spores détectées reste très faible et le nombre moyen de spores est de 19,2 par échantillon. Il atteint au maximum 275 spores pour un échantillon.

→ **Conclusion :** Due à un faible nombre d'échantillons analysés cette semaine, l'interprétation de ces résultats doit être menée avec prudence. Globalement l'activité semble très inférieure aux niveaux habituellement observés lors d'une phase épidémique, traduisant une épidémie de faible intensité et globalement stagnante, en lien avec des conditions peu favorables au développement du mildiou.

Pour rappel, il convient de souligner que la présence de spores dans l'air ne correspond pas nécessairement à un potentiel infectieux. Les spores peuvent être détruites pendant leurs transports si les conditions sont trop défavorables (air chaud et sec par exemple). En l'absence de végétation réceptive (jeunes feuilles) et de conditions favorables à la contamination — notamment la présence d'eau libre pour le mildiou — ces spores ne généreront pas d'infection.

Modélisation (source IFV)

Prévisions - Weenat


Les simulations sont établies à partir d'une hypothèse météorologique dont les hauteurs moyennes de pluie (en mm) journalières et les températures moyennes journalières sont les suivantes :

Hypothèse météorologique	J = 15 juillet	J+1	J+2	J+3	J+4	J+5	J+6	Cumul de pluie (en mm)
Pluie (mm)	1	1	0	0	0	0	0	2
Température moyenne (°c)	28	25	25	25	27	27	26	

Après les orages des derniers jours, un temps chaud et sec est annoncé pour cette semaine.

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Des orages ont arrosé le vignoble entre le 10 et le 14 juillet. Les cumuls enregistrés vont de 0 à 35 mm, voire plus localement. L'ouest du vignoble a été beaucoup moins arrosé que le centre et, dans une moindre mesure, que l'est. Le risque potentiel est resté faible sur les zones non ou peu arrosées et a augmenté d'un cran sur les autres secteurs. Le risque potentiel est ainsi passé de faible à moyen ou de moyen à fort sur quelques rares secteurs où il était moyen la semaine dernière (entre Bordeaux et Coutras). A la faveur des orages ayant eu lieu ces derniers jours, le modèle indique que quelques contaminations ont pu se produire sur les secteurs affichant un risque potentiel plus élevé (secteur situé sur la « ligne » Bordeaux - Libourne - Coutras).	Les différents niveaux de risque potentiel se maintiennent sur l'ensemble des secteurs au cours des prochains jours. En absence de pluie prévue, aucune contamination n'est simulée par le modèle pour la semaine à venir. En cas d'orage, seuls les secteurs affichant un risque fort pourraient être confrontés à des contaminations sur le feuillage.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !



Carte de modélisation du risque potentiel Mildiou à J-7, au J=15/07/26 et à J+6

Observations

Le nombre de parcelles TNT observées cette semaine est faible (13 contre 70 la semaine passée). Les retours sont donc à prendre avec précaution.

Les fréquences d'attaque moyenne sur feuilles et sur grappes restent faibles avec respectivement 5,8 et 7,8%. Sur la majorité des TNT, le mildiou est inactif.

Sur les parcelles de Référence, les fréquences et intensités d'attaques sur feuilles comme sur grappes ne progressent pas cette semaine et restent globalement faibles.

De rares cas de nouvelles taches sont remontés comme sur la commune de Saint-Médard-d'Eyrans par exemple avec deux parcelles présentant de jeunes taches sur 30% des ceps. Ces symptômes sont recensés sur des parcelles vigoureuses, encore humides et sont sans doute liés aux précipitations du 28 juin.

A l'exception de quelques rares parcelles « humides et vigoureuses » sur les secteurs les plus arrosés lors des derniers événements orageux sur lesquelles le Mildiou reste favorisé et laisse apparaître quelques nouveaux symptômes, **la situation reste globalement saine et stable**, surtout sur les parcelles de Référence.

Evaluation du risque Mildiou :

Sur quelques parcelles exceptionnellement « humides » le mildiou reste encore un peu actif.

Sur la très grande majorité de vignoble Nord-Aquitaine, la situation est saine et n'évolue pas ou peu depuis plusieurs semaines.

Peu ou pas de précipitation annoncée lors de cette semaine. Un temps sec et chaud est encore prévu.

Attention, ces prévisions météo peuvent être amenées à changer, suivre régulièrement les annonces météorologiques pour réévaluer les scénarii de risque de contamination.

Deux axes Bordeaux-Libourne et Langon-Sainte-Foy La Grande, les plus arrosés lors des dernières précipitations sont marqués par un risque fort voire très fort. **Le risque potentiel mildiou est faible à très faible sur la plupart du vignoble Nord-Aquitaine.**

Sous les prévisions actuelles, **le modèle n'envisage pas de contamination sur l'ensemble du secteur Nord-Aquitaine.**

En cas de précipitations orageuses, seuls les secteurs à risque fort pourraient présenter des contaminations.

Cas général :



Pas de contamination envisagée par le modèle.

Zones à risque potentiel fort à très fort en cas de précipitations importantes :



Quelques contaminations foliaires envisagées par le modèle.

Consultez la fiche 1 « [Mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

• **Black-Rot**

Modélisation (source IFV)

Simulation en date du J=15/07/26

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Pas d'évolution du risque potentiel black-rot qui s'est maintenu à un niveau globalement élevé sur l'ensemble du vignoble. Le modèle indique que des contaminations ont pu se produire sur des parcelles sensibles à l'occasion des pluies orageuses de ces derniers jours.	Pour les jours à venir, le modèle décrit un risque potentiel toujours stable. Le modèle ne simule pas de nouvelles contaminations pour les prochains jours.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

La modélisation Black-Rot est un des éléments d'évaluation du risque globale Black-Rot. Historiquement, le modèle a tendance à surévaluer le risque sur les parcelles sans historique mais est plus conforme au risque sur les parcelles historiquement contaminées.

Observations

La situation reste stable par rapport aux semaines précédentes.

Seule une parcelle a une fréquence d'attaque sur feuille de 20% avec une intensité d'attaque de 0,28%. En dehors de cette parcelle, les fréquences d'attaque ne dépassent pas 6% sur feuille et la plupart des parcelles ne présente pas de symptômes de Black Rot sur feuille.

Aucun symptôme sur grappe n'a été remonté cette semaine.

Le Black Rot concerne principalement les parcelles à historique fort.

Les symptômes de Black Rot sans pycnides ne présentent pas de danger car ces taches n'ont pas de potentiel de recontamination.

Evaluation du risque Black Rot :

Le vignoble Nord-Aquitaine reste très sain et la situation n'évolue pas.

Peu ou pas de précipitation annoncée lors de cette semaine. Un temps sec et chaud est encore prévu.

Attention, ces prévisions météo peuvent être amenées à changer, suivre régulièrement les annonces météorologiques pour réévaluer les scénarii de risque de contamination.

Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination.

Cas général :



Pas de contamination envisagée.

Consultez la fiche 3 « [Black Rot](#) » du Guide de l'Observateur

• Oïdium

Sporée


Seuls trois échantillons sont positifs sur les 20 analysés au cours de cette semaine. Le nombre d'échantillon s'avère faible au cours de cette semaine. L'activité reste faible avec un nombre moyen de 4,9 spores par échantillon. Le nombre maximum de spores est de 79 et se situe sur le secteur du Médoc. Sur le secteur bordelais, le nombre maximum de spores pour un échantillon est de 14.

- **Conclusion :** *Due à un faible nombre d'échantillons analysés cette semaine, l'interprétation de ces résultats doit être menée avec prudence. L'activité aérienne semble là aussi restée faible, suggérant une faible pression liée à l'oïdium.*

Simulation en date du J=15/07/26

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Le modèle décrit un risque potentiel oïdium variable selon les secteurs mais globalement à la baisse. Toutefois, compte tenu du stade phénologique et de l'état sanitaire des parcelles, la probabilité de contamination est très faible. Le modèle n'a d'ailleurs détecté aucune contamination au cours de la semaine passée.	Pour les prochains jours, le modèle reste stable et affiche un risque potentiel moyen mais ne simule aucune contamination pour la semaine à venir.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !



Carte de modélisation du risque Oïdium à J-7, à J=15/07/26 et à J+6

Observations

La situation reste similaire à celle de la semaine passée : peu de parcelles sont marquées par des symptômes. 2 TNT et 5 parcelles de Référence présentent des symptômes d'oïdium sur grappes. Sur les 2 TNT concernés, l'un est dans l'Ouest Entre-deux-Mers et l'autre dans le Libournais. Pour les parcelles de Référence, 4 sont situées dans l'Entre-deux-Mers et une dans le Lot-et-Garonne. Mis à part la parcelle TNT avec une fréquence d'attaque sur grappe de 25% et une intensité d'attaque de 5% (destruction de récolte), les autres parcelles ont une intensité d'attaque inférieure à 1%.

Hors réseau BSV, les symptômes restent rares également.

Evaluation du risque Oïdium :

Les symptômes observés restent extrêmement rares et de très faibles ampleurs sur le vignoble Nord-Aquitaine. La généralisation du stade M34/premières baies vérées annonce la fin de la période de forte sensibilité des baies de raisin à l'Oïdium.

Peu ou pas de précipitation annoncée lors de cette semaine. Un temps sec et chaud est encore prévu.

Attention, ces prévisions météo peuvent être amenées à changer, suivre régulièrement les annonces météorologiques pour réévaluer les scénarii de risque de contamination.

Le risque potentiel oïdium est stable depuis plusieurs semaines.

La fin de grande sensibilité des grappes est atteinte sur toutes les parcelles du réseau BSV (stade L33/Fermeture de la grappe). Avec la véraison les grappes ne seront plus réceptives.

Sous les prévisions météo actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination.

Parcelles saines et sans historique :



Aucune contamination envisagée cette semaine.

Consultez la fiche 2 « [Oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

• Botrytis

De premières baies botrytisées sont observées de façon très sporadique sur des parcelles humides présentant des entassements de grappes ou des perforations liées au ver de la grappe.

Ravageurs

• Vers de la grappe

Les relevés de pièges permettent de suivre la dynamique du vol des tordeuses. Ceci nous indiquera les périodes pour aller réaliser les observations sur le terrain (pontes, dégâts) qui permettront d'estimer le niveau pression de ce ravageur.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter [la fiche technique Vers de la grappe qui présente les différents types de piégeage.](#)

Vous avez déjà un ou plusieurs pièges sur votre propriété ? Vous pouvez participer au réseau de piégeage du BSV en communiquant vos données de piégeage. **Pour toute question, veuillez contacter :**

Salomé MIALON – FREDON Nouvelle-Aquitaine salome.mialon@fredon-na.fr 07 85 97 72 60

Observations

Sur le réseau, aucun individu Cochylis ni Eulia n'a été capturé cette semaine.

Sur le réseau de pièges sexuels, les secteurs Nord-Médoc et Libournais ne remontent aucune capture d'Eudémis.

Quelques faibles captures d'individus Eudémis sont encore remontées sur les secteurs Grave-Sauternais et Ouest-Entre-deux-Mers. De façon plus locale et parfois plus importante (30 individus max), des captures de papillon Eudémis sont relevées dans le secteur Lot-et-Garonne.

Sur le réseau de pièges alimentaires, aucune capture Eudémis n'a été détectée dans les secteurs Bergeracois, Est-Entre-deux-Mers et Libournais.

La fin de vol de G2 semble effective.

Cette semaine, des performances sont observées sur les secteurs Entre-deux-Mers, Lot-et-Garonne, et Graves Sauternais. Le nombre de foyers de perforations se situe globalement entre 1 et 5 pour 100 grappes et 4 parcelles du réseau dépassent 5% de foyers de perforations. La parcelle avec la plus grosse population atteint 22 foyers de perforations pour 100 grappes (les autres parcelles sont respectivement à 6, 9 et 12%).


Hors réseau, quelques parcelles à fort historique présentent des foyers de perforations entre 20 et 30% (source Phloème).

La problématique tordeuse est très liée à l'historique parcellaire. Les observations locales sont donc très importantes pour mieux évaluer les niveaux de populations. Il est donc conseillé de faire vos propres observations sur vos parcelles, que vous pouvez partager avec le réseau BSV (Web Alerte Vigne ou par mail : bsv.reseau.vigne@na.chambagri.fr).

• Cicadelles vertes

Observations

Les populations de larves de cicadelles vertes diminuent par rapport à la semaine précédente. Seul le secteur Est Entre-deux-Mers est marqué par une augmentation des populations mais tous les autres secteurs sont marqués par une baisse. La parcelle la plus « infestée » du réseau BSV n'excède pas 30 larves pour 100 feuilles.



Graphique du nombre moyen de larves de cicadelle vertes pour 100 feuilles sur le Nord-Aquitaine

On note toujours une présence importante de populations de cicadelles italiennes sur une large partie des parcelles. Les populations de cicadelles italiennes dépassent souvent largement les populations de cicadelles vertes.

Comme pour les tordeuses, il est très important de distinguer les espèces présentes sur les parcelles pour évaluer la nécessité ou pas d'une protection. Les populations de cicadelles italiennes engendrent des dégâts tellement faibles qu'elles ne nécessitent pas de mettre en place une protection du vignoble, même en cas de fortes populations de cette cicadelle.





Larve de cicadelle verte / Larve de cicadelle italienne ©E.Laveau-CA33.

- **Cicadelles Flavescence dorée**

Traitements obligatoires

Dans les communes de Nouvelle-Aquitaine **où un traitement adulticide contre la cicadelle est requis**, celui-ci devra être réalisé entre le 13 juillet et le 16 août.

Renseignez-vous auprès de votre GDON.

Prochain bulletin : le mardi 21 juillet

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Nord-Aquitaine sont les suivantes : Adar de Castillon et de Ste Foy, Adar des 2 Rives, Adar Haute Gironde, Adar de Langon, Adar du Médoc, Alliance Aquitaine, Antenne Saint Emilion, Auraia, Bio Nouvelle-Aquitaine, Cave Sauveterre-Blasimon-Espiet, Cave de Buzet, Cave Louis Vallon, Cave du Marmandais, Cave de Sigoules, CDA24, CDA33, Cédric Elia Services et Conseils, Chrysospe eurl, Conseil Viti Bio indépendant, ENOSENS - URAB, EVV, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Gdon du Libournais, Groupement d'Employeurs du Pays de l'Entre-Deux-Mers, IFV, Phloème, Qualiviti, Univitis, Utilys Concept, Vitivista. Fermes du réseau DEPHY, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

