



Vigne

N°17
21/07/2026



Animateur filière

Etienne LAVEAU
**Chambre d'agriculture
de Gironde**
e.laveau@gironde.chambagri.fr

Marie-Charlotte MICHAUD
**Chambre d'agriculture
de Gironde**
mc.michaud@gironde.chambagri.fr

Suppléance :
Enrick GEORGES
**Chambre d'agriculture
de Dordogne**
enrick.georges@dordogne.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Nord Aquitaine
N°17 du 21/07/26 »

Edition Nord Aquitaine
(Départements 24/33/47)

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen : le stade M35/Début Véraison.

Données climatiques

- Nouvelle semaine très chaude avant un redoux et une probable petite perturbation en toute fin de semaine.

Etat du vignoble

- Les signes de souffrance liés aux chaleurs et à la sécheresse se multiplient.

Mildiou

- Niveau d'expression de la maladie faible globalement.
- Risque potentiel globalement faible mis à part sur l'axe Bordeaux-Libourne et l'axe Langon-Sainte-Foy La Grande.
- Pas de contamination annoncée.

Black-Rot

- Situation saine. Pas de contamination annoncée.

Oïdium

- Situation saine. Fin de stade de sensibilité pour l'ensemble des parcelles du réseau.

Vers de la grappe

- Démarrage du vol de G3 et des pontes sur secteurs précoces.

Cicadelles vertes

- Populations toujours globalement faibles.

Cicadelles à Flavescence dorée

- Consulter les zones de traitement auprès de votre GDON



Données météorologiques de la semaine passée

Les données météorologiques présentées sont celles allant du 14 au 20 juillet au soir.

La température moyenne hebdomadaire de la semaine a bien baissée par rapport à la semaine précédente en passant de 28,1 °C à 26,3 °C, soit une baisse de 1,8 °C. La température la plus froide a été enregistrée sur la station de Montagne (33) avec 14,6 °C. La température la plus élevée est enregistrée à Sauternes (33) avec 37,0 °C.

Des pluies ont traversé le Nord-Aquitaine sur 2 axes Sud-Ouest/Nord-Est dans la nuit du 14 au 15 juillet. Le premier axe est passé entre l'Est de la Gironde et l'Ouest du Lot-et-Garonne et de la Dordogne avec des pluies n'excédant pas 10 mm. Le deuxième axe est parti du Sud-Médoc pour finir dans le Bourgeais-Blayais. Ces dernières pluies ont été plus volumineuses et localement accompagnées de grêle, une fois de plus...

Température en °C	Min	Max	Moyenne
	MONTAGNE	SAUTERNES	26,3
	14,6	37,0	
Pluviométrie en mm	Min	Max	Moyenne
	CESTAS DDP SAINT EMILION POMPIGNAC	VENSA	6,7
	0,0	56,6	

Le dernier orage de grêle recensé dans la nuit du 14 juillet au 15 juillet en en cours d'évaluation des dégâts engendrés dans le Médoc et le Blayais-Bourgeais. Avec les pluies des 10-11 juillet, les communes concernées par des dégâts de grêles sont innombrables mais avec des surfaces et des niveaux de dégâts très variables. Seuls quelques secteurs présentent des surfaces avec des niveaux de dégâts notables. Ailleurs les dégâts restent très localisés.

Afin de mieux localiser les orages de grêle et de connaître l'ampleur de ceux-ci, vous pouvez signaler les dégâts observés sur la plateforme Web Alerte Vigne. La saisie des aléas climatiques observés est possible soit par le site Epicure (https://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/alertes/alerte_climat) ou au travers de l'application DiagnoPlant Vigne.

Ces remontées peuvent permettre une meilleure caractérisation des épisodes de grêle et peuvent permettre d'activer un dispositif de dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti (TFNB).

Etat général du vignoble

• Stades phénologiques

Les stades phénologiques ont enfin progressé cette semaine, notamment sur les zones qui ont été un peu plus arrosées par des pluies ces 10 derniers jours. La véraison est enfin enclenchée plus nettement. Le stade phénologique moyen en Nord-Aquitaine est proche du stade M35/Début véraison. Il est atteint pour la moitié des parcelles de réseau BSV. Les parcelles les plus avancées du réseau BSV atteignent le stade M36/Mi-véraison. La parcelle la plus avancée présente le stade moyen de Fin Véraison (M37). Les parcelles les plus tardives ne présentent pas encore de baie vérée.




Secteurs et/ou parcelles tardives
L33/Fermeture de la grappe



Majorité des parcelles
M35/Début Véraison



Secteurs et/ou parcelles très précoces
M36/Mi-véraison



Graphique de la phénologie moyenne des derniers millésimes en Nord-Aquitaine

Le stade moyen M35 est atteint avec deux semaines d'avance par rapport aux millésimes les plus précoces 2022 et 2023.

Etat du vignoble

Les fortes chaleurs ainsi que la sécheresse installées depuis plusieurs d'un mois, et malgré quelques pluies orageuses, entraînent la multiplication des signes de souffrances de la vigne. Des symptômes de carences induites, des jaunissements et dessèchements partiels ou totaux de feuilles, des syndromes d'ESCA/BDA (apoplectiques ou pas), des brûlures de baies exposées au soleil et des dessèchements de la rafle et/ou de baies continuent leurs progressions. Dans les parcelles les plus touchées par la sécheresse et la canicule, des symptômes de défoliation sont observés. Des intensifications de ces symptômes sont observées sur les parcelles à risque (sols filtrants ou à faible réserve hydrique, jeunes vignes, ...) n'ayant pas reçu de cumuls de précipitations lors des dernières pluies.



Divers symptômes de souffrance aux chaleurs et à la sécheresse ©E.Laveau-CA33 et E.Georges-CA24

Attention :

Certaines AOC ont donné des autorisations d'arrosage des vignes en place. Cette autorisation ne donne malheureusement pas tous les droits et les viticulteurs qui souhaitent arroser leur vigne doivent en premier lieu respecter la réglementation sur l'irrigation et les arrêtés de restriction de prélèvement.

A titre d'exemple, vous trouverez, ci-dessous, le lien du dernier arrêté en cours de la Préfecture de la Gironde réglementant temporairement les prélèvements et les usages de l'eau dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne (en date du 16 juillet),

https://www.gironde.gouv.fr/contenu/telechargement/87532/658643/file/AP-Secheresse_MEL_16072026.pdf

[https://www.dordogne.gouv.fr/contenu/telechargement/52799/409123/file/20260716_AP_restriction_avec annexes.pdf](https://www.dordogne.gouv.fr/contenu/telechargement/52799/409123/file/20260716_AP_restriction_avec_annexes.pdf)

Maladies fongiques

• Mildiou

Sporée

Très peu d'échantillons ont été remontés sur la semaine dernière. Les quelques échantillons analysés présentent des niveaux de spores très faibles.

- **Conclusion :** *Due à un faible nombre d'échantillons analysés cette semaine, l'interprétation de ces résultats doit être menée avec prudence. L'activité aérienne semble rester faible, suggérant une faible pression liée au mildiou.*

Pour rappel, il convient de souligner que la présence de spores dans l'air ne correspond pas nécessairement à un potentiel infectieux. Les spores peuvent être détruites pendant leurs transports si les conditions sont trop défavorables (air chaud et sec par exemple). En l'absence de végétation réceptive (jeunes feuilles) et de conditions favorables à la contamination – notamment la présence d'eau libre pour le mildiou – ces spores ne généreront pas d'infection.

Modélisation (source IFV)

Prévisions - Weenat


Les simulations sont établies à partir d'une hypothèse météorologique dont les hauteurs moyennes de pluie (en mm) journalières et les températures moyennes journalières sont les suivantes :

Hypothèse météorologique	J = 20 juillet	J+1	J+2	J+3	J+4	J+5	J+6	Cumul de pluie (en mm)
Pluie (mm)	0	0	0	0	0	0	3	3
Température moyenne (°c)	27	24	25	26	28	23	23	

Un temps chaud et sec est annoncé pour cette semaine, avec une possibilité d'orages le week-end prochain (à confirmer en cours de semaine).

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Une perturbation orageuse venant du sud-ouest a traversé le vignoble le 15 juillet. Des orages localement forts ont éclaté. Le médoc et le blayais sont les principaux vignobles concernés. Les cumuls d'eau varient de 0 à 75 mm dans le nord médoc. Le risque potentiel n'a pas évolué (ou très peu) au cours de la semaine passée malgré les cumuls d'eau parfois importants localement. Malgré ces cumuls de pluie parfois élevés, le modèle n'indique pas (ou très peu) de contaminations sur ces pluies.	Les différents niveaux de risque potentiel se maintiennent sur l'ensemble des secteurs au cours des prochains jours. En absence de pluie significative prévue, aucune contamination n'est simulée par le modèle pour la semaine à venir. En cas d'orage avec des volumes de pluies importants (15aine de mm), seuls les secteurs affichant un risque fort pourraient être confrontés à de <u>faibles contaminations sur le feuillage</u>.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !




Carte de modélisation du risque potentiel Mildiou à J-7, au J=21/07/26 et à J+6

Observation

Sur les parcelles TNT observées cette semaine (retour à un nombre comparable de parcelles à la semaine 26) on observe une légère augmentation des fréquences et intensités d'attaques sur feuilles et une légère augmentation de l'intensité d'attaque sur grappes. Ces variations sont dues à de petites contaminations observées sur feuilles sur quelques parcelles seulement. Ces parcelles sont situées sur les secteurs les plus arrosés par les pluies orageuses du 10 juillet principalement. Sur grappe, l'augmentation de l'intensité d'attaque est principalement due à l'extension des symptômes déjà présents sur les grappes.


Sur la majorité des TNT, le mildiou est inactif.



Graphique des fréquences et intensités, sur feuilles et sur grappes, du réseau de parcelles TNT du BSV Nord-Aquitaine

Sur les parcelles de Référence, les fréquences et intensités d'attaques sur feuilles comme sur grappes ne progressent pas cette semaine et restent globalement faibles.

De rares nouvelles taches sont observées sur les secteurs les plus arrosés par les pluies autour du 10 juillet.



Graphique des fréquences et intensités, sur feuilles et sur grappes, du réseau de parcelles Références du BSV Nord-Aquitaine

A l'exception de quelques rares parcelles « humides et vigoureuses » sur les secteurs les plus arrosés lors des derniers événements orageux sur lesquelles le Mildiou reste favorisé et laisse apparaître quelques nouveaux symptômes, **la situation reste globalement saine et stable**, surtout sur les parcelles de Référence.

Evaluation du risque Mildiou :

Sur quelques parcelles exceptionnellement « humides » le mildiou reste encore un peu actif.

Sur la très grande majorité de vignoble Nord-Aquitaine, la situation est saine et n'évolue pas ou très peu depuis plusieurs semaines.

Un temps sec et chaud est encore prévu cette semaine. Une probable petite perturbation devrait entrer en Nord-Aquitaine au cours de la toute fin de semaine, mais les pluies annoncées demeurent faibles et encore très incertaines.

Attention, ces prévisions météo peuvent être amenées à changer, suivre régulièrement les annonces météorologiques pour réévaluer les scénarii de risque de contamination.

Le risque potentiel mildiou est faible à très faible sur la plupart du vignoble Nord-Aquitaine. Deux axes Bordeaux-Libourne et Langon-Sainte-Foy La Grande, les plus arrosés lors des dernières précipitations sont marqués par un risque fort voire très fort.

Sous les prévisions actuelles, **le modèle n'envisage pas de contamination sur l'ensemble du secteur Nord-Aquitaine.**

En cas de précipitations orageuses, seuls les secteurs à risque fort pourraient présenter des contaminations sur feuilles.

Cas général :



Pas de contamination envisagée par le modèle.

Zones à risque potentiel fort à très fort :



Quelques contaminations foliaires envisagées par le modèle en cas de précipitations importantes.

Consultez la fiche 1 « [Mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

- **Black-Rot**

Modélisation (source IFV)

Simulation en date du J=21/07/26

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Pas d'évolution du risque potentiel black-rot qui s'est maintenu à un niveau globalement élevé sur l'ensemble du vignoble. Le modèle indique que des contaminations faibles ont pu localement se produire sur des parcelles sensibles à l'occasion des pluies orageuses de ces derniers jours.	Pour les jours à venir, le modèle décrit un risque potentiel toujours assez élevé. Le modèle ne simule pas de nouvelles contaminations pour les prochains jours.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

La modélisation Black-Rot est un des éléments d'évaluation du risque globale Black-Rot. Historiquement, le modèle a tendance à surévaluer le risque sur les parcelles sans historique mais est plus conforme au risque sur les parcelles historiquement contaminées.

Observations

La situation reste stable et saine sur l'ensemble des parcelles du réseau BSV.

Hors réseau quelques très rares cas de symptômes sur baies ont été trouvés sur des parcelles voisines de parcelles abandonnées qui présentaient aussi des symptômes de Black Rot sur feuilles.

Le Black-Rot concerne principalement les parcelles à historique fort.

Les symptômes de Black Rot sans pycnides ne présentent pas de danger car ces taches n'ont pas de potentiel de re-contamination.

Evaluation du risque Black-Rot :

Le vignoble Nord-Aquitaine reste très sain et la situation n'évolue pas.

Un temps sec et chaud est encore prévu cette semaine. Une probable petite perturbation devrait entrer en Nord-Aquitaine au cours de la toute fin de semaine, mais les pluies annoncées demeurent faibles et encore très incertaines.

Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination.

Cas général :



Pas de contamination envisagée.

Consultez la fiche 3 « [Black-Rot](#) » du Guide de l'Observateur

• Oïdium

Sporée

Très peu d'échantillons ont été remontés sur la semaine dernière. Les quelques échantillons analysés présentent des niveaux de spores extrêmement faibles.


- **Conclusion** : Due à un faible nombre d'échantillons analysés cette semaine, l'interprétation de ces résultats doit être menée avec prudence. L'activité aérienne semble rester faible, suggérant une faible pression liée à l'oïdium.

Modélisation (source IFV)

Simulation en date du J=21/07/26

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Le modèle décrit un risque potentiel oïdium variable selon les secteurs. Compte tenu du stade phénologique et de l'état sanitaire des parcelles, la probabilité de contamination est très faible. Le modèle n'a d'ailleurs détecté aucune contamination au cours de la semaine passée.	Pour les prochains jours, le modèle reste stable et affiche un risque potentiel moyen mais ne simule aucune contamination pour la semaine à venir.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !



Carte de modélisation du risque Oïdium à J-7, à J=21/07/26 et à J+6

Observations

La situation reste similaire à celle de la semaine passée : peu de parcelles sont marquées par des symptômes. Aucune nouvelle parcelle présentant des symptômes d'Oïdium n'est apparue dans le réseau de parcelles BSV. Seules 2 parcelles TNT présentant des symptômes les semaines précédentes laissent apparaître une légère augmentation de l'intensité d'attaque sur grappes.

Sur les 2 parcelles de Référence du réseau touchées par de l'Oïdium sur grappes, l'intensité d'attaque ne dépasse pas 0,1 %

Hors réseau BSV, les symptômes restent rares également.

Evaluation du risque Oïdium :

Les symptômes observés restent extrêmement rares et de très faibles ampleurs sur le vignoble Nord-Aquitaine. **Le stade M34/premières baies vérees** est atteint sur une majorité des parcelles et annonce la fin de la période de forte sensibilité des baies de raisin à l'Oïdium.

Un temps sec et chaud est encore prévu cette semaine. Une probable petite perturbation devrait entrer en Nord-Aquitaine au cours de la **toute fin de semaine, mais les pluies annoncées demeurent faibles et encore très incertaines.**

Attention, ces prévisions météo peuvent être amenées à changer, suivre régulièrement les annonces météorologiques pour réévaluer les scénarii de risque de contamination.

Le risque potentiel oïdium est stable depuis plusieurs semaines.

La fin de grande sensibilité des grappes est atteinte sur toutes les parcelles du réseau BSV (stade L33/Fermeture de la grappe). **La véraison des grappes annonce la fin de réceptivité de la récolte à l'Oïdium.**

Avec les prévisions météo annoncées pour la semaine, **le modèle n'envisage pas de contamination.**

Parcelles saines et sans historique :



Aucune contamination envisagée cette semaine.

Consultez la fiche 2 « [Oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

• Botrytis

De premières baies botrytisées sont observées de façon très sporadique sur des parcelles humides présentant des perforations liées au ver de la grappe. Ces symptômes restent anecdotiques.

Ravageurs

• Vers de la grappe

Les relevés de pièges permettent de suivre la dynamique du vol des tordeuses. Ceci nous indiquera les périodes pour aller réaliser les observations sur le terrain (pontes, dégâts) qui permettront d'estimer le niveau pression de ce ravageur.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter [la fiche technique Vers de la grappe qui présente les différents types de piégeage.](#)

Vous avez déjà un ou plusieurs pièges sur votre propriété ? Vous pouvez participer au réseau de piégeage du BSV en communiquant vos données de piégeage. **Pour toute question, veuillez contacter :**

Salomé MIALON – FREDON Nouvelle-Aquitaine salome.mialon@fredon-na.fr 07 85 97 72 60


Observations

Cette semaine sur le réseau BSV, aucune capture de papillon d'Eulia ou de Cochylys n'a été détectée.

Sur le réseau de pièges sexuels Eudémis, une augmentation du nombre de captures est observée sur quasi tous les secteurs, à l'exception du Nord Médoc où aucun individu Eudémis n'a été capturé et du Sud Médoc où un seul individu est capturé.

Les captures se poursuivent et sont en augmentation sur les secteurs Graves-Sauternais, Lot-et-Garonne et Ouest-entre-deux-mers sur lesquels des piégeages étaient déjà observés la semaine dernière. Sur le secteur Libournais des piégeages ont été observés avec parcimonie en fin de semaine dernière et de façon plus nette en ce début de semaine. Les secteurs du Lot-et-Garonne, Est Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde présentent les piégeages les plus importants. Le Libournais ne semble pas en reste sur ce début de semaine.

Contrairement à la semaine passée, sur le réseau de pièges alimentaires, des captures de papillons Eudemis sont observées sur les secteurs Bergeracois, Est-entre-deux-mers, Libournais et Lot-et-Garonne. Les captures restent faibles dans le Bergeracois et le Lot-et-Garonne. Sur les secteurs Libournais et Est-Entre-deux-Mers, des papillons Eudémis sont capturés respectivement depuis la fin de semaine dernière et le début de cette semaine.



Graphique du nombre moyen de papillons d'Eudémis capturés dans les pièges sexuels, par secteurs du Nord-Aquitaine

Le vol de G3 semble donc parti sur les secteurs des Graves-Sauternais, de l'Ouest et l'Est-Entre-deux-Mers et du Lot-et-Garonne depuis le début de semaine dernière, voire depuis le 10 juillet sur les parcelles les plus précoces. Dans le Libournais et le Bergeracois, le vol semble avoir commencé depuis la fin de semaine dernière. Dans le Médoc, l'absence ou les faibles niveaux de capture ne nous permettent pas encore d'annoncer un démarrage de vol de G3.

Cette semaine, des pontes ont été observées sur des parcelles du réseau BSV dans l'Est Entre-deux-Mers uniquement. Hors réseau BSV, des pontes ont été observées dans l'Est-Entre-deux-Mers, en Pessac-Léognan et dans le Blayais-Bourgeais. Dans l'Est-Entre-deux-Mers des pontes au stade « Tête noire » on même été observées ce début de semaine.

Des perforations sont toujours observées sur de nombreux secteurs, notamment en Entre-deux-Mers, Lot-et-Garonne, et Graves-Sauternais.

L'observation de perforations de chenilles alors que le vol de papillons de G3 a démarré, et qu'on observe même des pontes de G3, peuvent être le signe d'un étalement plus important que prévu de la G2. Toutefois, on observe aussi assez régulièrement des foyers de perforations d'Eulia dont les chenilles peuvent être facilement confondues avec des chenilles d'Eudémis. L'identification des 2 espèces est donc primordiale pour établir la meilleure stratégie de lutte.

Principaux éléments de distinctions entre Eudémis et Eulia :

- Les papillons se ressemblent mais l'Eulia est plus gros.
- La chenille d'Eulia est plus grosse et plus longue que celle d'Eudémis et souvent plus vert-foncé.
- Les glomérules d'Eulia attrapent plus de baies et sont reliées par des soies plus importantes.
- Les perforations d'Eulia sont plus grosses, concernent plus de baies, parfois plus distantes les unes des autres, et on observe aussi des baies « croquées » sans être vidées de l'intérieur.





Larves et dégâts d'Eudemis et d'Eulia ©E.Laveau-CA33


La problématique tordeuse est très liée à l'historique parcellaire. Les observations locales sont donc très importantes pour mieux évaluer les niveaux de populations. Il est donc conseillé de faire vos propres observations sur vos parcelles, que vous pouvez partager avec le réseau BSV (Web Alerte Vigne ou par mail : bsv.reseau.vigne@na.chambagri.fr).

• Cicadelles vertes

Observations

Les populations de larves de cicadelles vertes restent faibles à très faibles.

Sur les parcelles du réseau BSV, Les populations de cicadelles vertes n'excèdent pas 24 larves pour 100 feuilles.



Graphique du nombre moyen de larves de cicadelle vertes pour 100 feuilles sur le Nord-Aquitaine

On note toujours une présence importante de populations de cicadelles italiennes sur une large partie des parcelles. Les populations de cicadelles italiennes dépassent très souvent largement les populations de cicadelles vertes.

Comme pour les tordeuses, il est très important de distinguer les espèces présentes sur les parcelles pour évaluer la nécessité ou pas d'une protection. Les populations de cicadelles italiennes engendrent des dégâts tellement faibles qu'elles ne nécessitent pas de mettre en place une protection du vignoble, même en cas de fortes populations de cette cicadelle.





Larve de cicadelle verte / Larve de cicadelle italienne ©E.Laveau-CA33.

• Cicadelles Flavescence dorée

Traitements obligatoires

Dans les communes de Nouvelle-Aquitaine **où un traitement adulticide contre la cicadelle est requis**, celui-ci devra être réalisé entre le 13 juillet et le 16 août.

Renseignez-vous auprès de votre GDON.

Prochain bulletin : le mardi 28 juillet

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Nord-Aquitaine sont les suivantes : Adar de Castillon et de Ste Foy, Adar des 2 Rives, Adar Haute Gironde, Adar de Langon, Adar du Médoc, Alliance Aquitaine, Antenne Saint Emilion, Auraia, Bio Nouvelle-Aquitaine, Cave Sauveterre-Blasimon-Espiet, Cave de Buzet, Cave Louis Vallon, Cave du Marmandais, Cave de Sigoules, CDA24, CDA33, Cédric Elia Services et Conseils, Chrysope eurl, Conseil Viti Bio indépendant, ENOSENS - URAB, EVV, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Gdon du Libournais, Groupement d'Employeurs du Pays de l'Entre-Deux-Mers, IFV, Phloème, Qualiviti, Univitis, Utilys Concept, Vitivista. Fermes du réseau DEPHY, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

