



Vigne

N°18
28/07/2026



Animateur filière

Etienne LAVEAU
**Chambre d'agriculture
de Gironde**
e.laveau@gironde.chambagri.fr

Marie-Charlotte MICHAUD
**Chambre d'agriculture
de Gironde**
mc.michaud@gironde.chambagri.fr

Suppléance :
Enrick GEORGES
**Chambre d'agriculture
de Dordogne**
enrick.georges@dordogne.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Nord Aquitaine
N°18 du 28/07/26 »**

Edition **Nord Aquitaine**
(Départements 24/33/47)

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen : le stade M36/Mi-Véraison.

Données climatiques

- Nouvelle vague de chaleur annoncée.
- Consignes de sécurité liées à l'utilisation d'engins agricole en zones de risque incendie.

Etat du vignoble

- Les signes de souffrance liés aux chaleurs et à la sécheresse continuent de se multiplier.

Mildiou / Black-Rot / Oïdium

- Situation globalement saine.
- Quelques parcelles à surveiller avec la sortie de faibles symptômes de Mildiou sur jeunes feuilles.

Vers de la grappe

- Vol de G3 important sur le Sud et l'Est du Nord-Aquitaine.
- Pontes localement importantes.

Cicadelles à Flavescence dorée

- Consulter les zones de traitement auprès de votre GDON.
- Publication d'outils d'observation et de reconnaissance.



Données météorologiques de la semaine passée

Les données météorologiques présentées sont celles allant du 21 au 27 juillet au soir.

La température moyenne hebdomadaire de la semaine a bien baissée par rapport à la semaine précédente en passant de 26,3 °C à 23,7 °C, soit une baisse de 2,5 °C. La baisse moyenne des températures est à la fois due à la baisse des températures journalières mais aussi et surtout par la baisse des températures nocturnes, notamment en fin de semaine dernière. La température la plus froide a été enregistrée sur la station de Montesquieu (47) avec 12,6 °C. La température la plus élevée est enregistrée à Duras (47) avec 37,6 °C.

Des pluies ont traversé le Nord-Aquitaine, principalement dans la nuit du 24 au 25 juillet. Les volumes des pluies sont plutôt faibles et n'excèdent pas 10 mm sur la très grande majorité des secteurs. La pluviométrie moyenne est de 9,3 mm. Cette moyenne est largement influencée par le secteur du Libournais qui a reçu un orage nettement plus volumineux en pluies. La station de Saint-Emilion a en effet enregistré un cumul de pluies de 25,6 mm. Ces pluies ont parfois été accompagnées d'un peu de grêle mais sans engendrer de dégât.

Température en °C	Min	Max	Moyenne
	MONTESQUIEU	DURAS	23,7
	12,6	37,6	
Pluviométrie en mm	Min	Max	Moyenne
	VENSAC	SAINT EMILION	9,3
	2,2	25,6	

Etat général du vignoble

• Stades phénologiques

Les stades phénologiques continuent de progresser sur l'ensemble des parcelles du réseau BSV.

La véraison est enclenchée sur toutes les parcelles.

Le stade phénologique moyen en Nord-Aquitaine est le stade M36/Mi-véraison. Il est atteint pour la moitié des parcelles du réseau BSV. Les parcelles les plus avancées du réseau présentent des grappes en Fin de Véraison (stade M37).




Secteurs et/ou parcelles tardives
M35/Début Véraison



Majorité des parcelles
M36/Mi-véraison



Secteurs et/ou parcelles très précoces
M37/Fin véraison



Graphique de la phénologie moyenne des derniers millésimes en Nord-Aquitaine

Le stade moyen M36 est atteint avec deux semaines d'avance par rapport aux millésimes les plus précoces 2022 et 2023.

Etat du vignoble

Les fortes chaleurs ainsi que la sécheresse installées depuis plusieurs d'un mois, et malgré quelques pluies orageuses, entraînent toujours la multiplication des signes de souffrances de la vigne. Des symptômes de carences induites, des jaunissements et dessèchements partiels ou totaux de feuilles, des syndromes d'ESCA/BDA (apoplectiques ou pas), des brûlures de baies exposées au soleil et des dessèchements de la rafle et/ou de baies continuent leurs progressions. Dans les parcelles les plus touchées par la sécheresse et la canicule, des symptômes de défoliation sont observés. Des intensifications de ces symptômes sont observées sur les parcelles à risque (sols filtrants ou à faible réserve hydrique, jeunes vignes...) n'ayant pas reçu de cumuls de précipitations lors des dernières pluies.

Attention :

Certaines AOC ont donné des autorisations d'arrosage des vignes en place. Cette autorisation ne donne malheureusement pas tous les droits et les viticulteurs qui souhaitent arroser leur vigne doivent en premier lieu respecter la réglementation sur l'irrigation et les arrêtés de restriction de prélèvement.

A titre d'exemple, vous trouverez, ci-dessous, le lien du dernier arrêté en cours de la Préfecture de la Gironde réglementant temporairement les prélèvements et les usages de l'eau dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne (en date du 16 juillet),

[https://www.gironde.gouv.fr/contenu/telechargement/87532/658643/file/AP-Secheresse MEL 16072026.pdf](https://www.gironde.gouv.fr/contenu/telechargement/87532/658643/file/AP-Secheresse_MEL_16072026.pdf)

[https://www.dordogne.gouv.fr/contenu/telechargement/52799/409123/file/20260716 AP restriction avec annexes.pdf](https://www.dordogne.gouv.fr/contenu/telechargement/52799/409123/file/20260716_AP_restriction_avec_annexes.pdf)

Risque incendies

Le risque incendies est majeur sur la partie Nord-Aquitaine. Même si ce risque concerne en priorité les zones forestières, les vignes présentent aussi un risque important.

En Gironde, le risque incendies est exceptionnel induisant un classement en vigilance noire sur tout le département. Ce classement induit des restrictions et interdictions, même en dehors des zones forestières proprement dites, comme dans les parcelles viticoles.

A ce titre :

Dans les communes NON forestières : des restrictions sont en vigueur.

- Tous les travaux de moissons, fenaisons, broyages et presse sont INTERDITS entre 14h et 20h.
- Arrêté du 7 juillet 2026 viticulture : les traitements sont autorisés.

Dans les espaces exposés des communes à dominante forestière :

- Toutes les activités agricoles sont interdites, sauf pour les exploitants agricoles et apiculteurs pour le besoin des animaux entre 22h et 14h.
- Toute présence humaine est interdite.

Détail des zones exposées :

https://www.pigma.org/public/visualiseur/zones_exposees/

Liste des communes forestières :

[https://draaf.nouvelle-](https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/liste_communes_dominante_forestiere_ripfci2023_33_40_47.pdf)

[aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/liste_communes_dominante_forestiere_ripfci2023_33_40_47.pdf](https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/liste_communes_dominante_forestiere_ripfci2023_33_40_47.pdf)

Maladies fongiques

• Mildiou / Black-Rot / Oïdium

Observations

La situation sanitaire est globalement stable et saine pour l'ensemble des maladies fongiques.

Quelques rares parcelles (principalement en Gironde) présentent de nouvelles petites contaminations de Mildiou sur jeunes feuilles, mais ces symptômes n'impactent pas l'intégrité de la récolte.

Les niveaux de risques fongiques vis-à-vis de la récolte sont très faibles à nuls.

Seules quelques parcelles sont concernées par la surveillance de l'état sanitaire du feuillage concernant des contaminations par du mildiou mosaïque. Toutefois, les conditions climatiques à venir demeurent défavorables à une extension notable des symptômes en cours.

• PRB

Le PRB est un indicateur de tendance s'interprétant relativement aux profils des millésimes antérieurs, mais surtout, en le relativisant par les conditions climatiques de fin de saison qui expliquent fondamentalement le taux final de maladie.

En résumé : Chez les deux cépages étudiés en 2026, le PRB indique une sensibilité pelliculaire de la baie au Botrytis globalement plutôt limitée. En revanche, l'indicateur végétatif précoce NDVI-Bot montre un niveau déjà assez important de vigueur de la vigne amenant à un risque plutôt élevé, favorable au développement potentiel du Botrytis.

<https://umt-seven.hub.inrae.fr/actualites/avis-prb-2026>

Ravageurs

• Vers de la grappe

Les relevés de pièges permettent de suivre la dynamique du vol des tordeuses. Ceci nous indiquera les périodes pour aller réaliser les observations sur le terrain (pontes, dégâts) qui permettront d'estimer le niveau pression de ce ravageur.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter [la fiche technique Vers de la grappe qui présente les différents types de piégeage.](#)

Vous avez déjà un ou plusieurs pièges sur votre propriété ? Vous pouvez participer au réseau de piégeage du BSV en communiquant vos données de piégeage. **Pour toute question, veuillez contacter :**

Salomé MIALON – FREDON Nouvelle-Aquitaine salome.mialon@fredon-na.fr 07 85 97 72 60

Observations

Sur le réseau de pièges Eudémis BSV, une augmentation du nombre de captures est observée sur quasi tous les secteurs mais avec des niveaux assez différents.

Sur les secteurs Graves-Sauternais, Lot-et-Garonne, l'Ouest-Entre-deux-Mers et l'extrême Est de l'Entre-deux-Mers, les piégeages d'Eudémis sont très importants.


Sur le secteur Sauternais-Graves, les captures sont en forte augmentation sur quasi tous les sites de piégeages avec jusqu'à plus d'une centaine de captures sur certains pièges. Le piégeage le plus important du réseau a été identifié sur la commune de Portets avec 158 papillons capturés en une semaine. Dans l'Ouest-Entre-deux-Mers les captures sont également en augmentation et importantes localement (plus de 60 individus). En Dordogne, on retrouve à peu près la même situation avec des piégeages importants ce début de semaine, sur l'Ouest du département et le secteur de Monbazillac. Les captures sont beaucoup plus faibles dans le Sud et L'Est de la Dordogne.

Sur le secteur Libournais, les captures Eudémis sont également en augmentation depuis la semaine dernière avec un relevé supérieur à 40 individus, mais, en moyenne, le nombre d'individus piégés est nettement moins important. Il semble que les populations plus importantes se cantonnent à Libourne et le Nord du secteur Libournais.

Dans le Nord-Médoc, quelques rares captures sont relevées en fin de semaine passée et deviennent plus importantes (environ 20 individus) en ce début de semaine. Sur le Sud Médoc, une 20aine d'individus ont également été observés en fin de semaine.

Sur le réseau de pièges alimentaire, les captures Eudémis restent plus modérées. Dans l'Est-Entre-deux-Mers de faibles captures sont observées dans la continuité des piégeages de la semaine dernière. Les captures sont également faibles pour le secteur Nord-Médoc. Aucune capture n'a été relevée dans le secteur Sud-Médoc. Enfin, une augmentation des captures est observée sur le secteur Libournais.

Aucune capture Eulia n'a été relevée sur le réseau sur les secteurs Libournais, Sud Médoc et Graves-Sauternais.



Graphique du nombre moyen de papillons d'Eudémis capturés dans les pièges sexuels, par secteurs du Nord-Aquitaine

Le vol de G3 semble donc avoir pris un essor notamment sur toute la moitié Sud du Secteur Nord-Aquitaine. Sur la partie Nord le vol est aussi en progression mais avec des niveaux de populations plus modérés.

Pour corroborer le démarrage du vol de G3 depuis la semaine dernière, des pontes sont observées sur les parcelles du réseau BSV, notamment sur les Graves-Sauternais et l'Entre-deux-Mers où les œufs sont plus nombreux. La parcelle du réseau BSV la plus colonisée présente jusqu'à 32 pontes pour 100 grappes.

Hors réseau, les différentes observations confirment que sur les parcelles sur lesquelles les populations de G2 étaient importantes et sur lesquelles aucune régulation n'a été entreprise, les pontes sont très nombreuses et peuvent atteindre jusqu'à une 50aine d'œufs pour 100 grappes. Sur les parcelles en

régulation, les dénombrements d'œufs sont globalement plus faibles mais localement quelques parcelles présentent quand même de nombreuses pontes.

Sur les autres secteurs et sur les parcelles où les populations en G2 étaient faibles, les pontes sont peu nombreuses voire inexistantes à ce jour.

• Cicadelles Flavescence dorée

Traitements obligatoires

Dans les communes de Nouvelle-Aquitaine **où un traitement adulticide contre la cicadelle est requis**, celui-ci devra être réalisé entre le 13 juillet et le 16 août.

Renseignez-vous auprès de votre GDON.

🌿 Flavescence dorée : nouveaux outils de terrain à votre disposition !

La lutte contre la flavescence dorée reste un enjeu majeur pour l'ensemble de nos vignobles. Pour appuyer les acteurs dans cette démarche d'enrayement, une **boîte à outils de terrain** est issue d'une collaboration entre le Plan National Durabilité du Vignoble (PNDV) et le GDON des Bordeaux !

🔍 Première ressource disponible dès aujourd'hui : la fiche sur l'insecte vecteur !

Pour permettre l'aménagement des traitements grâce aux réseaux de surveillance, l'identification de la cicadelle (*Scaphoideus titanus*) est essentielle. Cette fiche pédagogique au format ultra-pratique vous aide à :

- Reconnaître facilement l'insecte à l'échelle et ses différents stades larvaires 🦋



- Éviter les confusions possibles 🔄



📄 Téléchargez directement la fiche insecte ici

👉 <https://www.vinopole.com/fiches-pratiques/agro-ecologie/deperissement-du-vignoble/reconnaitre-les-symptomes-de-la-flavescente-doree/>

👉 Version plastifiée à retirer à la [Chambre d'Agriculture de la Gironde](#) (39 rue Michel de Montaigne, Blanquefort) ou au [GDON des Bordeaux](#) (Planète Bordeaux, Beychac-et-Caillau)

🕒 Ce n'est que le début...

Prochainement, nous mettrons à votre disposition un **éventail des symptômes par cépage**, conçu pour vous accompagner lors de vos prospections, ainsi qu'un poster.

Restez connectés pour ne pas manquer sa sortie très prochaine. 🌿



Fin des bulletins hebdomadaires de saison **(Sauf flash exceptionnel)**

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Nord-Aquitaine sont les suivantes : Adar de Castillon et de Ste Foy, Adar des 2 Rives, Adar Haute Gironde, Adar de Langon, Adar du Médoc, Alliance Aquitaine, Antenne Saint Emilion, Auraïa, Bio Nouvelle-Aquitaine, Cave Sauveterre-Blasimon-Espiet, Cave de Buzet, Cave Louis Vallon, Cave du Marmandais, Cave de Sigoules, CDA24, CDA33, Cédric Elia Services et Conseils, Chrysospe eurl, Conseil Viti Bio indépendant, ENOSENS - URAB, EVV, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Gdon du Libournais, Groupement d'Employeurs du Pays de l'Entre-Deux-Mers, IFV, Phloème, Qualiviti, Univitis, Utily Concept, Vitivista. Fermes du réseau DEPHY, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).