Bulletin de Santé du Végétal
Nouvelle-Aquitaine

Vigne

BSV N°20
Flash Vers de grappes
19/08/2025

CHAMBRE D'AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE

Chargés de rédaction

Etienne LAVEAU
Chambre d'agriculture de la Gironde
bsv.reseau.vigne@na.chambagri.fr

Animateur filière

Enrick GEORGES
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée. Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Vigne Edition Nord-Aquitaine Flash Vers de grappes du 19/08/2025»

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

Edition Nord Aquitaine
(Départements 24/33/47)

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT en cliquant sur Formulaire d'abonnement au BSV

*Consultez les **évènements agro-écologiques** près de chez vous !*

Ce qu'il faut retenir

Phénologie
- Stades : «M37 – Fin-Véraison » à « N39-Maturation ». Premières récoltes cette semaine.

Données climatiques
- Précipitations annoncées ce milieu de la semaine et retour d'un temps estival en fin de semaine.

Vers de grappes
- **Fin de vol** sur les secteurs précoces.
- **Maintien voire augmentation des captures** sur les secteurs médians et tardifs.
- Premières perforations de G3 sur les secteurs précoces.

Cicadelles vertes
- **Diminution généralisée des populations larvaires**. Pas d'évolution des symptômes de grillure.

Maladies
- Tâches fraiches de mildiou sur jeunes pousses dans de très rares cas.
- Très rare présence de mildiou mosaïque
- Vignoble globalement sain concernant le Black Rot et l'Oïdium.
- Pas de remontée concernant le Botrytis.

Ravageurs

- **Vers de la grappe**

L'évaluation de la pression vers de grappe sur les parcelles peut s'effectuer avec du piégeage et/ou des observations :

Le **piégeage** peut donner **une tendance globale de la dynamique du vol** sur un secteur mais ne permet pas de définir la pression sur une parcelle donnée. L'observation des parcelles, avec le **dénombrement des pontes et des perforations** permet **d'estimer la pression** afin de décider de **l'opportunité ou non d'une protection insecticide**. La détermination du stade des œufs (stade tête noire) est importante pour optimiser le positionnement d'une éventuelle protection.

Toute stratégie doit être réfléchie en fonction de la destination de la vendange.

Eudémis © INRAe

Eulia © CTIFL

Cochylis © INRAe

Consultez la fiche « Tordeuses ou vers de la vigne » du Guide de l'Observateur

Suivis des vols :

Cette semaine encore on observe des différences de captures entre les 2 réseaux de pièges sexuels et alimentaires.
Sur le réseau de pièges sexuels, les données remontées sont peu nombreuses sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Les captures sont faibles sur les pièges relevés.

Sur le réseau de pièges alimentaires, les dynamiques sont différentes selon les secteurs.

Dans les Graves-Sauternais, on note une forte diminution des captures qui passe de 28,6 à 0,5 captures entre la semaine 32 et 33. Cette baisse peut être liée au plus faible nombre de pièges relevés durant la semaine.

Cette diminution importante est également visible sur le Libournais avec 9 captures en moyenne par piège cette semaine contre 42 captures en moyenne la semaine précédente.

Sur le Bergeracois et l'Est-Entre-Deux-Mers, le niveau de captures est moyen et stable entre la semaine 32 et la semaine 33 : 4,6 et 10 captures sont relevées par piège sur ces deux secteurs.

Sur le Lot-Et-Garonne, les premières captures ont été relevées à partir du 13/08 et atteignent 15 captures en moyenne par relevés. Les remontées concernent un piège localisé sur la commune de Savignac-de-Duras. Il s'agit de l'unique piège alimentaire du secteur Lot-et-Garonne.

Si on semble atteindre la fin du vol sur les secteurs les plus précoces, le vol semble en cours sur les secteurs médians et tardifs (source Phloème, Vitivista, CA24). Sur les secteurs tardifs, les piégeages semblent même en augmentation.



Graphique des piégeages alimentaires de papillons d'Eudémis © S.MIALON – FREDON Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau BSV, aucun individu Cochylis n'a été remonté.

Pontes et perforations :

Des pontes sont toujours observées sur l'ensemble des secteurs observés.
En semaine 32, la parcelle avec le plus de pontes est localisée dans le Libournais une parcelle sur la commune de Saint-Germain-du-Puch présente 62 pontes pour 100 grappes. La majorité des observations oscillent entre 0 et 25 pontes quelque que soit les secteurs.

Sur les secteurs les plus précoces, les pontes continuent à être observées. Cependant, le nombre de pontes observées semblent se stabiliser.

Sur les secteurs médians, des pontes à tous les stades sont observées et sont en augmentation par rapport aux semaines précédentes.

De premières pontes ont été détectées dans le Nord-Médoc sur la commune de Couquèques (source Phloème).

Ponte de Cochylis©

Ponte fraiche d'Eudémis©

Ponte stade « tête noire »©



Pontes avortées©

M. ETCHELECU - VITIVISTA

Les perforations sont actuellement rares sur l'ensemble du vignoble Nord-Aquitain. De premières perforations de G3 sont observées dans le Graves-Sauternais et dans le Bergeracois. Les larves sont au

stade L1-L2.

Chenille L3-L4 d'Eulia et dégâts sur baies © E.LAVEAU–CA33

Larve d'Eudémis parasitée © E.LAVEAU–CA33

Il est important de continuer à relever vos pièges et à observer vos parcelles pour déterminer la pression vers de grappes sur vos secteurs. Le vol de 3ème génération semble s'étaler sur certains secteurs.

- **Cicadelle des grillures ou cicadelle verte**

Les remontées de cette semaine indiquent une diminution des populations larvaires de cicadelles vertes. Certaines parcelles peuvent être localement atteintes et présenter des symptômes importants de grillures. De façon générale, les symptômes ont peu évolué durant cette semaine.

Symptômes (rougissements) de piqures de cicadelles vertes © E.LAVEAU–CA33

Symptômes de piqures de cicadelles italiennes © E.LAVEAU–CA33

Stress hydrique

En raison des épisodes caniculaires de la précédente semaine, des symptômes de défoliation, et flétrissements de grappes et d'échaudage sont en augmentation. Ces symptômes sont d'importance variable selon le contexte parcellaire (vigueur de la vigne, réserve utile…).

Stress hydrique avec jaunissement du feuillage © N.POPPE–PHLOEME

Echaudage sur grappe
© N.POPPE-PHLOEME

Possibilité de Flash selon l'actualité phytosanitaire

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Nord-Aquitaine sont les suivantes : Adar de Castillon et de Ste Foy, Adar des 2 Rives, Adar Haute Gironde, Adar de Langon, Adar du Médoc, Alliance Aquitaine, Antenne Saint Emilion, Cave Sauveterre-Blasimon-Espiet, Cave de Buzet, Cave Louis Vallon, Cave du Marmandais, Cave de Sigoules, CDA24, CDA33, Chrysope eurl, Conseil Viti Bio indépendant, DAconseil, ENOSENS - URAB, EVV, FREDON Nouvelle-Aquitaine, Gdon du Libournais, Groupement d'Employeurs du Pays de l'Entre-Deux-Mers, IFV, Phloème, Qualiviti, Terres du Sud, Univitis, Vitivista. Fermes du réseau DEPHY, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".