

L'ÉQUILIBRE FORÊT-GIBIER

Agir Ensemble pour
l'avenir de nos Forêts



COMPRENDRE L'ÉQUILIBRE

**L'équilibre
Sylvo-Cynégétique
(Art. L425-4)**

La loi tend à permettre la régénération des forêts dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire sur son territoire.

**Un enjeu de biodiversité et
d'économie**

Un déséquilibre entraîne une perte de croissance, des malformations, voire la mortalité des jeunes plants de chêne, sapin ou érable. Il a également un impact sur la biodiversité

SOLUTIONS ET LEVIERS D'ACTION



**L'application
« Observatoire Territoires – Gibiers »**

Un outil numérique pour télé-signaliser les dégâts, localiser les peuplements en renouvellement et suivre les plans de chasse. La remontée d'information est indispensable

ADAPTER LA GESTION DE LA CHASSE



Ajuster les plans de chasse, cibler prioritairement les femelles et favoriser l'action de chasse.
Prioriser les zones en renouvellement

AMÉNAGEMENTS SYLVICOLES



Valoriser les zones hors sylviculture en zones de gagnage pour détourner le gibier des jeunes plantations.
Utiliser la végétation spontanée comme protection

DIALOGUER POUR RÉUSSIR

“ Maintenir des échanges réguliers entre chasseurs et forestiers et apprendre à se connaître. Elaborer un diagnostic partagé et mettre en place des actions communes ”

LE RÉGIME ALIMENTAIRE DES CERVIDÉS

LE CHEVREUIL

80%
de ligneux ou
semi-ligneux



LE CERF

60%
d'herbacées, 30% de
ligneux ou
semi-ligneux



IDENTIFIER LES DÉGÂTS

L'ABROUTISSEMENT Consommation des pousses



Impacts jusqu'à 1,20m pour le chevreuil et 1,60m pour le cerf ; touche particulièrement, le chêne et le sapin.

L'ÉCORÇAGE Arrachage de l'écorce



Pratiqué par le cerf et le daim entre 0,4 et 2m de haut sur des arbres allant jusqu'à 30cm de diamètre.

LE FROTTIS Dégât comportemental



Les mâles (cerfs et chevreuils) frottent leurs bois sur les tiges, provoquant des cassures ou la mortalité de l'arbre.

CALENDRIER DES DÉGÂTS

MOIS	TYPE DE DÉGÂT PRINCIPAL	
Janv. - Avr.		Écorçage
Avr. - Mai.		Frottis de chevreuil
Juil. - Aoû.		Frottis de chevreuil
Juil. - Nov.		Frottis de cerf
Janv. - Juin.		Abrouitissement – mais possible toute l'année



LE SANGLIER : ARRACHAGE ET DETERRAGE

Il déterre les plants en motte et consomme les graines, empêchant le renouvellement forestier.

ÉVALUER AVEC LA MÉTHODE BROSSIER-PALLU

Constituer une équipe forestier-chasseur avec un ou des administrateurs-médiateurs.
Savoir évaluer objectivement la pression des ongulés sur les renouvellements forestiers
(réaliser des inventaires simplifiés de dégâts de gibiers).

ÉQUILIBRE MAINTENU

Moins de 15% de tiges objectif endommagées ;
les dégâts sont épars.

VIGILANCE NÉCESSAIRE

15% à 25% de dégâts : l'avenir du peuplement est compromis et nécessite une attention particulière.

DÉSÉQUILIBRE MARQUÉ

Plus de 25% de dégâts :
régénération très compromise et animaux souvent affaiblis.